


長田宮農経済センターだより



発行：令和4年2月15日 電話：259-3233 Fax：259-3164

センター長	柑橘・青壮年部	苺・水稲・蔬菜	落葉果樹・茶・有害鳥獣	女性部・購買
畑澤	大塚	山森・古井・大塚	森	山本
購 買				
石原 ・ 糟屋 ・ 田中 ・ 田山 ・ 鈴木				

いちご 〔 担当：山森・古井・大塚 〕



〔株の整理〕

- 果 梗・・・収穫が終了したら株に余計な負担をかけないように早急に除去しましょう
- 摘 葉・・・有効な葉面積を確保するため、老化した葉や花房にかかっている葉を摘葉して下さい
- 摘 果・・・大玉果を収穫するため、株のできに応じた果数にして下さい
春先は株疲れ防止のため、少し強めの摘花の管理を行って下さい
- 肥培管理・・・春先の温度上昇と日射量の増加に伴って、株の生育も旺盛になり給液量を多く必要としてきます。高設栽培では、排液量を確認しながら注入率を低く適宜灌水量を設定してください。なり疲れ防止のために、液肥の葉面散布を行うのも有効です

〔病害虫防除〕

- ・天敵を放飼し、天敵に影響のない薬剤の散布をしましょう
- ・ハウスが高温・多湿にならないようにこまめに換気をしましょう（灰色カビ病対策）
- ・晴れた日は十分換気を行い、株元等に空気が停滞しないように管理して下さい
- ・スリップスの発生が一部で見られます！ 予防のため、薬剤散布を行いましょう

病 害 虫	薬 剤 名	倍 率	使用基準	蜜 蜂	天 敵	備 考
ハダニ類	マイトコーネフロアブル	1000 倍	前日ー2回	1日	○	卵・幼・成
	カネマイトフロアブル※	1500 倍	前日ー1回		○	卵・幼・成
アザミウマ	カウンター乳剤	2000 倍	前日ー4回		○	幼
	ベネビアOD	2000 倍	前日ー3回		○	幼・成
	ファインセーブフロアブル【印】	1000 倍	前日ー3回		○	幼・成
灰色カビ病	スミレックスくん煙顆粒	6g／100㎡	前日ー3回		○	予防・治療
灰色カビ病	ピクシオDF	2000 倍	前日ー4回		ー	予防・治療
うどんこ病	ジーファイン水和剤	1000 倍	前日ーなし		○	予防

※新葉に薬害が発生する。生育が旺盛なときに使用しましょう。

〔親株の準備〕

- ・3月末までには親株を定植できるよう計画的に準備を行いましょう
- ・肥料切れをしないよう、IB化成等の置き肥を行いましょう



【印】マークのある農薬は、購入時に印鑑が必要です


タマネギ 〔 担当：山森・古井・大塚 〕

- ・2月下旬～3月上旬までに追肥をおこないましょう（4月まで肥料が残ると貯蔵性が劣る）
- ・べと病は春先の雨による感染が多いため、雨の前後に防除をおこないましょう

対象病害	薬剤名	倍率	使用基準
べと病・白色疫病	ランマンフロアブル	2000倍	7日ー4回
アザミウマ類	ディアナSC	2500倍	前日ー2回

さやえんどう・実えんどう 〔 担当：山森・古井・大塚 〕

- ・3月上旬に畝の肩の部分に化成肥料を4kg／a追肥し、除草も兼ねて中耕し、その後畝の形を戻すように整えてください
- ・気温の上昇とともに3月頃から病害虫が発生しやすくなるので早めの防除を心がけましょう



対象病害	薬剤名	倍率	使用基準
うどんこ病	サンヨール	500倍	前日ー4回
	トリフミン水和剤	5000倍	前日ー5回
ハモグリハエ類	ディアナSC	2500倍	前日ー2回

※さやえんどうと実えんどうは登録のある農薬、使用基準が異なるものもあるので注意して下さい

未成熟そらまめ 〔 担当：山森・古井・大塚 〕

- ・アブラムシがウイルスを媒介するため、初期より防除を行いましょう
- ・草丈が50～60cmで6～7本に整枝し、開花が始まったら株間に追肥をしましょう。

対象病害	薬剤名	倍率	使用基準
アブラムシ類	スタークル顆粒水溶剤	2000倍	7日ー2回

茶 〔 担当：森 〕

防除時期	対象病害虫	薬剤名	倍数	使用基準
3月中旬	カンザワハダニ	バロックフロアブル	2000倍	14日ー1回

バロックフロアブルは殺卵、殺幼虫への効果が主体です。
赤焼病・もち病の同時防除には、ドイツボルドーA500倍（14日）を加用して下さい。

水 稲 〔 担当：山森・古井・大塚 〕

1. 圃場の整備 （アゼの点検）
モグラ・ネズミの穴などが無いか点検をし、水持ちがよくなるようにしましょう
2. ジャンボタニシ対策
寒さに弱いので、寒冷期に1～2回ロータリーで細かく耕起して下さい
3. 土作り資材
春に田んぼを起こす時に、土壌改良資材を投入し、品質・収量向上、倒伏防止にもなります
＜例＞ けい酸加里プレミアム34 2～3袋 ／ 10a



柑 橘〔担当：大塚〕



防 除（発芽前の早期の防除に心掛けて下さい）

作 物	使用時期	病 害 虫	薬 剤 名	倍 率	使用基準
中 晩 柑	3月下旬 (発芽直前)	かいよう病	ICボルドー66D	60倍	
	注意事項　：マシン油乳剤の散布は、前後14日開けましょう				
温州みかん	3月中旬 (発芽直前)	着花促進	リンクエース	1000倍	

施 肥

品 種	時期	肥 料 名	10a 当りの施肥量
早生温州	3月中旬	みかん80ペレット	5 袋
青島温州・ポンカン はるみ・不知火			6 袋
スルガ・ネーブル		スルガペレット	6 袋
青島マルチ		柑橘ペレット 頂	5 袋

落葉果樹〔担当：森〕



防 除（気温の上昇が早いと発芽も早まります。早期の防除に心掛けて下さい）

作 物	使用時期	病 害 虫	薬 剤 名	倍 率	使 用 基 準
桃	3月上旬	せん孔細菌病 縮葉病	ICボルドー412 又は カスミンボルドー	30倍 500倍	— 開花前ー3回
	3月中下旬 （開花前）	縮葉病	トレノックスフロアブル ＊銅剤との散布間隔は10日以上	500倍	7日前ー5回
梨	3月下旬 （発芽期）	黒星病	オーソサイド水和剤80	800倍	3日前ー9回
梅	発芽前	かいよう病	Zボルドー （バイカルティ500倍加用）	500倍	満開期は避ける
	3月中下旬	灰色カビ病 アブラムシ	ロブラール水和剤 ダントツ水溶剤	1500倍 2000倍	45日前ー2回 前日ー3回
いちじく 柿	3月中旬 （発芽前）	越冬病害虫	石灰硫黄合剤	7～10倍	10a 当り散布量 150g
キウイ	3月下旬	かいよう病	コサイド3000 （バイカルティ500倍加用）	2000倍	果実肥大期まで

施 肥

作 物	使用時期	肥 料	10a 当りの施肥量
梅	3月下旬	新FTE S280	2 袋
梨	3月上中旬	静岡フルーツペレット	3 袋
キウイ			4 袋
いちじく			6 袋
柿			3 袋

JA静岡市柑橘果実品評会



《貯蔵ミカンの部》

優等	糟屋 宗伸
1等	佐野 庸策
2等	西川 雅祥

《はるみの部》（敬称略）

2等	大澤 卓広
----	-------

《不知火の部》

優等	西川 雅祥
2等	糟屋 訓敏

《ポンカンの部》

優等	大澤 卓広
----	-------

《スルガエレガントの部》

1等	牧田 高幸	
3等	中西 長一郎	前田 征宏

～ お知らせ ～

☆有害鳥獣対策 近況報告（担当：森）

- ・2月の捕獲はありませんでした。イノシシの被害報告も出ていません。小動物の活動時期になりますので引き続き注意をお願いします。
- ・3月～5月、猟友会ヘカラスの駆除申請を行う予定です。



☆柑橘剪定講習会の開催について（担当：大塚）

1. 開催日時 3月3日（木）午後1時00分
2. 集合場所 JA静岡市旧小坂支店
3. 内 容 ゆら・青島・ポンカン・不知火の剪定

ご出席される方は、2月24日（木）までに、長田営農経済センター 大塚 までご連絡お願いいたします。〈 259-3233 〉

※新型コロナウイルスの感染状況により開催を中止する場合があります。

☆営農講座の開催について（担当：山森）

1. 開催日時 3月23日（水）午後1時30分～午後3時00分
2. 集合場所 JA静岡市長田支店2F大会議室
3. 内 容 夏野菜の栽培管理とポイント

※新型コロナウイルスの感染状況により開催を中止する場合があります。

☆令和3年度 確定申告 納期限及び振替日

納付期限 3月15日
振替日 4月21日（所得税） 4月26日（消費税）