

南の風だより 2月号

南部営農経済センター 静岡市駿河区西大谷5-3
TEL: 237-5580 FAX: 237-5155

南部営農経済センターだより 令和4年2月18日発行

センター長	杉山	購買	後藤・谷米	女性部	横山
水稻・野菜・莓・TAC			松尾・大村	茶・柑橘	熊ヶ谷
購買地区担当	海野(東豊田・豊田)・栗田(久能・大谷)・久保田(高松・大里)		配送員	立花	

水稻



ケイ酸には倒伏防止・食味向上の効果があります！
また、ケイ酸は水稻にとって最も多く必要な養分です！

1. ケイ酸資材の施用

珪力燐	6~8袋	ケイカル・リン酸の補給
オイスターミネラル	5袋	カキ殻によりケイ酸の吸収率UP
けい酸加里プレミア	2~3袋	ケイ酸、カリの他、苦土、ホウ素、石灰、鉄を含む
とれ太郎	3袋	省力型肥料で、リン酸、苦土、ケイ酸、石灰を含む

2. その他土づくり資材の施用

ようりん	40~80kg/10a	土壌の有効リン酸を高める
ワラ分解キング	10kg/10a	稲藁の分解を促進する
アツミン	20~40kg/10a	リン酸などの肥効を高める

いちじく

- 敷藁 3~4月にかけて実施する。(雨による病原菌の跳ね返りを防ぎます)
- 病害虫防除

3月	越冬病害虫	石灰硫黄合剤	7~10倍	発芽前
----	-------	--------	-------	-----

※石灰硫黄合剤は、残臭が強いため、近隣に住宅等がある場合はご注意ください。
また強アルカリの薬液ですのでご使用にはご注意ください。



柑橘

1. 春肥の施用(早生温州・青島温州)

3月中旬	みかん80ℓット	早生5袋・青島7袋/10a	施用後中耕する
------	----------	---------------	---------

2. 病害虫防除(スルガエレガント・中晩柑)

3月下旬 発芽直前	かいよう病	ICボルドー66D	60倍	マシン油乳剤との散布は前後14日間以上あけること。 発芽期以降、散布しない。(落葉)
--------------	-------	-----------	-----	---

茶

1. 病害虫防除

3月中旬(萌芽前)	カンザワハダニ	バロックフロアブル	2,000倍	14日
-----------	---------	-----------	--------	-----

2. 施肥

2月中~下旬	春肥1回目	農協茶配合肥料	5袋/10a
3月上~中旬	春肥2回目	農協茶配合肥料	5袋/10a

★購買土曜日営業時における 年特肥料引取りのご協力について★

- 土曜日の年特肥料の引取りにつきまして、前日までに南部営農経済センターまでご連絡いただけますと速やかな引き渡しに対応できますのでご理解ご協力よろしく
お願い致します。

やさい



気温の上昇とともに病害虫の発生も多くなります。
早期防除、病気は予防散布を心がけましょう！

1. タマネギ

- 病原細菌は雨風によって葉に損傷を生じると感染・拡大する事が多いので気象情報に注意して、
予防散布又は、雨風がおさまったら薬剤散布を行い防除する。
- 追肥は2月下旬~3月中旬までに行う。4月以降は腐敗を増加させる可能性があるため注意！

腐敗病・軟腐病	バリダシン液剤5	500倍	3日~5回
灰色腐敗病・灰色カビ病	アフエットフロアブル	2,000倍	前日~4回
アザミウマ類	アディオオン乳剤	3,000倍	7日~5回

2. さやえんどう(スナック・きぬさや)

うどんこ病	トリフミン水和剤	5,000倍	前日~5回
ハダカアザミ類・アブラムシ類	スタークル顆粒水溶剤	2,000倍	前日~2回

3. 未成熟そらまめ

マメハモグリバエ	カスケード乳剤	2,000倍	前日~3回
ハダカアザミ類・アブラムシ類	アディオオン乳剤	3,000倍	7日~3回

4. ほうれんそう

ベと病	ランマンフロアブル	2,000倍	3日~3回
アブラムシ類	ウララDF	4,000倍	前日~2回

※ 農薬の毒劇物の表記について：農薬名の横に☞や☜で表記してあります。購入の際は、印鑑が必要になります。(普通物は、特に表記してありません。)

春夏野菜の植付にあたり、連作障害の発生を抑えるため下記の事に注意しましょう！

○連作障害回避期間のめやす

年	野菜の種類
1年休閑	ほうれんそう、コカブ、いんげんまめ
2年休閑	レタス、はくさい、きゅうり、ニラ、パセリ
3～4年休閑	なす、トマト、ピーマン、さといも、ブロッコリー、ソラマメ
4～5年休閑	エンドウマメ、スイカ、メロン、しょうが
発生しにくい	かぼちゃ、ズッキーニ、たまねぎ、ねぎ、にんじん


○同じ仲間の野菜を連作しない

ナス科	なす、トマト、ピーマン、ししとう、じゃがいも
ウリ科	きゅうり、かぼちゃ、ズッキーニ、スイカ、メロン

いちご 【2月に入り温暖な日が続いているため、害虫が多発しています。初期防除の徹底を】

1.栽培管理

- 収穫終了後の果房、古葉は早めに除去する。古葉除去後に農薬散布を行う
- 1果房3果を目安に摘果する。(草勢をみて調整する。)
- 3月に入ると日射量が増え、灌水量が不足することがあるので注意する。
※特に高設栽培では排水量のチェックを行う。(排水率30%程度)



2.病害虫防除

- (1) アザミウマ・アブラムシ・ハダニ

 アザミウマは、ハウス内で越冬したものが急激に増殖し始めています。果実の被害が出てからでは手遅れです。発生初期の防除を徹底して行いましょう！

薬剤	使用基準		アザミウマ	アブラムシ	ハダニ	入蜂	天敵
スピノエース顆粒水和剤	5,000倍	前日ー2回	○			3日	△
ディアナSC	2,500倍	前日ー2回	○			3日	△
マッチ乳剤	2,000倍	前日ー4回	○			1日	◎
ウララDF	4,000倍	前日ー2回		○		1日	◎
チェス顆粒水和剤	5,000倍	前日ー3回		○		1日	◎
カネマイトフロアブル	1,500倍	前日ー1回	新葉薬害注意		○	1日	◎
エコピタ液剤	100倍	前日ーなし		○	○	1日	○

- (2) 灰色かび病・うどんこ病

病害	薬剤	使用基準		備考
灰色かび病	スミレックス水和剤	2,000倍	前日ー3回	
	ファンタジスタ顆粒水和剤	3,000倍	前日ー3回	
うどんこ病	アミスター20フロアブル	1,500倍	前日ー3回	灰カビにも効果
	カリグリーン	1,000倍	前日ーなし	高温で薬害注意
	パレード20フロアブル	2,000倍	前日ー3回	灰カビにも効果

※ 農薬の毒劇物の表記について：農薬名の横に(毒)や(劇)で表記してあります。購入の際は、印鑑が必要になります。(普通物は、特に表記してありません。)



JA静岡市 いちご果実品評会

令和4年1月21日開催
南部支部抜粋

1等 3席大長 吉英様 (紅ほっぺ)
副賞 静岡V F株式会社社長賞

農薬使用上の注意

・栽培する作物に登録のある農薬を使用する(登録外の農薬は使用できません)

大分類	中分類	要録作物名	品種等
野菜類	豆類(未成熟)	えだまめ	
		さやいんげん	モロッコ・ヒラサヤインゲン
		さやえんどう	きぬさやえんどう・砂糖えんどう スナックエンドウ
		実えんどう	グリーンピース・うすいえんどう
	豆類(種実)	いんげんまめ	いんげん・うずらまめ
		大豆	

スナックエンドウは「さやえんどう」「豆類(未成熟)または野菜類」に登録がある剤が使用可

・使用方法を守る(倍率・散布後収穫までの日数・使用回数)

【ハクビシン・タヌキ箱罠の貸し出しについて】

営農センターにてハクビシン・タヌキを捕獲するための箱罠の貸し出しを行っています。被害にお困りの方は、営農センターまでご相談下さい。

すでに貸し出しを行っている箱罠についてですが、令和4年3月31日でプレートの捕獲許可の期限が切れます。

期限の切れた箱罠の設置は違法となりますので、一度必ずご返却頂きますようお願い申し上げます。



購買店営業時間のお知らせ

年度末決算棚卸のため、営業時間を変更いたします。
ご理解・ご協力をお願いします。

令和4年3月31日(木)

4月1日(金)
通常営業

南部営農経済センター 正午まで

