

東部営農経済センターだより 2月号

ＪＡ静岡市東部営農経済センター TEL：２４５－７５２７


センター長	茶	苺・水稻・蔬菜	果樹	営農生活支援購買	購買
瀧口信也	折山	深井・片井	榮	大越	酒井・萩原・森川・鷺巣

柑橘

スルガエレガントの出荷が始まりますが、２月８日の果実分析結果では平均で糖度 10.7 度、酸度 1.73% となっており、糖、酸共に昨年とほぼ同等です。病害虫は、１部赤さび病が発生しているため、家庭での厳選出荷をお願いします。

- 【防除】 ◎風当たりの強い園地や昨年かいよう病が発生した園地は必ず散布してください。
- ・カイヨウ病 発芽直前 ICボルドー66D 60倍
- ※ ICボルドー散布前後のマシン油乳剤散布は、1.4日以上の間隔を開けてください。
- ※ 茶混植及び隣接園ではマシン油の散布はしない。

【施肥】



時 期	品 種	袋 数
3月中旬	早生温州	みかん80ペレット 5袋／10a
	青島温州	みかん80ペレット 7袋／10a
	スルガエレガント	スルガペレット 6袋／10a
	ポンカン	みかん80ペレット 6袋／10a
	不知火・はるみ	みかん80ペレット 6袋／10a

◎スルガエレガントのホウ素欠乏園は、3月上旬にフィールドアップ施用（土壌改良材）

- 【剪定】 剪定した枝は病害虫の発生に影響しますので、必ず園外へ除去して下さい。
- また、樹冠が拡大するとともに定植当初より作業道が狭くなっている園地を見かけます。
- 樹との間が狭いと黒点病やカイガラムシの発生源となるため、少しずつ樹を間伐するようにしましょう。

落葉果樹

- 【剪定】 剪定した枝が畑に残っている場合、病害虫の発生に影響しますので、必ず園外へ除去して下さい。

- 【施肥】 キウイフルーツについては、土壌改良材を施用していない場合は、下記の肥料と同時施用で苦土セルカ2号を10袋入れて下さい。
- 樹勢が落ちている場合は、1樹当りハイフミンハイブリットGを1袋、固形肥料1号を3kg、たこつぼ方式で施用して下さい。

作物名	品 種 名	施 肥 時 期	肥 料 名
キウイ	ハイワード	3月中旬	静岡フルーツペレット4袋／10a
	東京ゴールド	3月上旬	
	柿	3月中旬	静岡フルーツペレット3袋／10a
	梨	3月上旬	静岡フルーツペレット3袋／10a
	梅	3月下旬	新FTE S280 2袋／10a

東部営農経済センターだより 令和4年2月20日発行

いちじく	3月中旬	静岡フルーツペレット6袋／10a
------	------	------------------

茶

・春 肥

（1回目）2月中旬 配合肥料 10a当 5袋

（2回目）3月上旬 配合肥料 // //

※肥効を高める為に、施肥後はできるだけ中耕して下さい



・化粧ナラシ 2月下旬～3月上旬

遅れ芽や立ち葉を取り除く程度とし、越冬芽に刃がかからないように注意して下さい。

・防 除

赤 焼 病 2月下旬 ドイツボルドーA 500倍（14日）

※例年発生が見られる園は予防として防除して下さい。

カンザワハダニ（赤ダニ） 3月中旬 バロックフロアブル 2,000倍（14日）

※ダニは葉裏やスソ葉に多くいるので、薬剤がしっかりかかるよう散布する。

※昨年秋に多発生した茶園は、必ず防除を実施して下さい。

☆チャトゲコナジラミの発生確認を！☆

まだまだ注意が必要です。裾葉に多く見受けられますので確認をして下さい。

3月上旬 ダニゲッターフロアブル 2,000倍 7日

※ カンザワハダニと：同時防除が可能です。

・防霜施設の点検

防霜対策として、萌芽期の2週間前（3月中旬）より3℃にセットする。

事前に点検 ・ファンの支柱は傾いていないか ・ファンの回転、首振り是否正常か

・電気の配線に損傷はないか ・サーモスタットの感度は正常か

いちご・柑橘 品評会結果

市果実品評会（1月21日 開催）

一等 加藤和也さん ・ 二等 鈴木茂樹さん ・ 三等 伊藤修司さん

第30回 JA 静岡市貯蔵みかん品評会（1月25日 開催）

一等1席 太田泰弘さん

三等1席 太田寿美子さん ・ 三等2席 岩科和子

第30回 JA 静岡市中晩柑品評会（2月14日 開催）

～スルガエレガントの部～

優等 太田泰弘さん ・ 一等2席 中川敏昭さん

二等1席 佐藤廣志さん ・ 二等2席 佐藤達雄さん ・ 二等3席 太田寿美子さん

三等2席 萩原則克さん ・ 三等3席 望月恵さん

～不知火の部～

一等1席 中川ときさん

～はるみの部～

優等 杉山芳則さん ・ 一等 杉山寿さん

おめでとう
ございます！

いちご

《本圃》「病害虫の増えてくる時期になりました。株の状態をよく確認しましょう。」

1、株管理

- ① 株の状態を確認するために、給液と廃液の確認をしましょう。(EC、PH、量を check！！) →土耕栽培では PF メーターを使って土壌水分量を確認しましょう。(pF 値 1.5～2.0 を目安)
- ② 収穫が終了した果房や古葉は早めに除去します。(1 度に 2 枚まで、1 ヶ月に 2 枚まで。)
- ③ 摘果を行いましょ。う。(株の状態で判断する。3 番以降は 3～5 果/房残すのが目安。)
- ④ 夜間の温度が上がり、暖房機が稼働しなくなると湿度が高くなりやすくなります。夜間や日の出前から循環線を回す、暖房機を夜間に適時強制稼働する、早朝加温の実施などで灰色カビ病対策をお願いします。

2、病害虫防除 下記の表における天敵とはミヤコ・チリに対する影響です。

① ハダニ防除 「乾燥しやすい場所、いつも発生する場所は入念に確認しましょう。」							
薬剤名	RAC	倍率	日数	回数	入蜂	天敵	備考
ダニオーテ（フ）※1	33	2,000 倍	前日	2 回	1 日	○	全ステージ有効
カネマイト（フ）※2	20B	1000～1500 倍	前日	1 回	1 日	○	高温時薬害注意

- ※1 ダニオーテ (フ) は銅剤との混用及び近接散布は NG です。(前後 2 週間以上あけましょ。う。)
- ※2 カネマイト (フ) は リモニカ (天敵) に対して影響があります。
- ② うどんこ病・灰色かび病防除 「ハウス内の湿度を 50～70%に保ちましょ。う。」

う	灰	薬剤名	RAC	倍率	日数	回数	入蜂	天敵
○		プロパティー (フ)	50	3,000～4,000 倍	前日	3 回	1 日	○
○	○	パレード 20 (フ)	7	2,000～4,000 倍	前日	3 回	1 日	○
	○	ロブラール (煙) ㊦	2	100 g / 300～400 m³	前日	4 回	1 日	○
	○	スミレックス (煙)	2	6 g / 100 m³	前日	3 回	1 日	○

③ アブラムシ・スリップス・コナジラミ防除 「葉裏や花、ランナーの先を確認しましょう。」							
対象害虫	薬剤名	RAC	倍率	日数	回数	入蜂	天敵
ス	マッチ（乳）※	15	1,000～2,000 倍	前日	4 回	1 日	○
ア・コ	ウララDF	29	2,000～4,000 倍	前日	2 回	1 日	○

対象害虫 ア：アブラムシ ス：スリップス コ：コナジラミ
※ マッチ (乳)、カウンター (乳)、ファインセーブ (フ) は アカメ (天敵) に対して影響があります。

《育苗》 「苗 8 分作です、良い苗づくりが良い成績につながります。」

1、親株準備

- ・育苗圃の整備は出来ていますか？ (ハウス内、外の整理整頓、除草、栽培棚の整理)
- ・炭疽病、萎黄病対策で必ず培土は新品のもの、もしくはしっかりと消毒されたものを使用。
- ・健全な苗づくりのために、採苗スケジュールを立てましょ。う。
- ・昨年度の育苗を省みて、炭疽病対策や高温対策、花芽分化促進など対応を。

採苗スケジュール (4 月中旬親株定植)	
時期	管理作業
6 月上旬	ポット受け開始 (15～20 倍増殖を目安)

7 月中旬	最終ポット受け
8 月上旬	切り離し (最終ポット受けから 20 日以上あける)
9 月下旬	定植 (必ず花芽分化確認)

※切り離しから定植まで 40 日～50 日はもうけ十分な育苗をましょ。う。

たまねぎ


- ・追肥は早生で 3 月上旬までに終わらせる。(遅い追肥は分球や腐りを助長します。)
- ・べと病は予防～発生初期の防除を心がける。(発病株がある場合は除去してから防除する)
- ※ 特に降雨の前後の予防散布が効果的です。

病害虫	薬剤名	倍率	日数	回数
白色疫病	ドイツボルドー A	500 倍	—	—
灰色かび病	ジマンダイセン (水)	400～500 倍	3 日	5 回
べと病				
アザミウマ類	ディアナ SC	2,500～5,000 倍	前日	2 回

さやえんどう (キヌサヤ・スナック)

- ・開花期、収穫開始ころ追肥。(草勢を見て化成肥料を与えてください。)
- | 病害虫 | 薬剤名 | 倍率 | 日数 | 回数 |
|---------|-------------|-------------|----|----|
| うどんこ病 | ジーファイン (水) | 750～1,000 倍 | 前日 | — |
| ハモグリバエ類 | スタークル (顆水溶) | 2,000 倍 | 前日 | 2 |
- ※気温の上昇にともなって病害虫が発生ましょ。うので、早めに防除ましょ。う。

とうもろこし 早撒きで 6 月下旬からの収穫をしてみませんか？



- ① 3 月にセルトレイに種をまく。
 - ・発芽適温 (地温) は 25～30℃。(品種によるが、14℃以上は欲しい。)
 - ・早まきの場合は地温確保のため、トンネル被覆や不織布のべた掛けをする。但し、発芽後、トンネル内の気温が 35℃以上になる場合は換気を行う。
 - ・霜の心配がなくなる 4 月中旬ごろ被覆を外す。生育適温は 22～30℃。
- ② 72 穴セルトレイ育苗の場合は、4 月中下旬に定植。(根の張りすぎにならない様に注意。)
- ・根を傷めると、生育に大きく影響するので、定植遅れや植え痛みは禁物。



たけのこ出荷者の皆様へ

3/4 (金) より、週 2 回 (月・金) 集荷を行います。出荷前には必ず連絡をお願いします。

連絡先：北部販売センター TEL 054-296-1129



『じまん市米』出荷してみませんか？

じまん市では地場産米の販売強化を目指し、条件を満たす「きぬむすめ」の集荷をしています。

- ① 30 袋以上の出荷 (30 kg×30 袋)
 - ② 色彩選別機を使用した 1 等米 (JA にて色彩選別機をご利用いただけます。)
 - ③ 計画された検査、集荷場所への持ち込み
- 詳しくは農経済センター (深井恵) まで

