

南の風だより 3月号

南部営農経済センター 静岡市駿河区西大谷5-3
TEL: 237-5580 FAX: 237-5155



センター長	杉山	購 買	後藤・谷米	女 性 部	横山
水稻・野菜・苺・TAC			松尾・大村	茶・柑橘	熊ヶ谷
購買地区担当	海野（東豊田・豊田）・栗田（久能・大谷）・久保田（高松・大里）			配送員	立花

水稻

ケイ酸資材の施用：倒伏防止等のためいずれかの資材を施用する

珪力燐	6~8袋/10a	混合りん肥で吸収しやすく、土に固定されにくい。
オイスターミネラル	5袋/10a	カキ殻によりケイ酸だけでなく微量要素の補給も可能。
けい酸加里 ^{アミ} 34	2~3袋/10a	施肥しやすく、緩効性で肥効が長続きする。
とれ太郎	3袋/10a	吸収されやすいケイ酸なので10aあたりの施肥量がすくない。(省力的)

野菜

さやえんどう（キヌサヤ・スナック）

ナモグリバエの被害は、3月頃から発生するので早めに薬剤散布をしましょう。防除が遅れると、発生を止められず、下葉から枯れあがってしまいます。被害を受けた葉以外の葉にも産卵されている可能性が高いので、全体に散布する。



うどんこ病	サンヨール	500倍	前日-4回
ナモグリバエ	アディオン乳剤	3,000倍	前日-3回
ハモグリバエ類	プレバソフロアブル5	2,000倍	前日-3回

未成熟そらまめ

ソラマメは気温の上昇する3月からアブラムシがつきやすく、ウイルス病葉が縮むを媒介するので、早めの防除を心がけましょう。

アブラムシ類	アディオン乳剤	3,000倍	7日-3回
--------	---------	--------	-------

たまねぎ

べと病は葉の光沢がなくなり、途中から黄色く変色してきます。春先の雨による感染が多いので、降雨前後の予防が効果的です。



べと病・白色疫病	ランマンフロアブル	2,000倍	7日-4回
	リドミルゴールドMZ	1,000倍	7日-3回
ネギアザミウマ	コルト顆粒水和剤	2,000倍	前日-3回

ほうれんそう

べと病は、黄色の斑点と葉裏の灰色のかびが目印です。病気の葉を取り除いてから、発生場所を中心に薬剤を散布しましょう。

べと病	アリエッティ水和剤	1,500倍	前日-2回
アザミウマ類	スピノエース顆粒水和剤	5,000倍	前日-2回
アブラムシ類	アクタラ顆粒水溶剤	2,000倍	3日-2回

きゅうり ウィルス病を媒介する害虫に注意し、予防的に防除を行いましょ。

薬剤名	倍率	使用時期	回数	アザミウマ類	コナジラミ類
プリロソソ粒剤	2g/株	育苗後半~定植時	1回	○	○
モベント(フ)	2,000倍	前日	3回	○	○
ディアナSC	2,500倍	前日	2回	○	○
コルト顆粒(水和)	4,000倍	前日	3回		○
プレオ(フ)	1,000倍	前日	2回	○※	
ダントツ(水溶)	2,000倍	前日	3回	○※	○

※ミナミキイロアザミウマ

えだまめ

普通栽培では、4~5月に播種をする早い作型に早生品種、5~6月に中生品種、6~7月の遅い作型に晩生品種を用います。晩生種を早まきすると、莖葉だけが繁茂し着莢が悪くなります。

~おすすめ品種~

- ★サッポロミドリ…極早生白毛系。粒が大きくびっしりなる見栄えのよさが最大の特長です。
- ★おつな姫…茶豆風味で食味良好。白毛の大莢で多収品種。早生品種
- ★湯上り娘…茶豆特有の甘味と芳香がある。茶豆だが毛茸は白く、豆は緑。中早生種。

おすすめ気門封鎖剤の紹介

☆サフオイル乳剤…殺卵作用がある気門封鎖剤。ハダニ、コナジラミ、うどんこ病など野菜類での登録があるので、幅広く使える薬剤です。



柑橘

青島温州

4月中旬	ハダニ類	マシン油乳剤97%	100倍	—
	カイガラムシ類	アブロードフロアブル	1,000倍	14日-3回
	そうか病	デランフロアブル ^劇	1,000倍	30日-3回

スルガエレガント

4月中旬	ハダニ類 カイガラムシ類	マシン油乳剤97%	100倍	—
		アブロードフロアブル	1,000倍	45日-3回

※ マシン油乳剤は、3月下旬にボルドー剤を散布した場合、間隔を14日以上あける。

※ 農薬の毒劇物の表記について：農薬名の横に^毒や^劇で表記してあります。購入の際は、印鑑が必要になります。(普通物は、特に表記してありません。)

茶

カンザワハダニ ⇒ **バロックフロアブル【2000倍・14日】**

＜防除効果＞殺卵・殺幼虫が主（薬剤がかかった成虫が産んだ卵のふ化を抑制します。）

☆特に裾部や道路端部の発生に注意し、散布は丁寧に行なってください。

お知らせ 「茶栽培作業記録用紙（防除・施肥）の提出について」

- ◎ 対象者 : 荒茶共販出荷者
- ◎ 提出期日 : 摘採を予定する5日～1週間前
- ◎ 提出物 : 栽培作業記録用紙（防除・施肥）
- ◎ 提出場所 : 最寄りの支店又は南部営農経済センター

いちご

1. 今後の管理

- (1) 垂れ下がった下葉と芽の整理を行ない、株元の風通しを良くする。
- (2) 果房あたり3果を目安に摘果する。芽数が多い場合は、草勢をみて調整する。
- (3) 日射量の増加や気温上昇に伴い、灌水量は適宜増やし、必要に応じて液肥や葉面散布をする。
- (4) 急激な温度の上昇が予想されるので、ハウス内が28℃以上にならないように注意する。



2. 病害虫防除

・うどんこ病・灰色かび病



薬剤	倍率	使用基準	うどんこ	灰色かび	備考
ファンタジスタ顆粒水和剤	2,000～3,000倍	前日-3回		○	
スミレックスくん煙顆粒	100m ³ /6g	前日-3回		○	
アフェットフロアブル	2,000倍	前日-3回	○	○	※
カンタスドライフロアブル	1,000～1,500倍	前日-3回		○	

※機能性展着剤（ミックスパワー・アプローチBIなど）は薬害の恐れがあるので加用しない。

・アザミウマ類

薬剤	倍率	使用基準	成虫	幼虫	入蜂	カブリダニ
ベネビアOD ※展着剤を入れない	2,000倍	前日-3回	○	○	1日	○
ファインセーブフロアブル劇	2,000倍	前日-3回	○	○	1日	○
マッチ乳剤 (IGR剤)	1,000倍	前日-4回		○	1日	○

3. 親株の管理

- (1) プランター等の資材は、イチバン（500～1,000倍、瞬時浸漬）で消毒してから使用する。
- (2) 培土は、新しいものか、土壌消毒してあるものを使用する。
- (3) 親株には無病苗を利用し、定植時には粒剤（モスピラン、アドマイヤー等）処理をする。
- (4) 紅ほっぺは、草姫よりも親株の定植適期が早く、肥料と水分を必要とする。
- (5) **親株は、3月下旬～4月上旬に定植する。（特に紅ほっぺ、きらび香）**
- (6) 活着後、IB化成S1号6粒/株を追肥し、肥切れに注意する。（きらび香は8粒/株）

水稻作業標準料金表(荒越こし～田植)

参考価格

作業名	単位	料金	備考
荒越こし	10a	16,940円	3月以降
崩し再耕	10a	12,100円	
代かき	10a	16,500円	
田植(機械植え)	10a	12,100円	植え付けのみ

※農協にて作業受委託は受け付けられないのでご了承ください。

購買店営業時間のお知らせ

年度末決算棚卸のため、営業時間を変更いたします。
ご理解・ご協力をお願いします。

令和4年3月31日(木)

南部営農経済センター 正午まで

4月1日(金)

通常営業 8:30～16:00



※購買当用品の配達について
基本、注文日の翌日配達になります。

茶生産者のみなさまへ

援農ボランティア「受入農家」募集！

生産者の力になりたいという市民を募り、農繁期において人手の確保が困難な茶生産者に対して派遣します！

- ・依頼作業の例 ○手摘み ○施肥 ○袋持ち・運搬 ○出荷準備 など・・・

・募集締め切り **令和4年 3月31日(木)**

南部営農経済センターまで TEL 054-237-5580

令和3年分(令和4年3月申告利用分)固定資産台帳利用料徴収について

固定資産台帳の利用料を下記の通り徴収させていただきます。
例年、年末の徴収でしたが、誠に勝手ではございますが、この時期に変更させていただきます。
ご不明な点等ございましたら、最寄りの営農センターへお問い合わせ下さい。

引き落とし予定日：4月15日(金) 金額：1,500円

《※固定資産台帳とは、確定申告時に作成する収支計算書（農業・不動産・一般）の添付資料である減価償却費一覧表のことです》

※ 農薬の毒劇物の表記について：農薬名の横に☞や劇で表記してあります。購入の際は、印鑑が必要になります。（普通物は、特に表記してありません。）