



東部営農経済センター便り

6月号

JA静岡市東部営農経済センター TEL：245-7527 購買店 245-7555

センター長	茶	苺・水稻・蔬菜	果樹	女性部（しづはた兼任）	購買
酒井 孝英	熊ヶ谷	深井・片井	久留	市川	栗田・萩原・後藤・田山・中村

重要!

肥料の価格改定のお知らせ（化成肥料・配合肥料）

みだしの件につきまして、当 JA でも値上げ幅の減少に努めましたが、値上せざるを得ない状況となり、下記のと通りの対応させていただく事になりました。

1、 令和4年特予約肥料 ⇒ 価格据え置き

2、 当用肥料 ⇒ 7月1日より値上

～皆様へお願い～
予約肥料の追加や駆け込みの大量購入はお断りさせていただきます。
組合員の皆様にはご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解・ご協力をお願い申し上げます。



茶 【防 除】					
時 期	病虫害名	薬 剤 名	倍 数	日数	使用 方法
2 番 茶 整 枝 後	ハ マ キ ム シ 類	デ ィ ア ナ S C	5, 0 0 0 倍	前 日	単
輪斑病の発生が予想される場合混用		アミスター2070フロアブル	2, 0 0 0 倍	1 4 日	
3 番 茶 萌 芽 期	炭そ病・もち病 新 梢 枯 死 症	フ ロ ン サ イ ド S C	2, 0 0 0 倍	1 4 日	混
	ウンカ・スリップス	コ ル ト 顆 粒 水 和 剤	2, 0 0 0 倍		

- 【施 肥】（母枝肥）
- ・3茶（母枝）は来年の1茶の土台となるため大変重要です。
翌年の生葉収量、品質向上の為にも必ず施肥して下さい
 - ・時 期・・・2番茶摘採後 ・施肥量・・・化成肥料 3袋／10a当り

- 【2 番茶後の整枝】（2 番茶を摘採しない園も含む）
- ・時期 2 番茶摘採後 10～14 日後の遅れ芽が出揃った頃 又は 6 月下旬～7 月最上旬
 - ・位置 ①葉層を確保し、樹勢回復を図りたい茶園は、2 番茶の摘採面を揃える程度
②樹勢が強く、芽数を確保したい茶園は、1 番茶摘採面～昨年の秋整枝面の間
※②の場合は古葉を残す。無くしてしまうと夏場の干ばつ等で秋までに十分な葉層が確保できなくなり、来年の1 番茶に影響しますので注意してください。

- 【1 番茶後更新園の整枝】
- ・時期 再生芽が平均 15cm 程度伸びた頃
日数の目安 深刈り更新・・・更新後 50～60 日後 / 中切り更新・・・更新後 60～70 日後
 - ・位置 更新した位置よりも 5cm 程度上（新葉が 2 枚程度残る高さ）
※生育が遅く、7 月末までに十分伸びていない場合は、秋に整枝してください。

東部営農経済センターだより 令和 4 年 6 月 20 日発行

柑 橘

7月 は 生理落果が落ち着き、果実が肥大を始める時期です。下記の「摘果管理」を参照していただき、適宜摘果を行いましょう。園地、樹毎に着果量のバラつきがあるかと思われます。そのため、樹の状態を見て着果の多い樹から実施するようにしてください。

◎ 防除管理

【温州みかん】

時 期	対 象 病 害 虫 名	使 用 農 薬 名	希 釈 倍 数	使 用 基 準
7 月 上 中 旬	チャノキイロアザミウマ	キ ラ ッ プ フ ロ ア ブ ル	2,000 倍	21 日－2 回
	カ イ ガ ラ ム シ 類	トランスフォームフロアブル	2,000 倍	前 日－3 回
	黒 点 病	エ ム ダ イ フ ァ ー 水 和 剤	600 倍	60 日－2 回

※ 極早生温州は収穫日数を考慮してマンゼブ・マンネブ剤を散布してください。

【中晩柑】

時 期	対 象 病 害 虫 名	使 用 農 薬 名	希 釈 倍 数	使 用 基 準
7 月 上 旬	か い よ う 病	I C ボ ル ド ー 4 1 2	50 倍	—
7 月 中 旬	チャノキイロアザミウマ	キ ラ ッ プ フ ロ ア ブ ル	2,000 倍	21 日－2 回
	黒 点 病	エ ム ダ イ フ ァ ー 水 和 剤	600 倍	90 日－2 回

◎ カミキリムシ発生園地

- （モスピラン顆粒水溶剤● 2,000 倍／14 日－3 回

アドマイヤーフロアブル● 2,000 倍／14 日－3 回

エ ク シ レ ル S E 5,000 倍／ 前日－3 回 等の散布が効果的です。

- ◎ 摘果管理 温州みかん・・・7 月に内なり果、すそなり果、傷果などを中心に粗摘果を行い、8～9 月に仕上げ摘果を行ってください。
中晩柑・・・樹勢維持、日焼け果抑制のため樹冠上部三分の一摘果は、早期に行いましょう。スルガエレガント・デコボン・ポンカン は、大玉生産のため7 月中に90%以上摘果し、8 月以降仕上げ摘果として下さい。
- ◎ 施肥管理 スルガエレガント・・・スルガペレット 2 袋/10a
ポ ン カ ン・・・新 FTE S604 2 袋/10a

- ◎ マルチの実施 全面マルチ被覆時期：早生・・・7 月上旬 青島・・・8 月上旬
部分マルチ被覆時期：早生・・・8 月上旬 青島・・・8 月中下旬

落葉果樹

作物名	時 期	対 象 病 害 虫	使 用 農 薬 名	希釈倍数	使用基準
柿	7 月 上 旬	落 葉 病 ・ 炭 そ 病	エ ム ダ イ フ ァ ー 水 和 剤	500 倍	45 日－2 回
		カ メ ム シ 類	テ ル ス タ ー 水 和 剤	1,000 倍	14 日－2 回
	7 月 中 旬	ハタムシガ・ハマキムシ	フェニックスフロアブル	4,000 倍	7 日－2 回
		カ メ ム シ 類	キ ラ ッ プ フ ロ ア ブ ル	2,000 倍	7 日－2 回
梨	7 月 上 旬	輪 紋 病	ベ ン レ ー ト 水 和 剤	3,000 倍	前 日－4 回
		ハマキ・シンクイムシ	フェニックスフロアブル	4,000 倍	前 日－2 回
	7 月 中 旬	ハマキ・シンクイムシ	テ ル ス タ ー 水 和 剤	1,000 倍	前 日－2 回
		輪 紋 病 ・ 黒 星 病	ストロビードライフフロアブル	3,000 倍	前 日－3 回
	7 月 下 旬	シンクイムシ・カメムシ	ス タ ー ク ル 顆 粒 水 溶 剤	2,000 倍	前 日－3 回
キウイ	7 月 上 旬	果 実 軟 腐 病	ロ ブ ラ ー ル 水 和 剤	1,000 倍	前 日－4 回
	7 月 中 旬	クワシロカイガラムシ	ア プ ロ ー ド 水 和 剤	1,000 倍	前 日－2 回

水稻

今年はまだ、ウンカの飛来情報はありますが、今後も注意し状況によって早期防除をお願いいたします。

1. ガス抜き

特に前年の稲藁、雑草を多くすきこんだ場合や、荒起こしが遅かった場合に行う。
⇒ 1～2日間程度。（活着期）

2. 中干し

- (1) 田植 30～35 日後を目安に、1 株 18～20 本の分けつを確保したら中干しを開始する
- (2) 中干しは表面がヒビ割れする程度（7～10 日間）とし、肥沃田や排水不良田は強め、やせ地は弱めとする
- (3) 特に元肥一発肥料を施用した田では、中干し時期を厳守する

3. 除草剤

中干し時に下記のいずれかを散布する（後期剤）10aあたり

ヒエ・広葉	クリンチャーバス ME ※1	1,000ml/10a	展着剤不用	混用可
ヒエ専用	クリンチャーEW ※2	100ml/10a		
広葉雑草	MCP ソーダ塩 ※3	200g/10a	分けつ抑制	
ヒエ以外	アトトリ1キロ粒剤	1 kg/10a	オモダカ、クログワイなど	

※ どの薬剤も雑草が大きくなってからは効果が劣る。ノビエ5葉期までに散布を行う。
※ 1、薬害が出やすいため、雑草を良く露出させ葉茎散布。
※ 2、深水条件下では効果が劣るので落水または浅水条件で散布する。

4. 中干し後の水管理

- (1) 中干し後、3 日～数日おきに間断かん水とする
- (2) 穂ばらみ期～出穂期は、水を最も必要とするのでたん水する
- (3) 出穂後は、間断かん水に戻す

JAの飲料★好評販売中!!



ポストニック
ウォーター

1ケース
500ml×24本

1,944円



ドトールコーヒー
ブラック・微糖

1ケース
260g×24本

2,256円



静岡緑茶
ボトル缶

1ケース
400g×24本

2,592円

是非お買い求めを♪

トウモロコシ収穫祭やいます!!

日時：令和4年7月9日（土） 9：00 ～ 12：00

場所：城北地区圃場にて（つばさ静岡小羊学園付近）
※「坂下ストロベリーさん」の直売所横です。
詳しい内容は東部営農センター店頭にてご案内します
TEL：054-245-7527

是非ご来場のうえ収穫を楽しんでください!!



いちご

暖化の影響で、育苗環境は年々難しくなってきました。こまめな手入れと病害虫防除で良質苗の安定生産をお願いします。また、熱中症など体調管理には十分に気を付けて頂きますようお願い致します。

＜本圃＞ 片づけと来作に向けた準備

- 
- ① 除塩
土耕…ビニールを外し、雨にあてる。
高設…収穫終了後 10 日程度は水のみで灌水し、培土に残った肥料を吸わせた後に株を処分する。
じょうろなどを使用し、ホースでベンチ上から水をかけ流し、洗い流すのも有効です。
 - ② 土壌消毒 使用するフィルムは厚手の農ポリもしくは農ビを。（黒マルチ等は×）
・クロルピクリン錠剤㊟：30 cm×30 cm間隔で 1 錠もしくは 1 mあたり 10 錠
→気化したガス成分が効果を発揮。握って崩れる程度、被覆して 1 日程度で水滴がつく程度。
・バスアミド微粒剤㊟：20～30 kg/10a
→水分にて分解し、効果が発揮。握って崩れない程度がベスト。（含水率 50%）
・熱消毒：たっぷりの灌水して、厚手のフィルムでしっかり覆う。
 - ③ 土壌改良
土耕…物理的改善にベラボン（ヤシ柄）90 袋/10a（3 年に 1 回）
高設…長年使用している培土は腐食が進み、排水性が悪くなってきます。
10 年近い培土は入れ替えを行いましょう。
※高設でヤシ柄培土を使用する場合は「あく抜き」をしっかり行いましょう。

＜育苗＞ 親株肥培管理（メルコクアント試験紙で 500ppm以上を推移しましょう。）
「肥料切れ、水不足には十分に注意して下さい。灌水は多頻度灌水で、培地が渴いている時間が長時間にならないようにしてください。」

- ① IB化成S1号の場合：親株 1 株あたり 10 日で 3 粒もしくは 14 日で 4～5 粒を施用する。
※給液チューブの場合は水の落ちる場所に IB 化成を置くように注意して下さい。（加水分解のため。）
- ② 給液管理の場合：ECO.6 を目安に給液。（親株）
※培土の乾燥防止のため多頻度灌水を基本とし、目安として一日株あたり 600ml 以上あげて下さい。

☆育苗圃防除ローテーション（先月号の続き）☆
「炭そ病の発生には十分に注意してください。高温多湿条件にならない様に、圃場排水の整備や妻面の除去など環境管理にも気を付けて下さい。」

時 期		薬 剤	RAC	倍率	主な対象病害虫
7 月	第 2 週 (3 日～9 日)	アントラコール（顆水）	M3	500 倍	炭そ
		エコピタ（液）	—	100 倍	うどんこ・ハダニ・アブラムシ
	第 3 週 (10 日～16 日)	オーソサイド（水）	M4	800 倍	炭そ
		テデオン（乳）	12D	500～1000 倍	ハダニ
	第 4 週 (17 日～23 日)	ゲッター（水）	1・10	1000 倍	炭そ
		サンマイト（フ）	21	1000～1500 倍	ハダニ・アブラムシ
	第 5 週 (24 日～30 日)	ベルコート（水）	M7	1000 倍	炭そ・うどんこ
		アーデント（水）	3A	1000 倍	ハダニ・アブラムシ・アザミウマ

お勧め農薬 薬剤名：タフパール 「2,000～4,000 倍」「育苗期～収穫前日」「回数制限なし」
微生物資材です。薬剤耐性菌に対しても効果があり、定期的な使用で予防効果が期待できます。
※本剤の有効成分は生菌であるので、開封及び調剤後はできるだけ速やかに散布する。
※多剤との混用の際は必ず混用の可否を確認してください。（十分に効果が得られない可能性有。）

