

# わらしな川 8月号

(R4.8.20 発行)

JA静岡市 藁科営農経済センター 指導:279-0772 購買:279-0773 配送:279-0774

|       |       |      |                              |         |       |     |    |
|-------|-------|------|------------------------------|---------|-------|-----|----|
| センター長 | 宮原    | 茶    | 深井・八木                        | 野菜・水稲・苺 | 小澤・繁田 | 女性部 | 平野 |
| 購買    | 市川・岡田 | 地区担当 | 増井(服東・服西)・久保田(南藁科)・松尾(清沢・大川) |         |       |     |    |

## 購買店営業日時変更のお知らせ

9月30日(金) 8:30~12:00 上期決算欄卸のため

ご理解・ご協力  
をお願いします。



## 国補助事業・肥料価格高騰対策支援について(予告)

- ・対象期間 令和4年6月~令和5年5月に購入した肥料(本年の秋肥と来年の春肥として使用)  
※秋肥、春肥で分けて申請予定
- ・支援内容 前年より増加した肥料代金の7割を支援します  
※算定の計算式があるので、「肥料代金×7割」の支援ではありません
- ・必要な物 本年秋肥(令和4年6月~10月)、来年春肥(令和4年11月~令和5年5月)の  
購入価格が分かるもの(予約注文書等) + 領収書または請求書が必要です
- ・取り組み 化学肥料低減に向けた取り組みを15個の中から2つ以上実施すること

☆申請方法の説明会を10月頃に開催する予定です。詳しくは9月の訪問日にてお知らせします。

## 購買から オススメ & お買い得情報

### 電動ファン付きベスト&ブルゾン



首元が涼しい設計で快適!  
ファン、バッテリーなど一式  
そろったタイプがオススメ!  
ベスト・長袖タイプもあります。

コンプリートセット **11,220円**

### 彩輝 2,780円

各種そ菜に使いやすい  
N-P-K=6-6-6。  
種まきや苗の定植時  
の元肥に便利な  
ペレット状!  
1袋 約20kg入り



数量限定!

## 暑い夏におすすめ☆

JA飲料で熱中症予防!

JA飲料 各種

1ケース **1,944円** 10本入り



夏野菜を食べきろう!

漬物の素 各種 **300円** 10パック入り



子供にも人気!

ゼリーの素

各種 **452円** 10パック入り



【茶】 ☆本年も、シャクトリ・ハマキの発生が見られますので注意して下さい。

8月中旬以降、ハマキムシ類が発生しています。これからダラダラと発生が予想されますので、まだ防除をしていない方は、早めの防除徹底をお願いします。

ファルコンフロアブル 4000倍 7日 単用

※適期は逃した場合は、アファーム乳剤 2000倍7日を散布して下さい。

|       |                 |            |       |                 |           |
|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|-----------|
| 秋芽開葉期 | 炭そ病、もち病<br>網もち病 | ドイツボルドーA   | 500倍  | ・予防効果<br>・残効性有り | 混用<br>14日 |
|       | ウカ、スリップス        | スタークル顆粒水溶剤 | 2000倍 | ・浸透移行性有り        |           |

※ チャトゲコナジラミ、又はサビダニ、ホコリダニの発生が予想される茶園はスタークル顆粒水溶剤に代えてハチハチ乳剤 [1000倍・14日] 又は ガンバ水和剤WSB「1000倍・14日」を散布。

※ 組織加入者等で使用する農薬が定められている場合は、それを遵守してください。

### ・秋肥の施用

夏から秋の時期にかけて、茶樹は養分を多く吸収し、根や幹を生育・肥大させます  
また、この時期の茶樹の生育や養分の蓄積は、翌年の新芽の生育や品質・収量に大きく影響しますので  
窒素・燐酸・加里がバランス良く含まれた有機配合肥料を施用する

- ① 1回目 8月下旬~9月上旬 有機配合 5袋/10a
- ② 2回目 9月中旬~9月下旬 有機配合 5袋/10a

### 【野菜】(秋冬アブラナ科野菜)

生育初期のコナガ・ヨトウは定植時の粒剤施用で被害を防ぎましょう。

| 薬剤名       | キャベツ               | ハクサイ               | ダイコン      | ブロッコリー             |
|-----------|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|
| オルトラン(粒)  | 1~2g/株             | 1~2g/株             | 3~4kg/10a | 2g/株               |
| プリロソ(粒)   | 1~2g/株             | 1~2g/株             | 6kg/10a   | 1~2g/株             |
| プレバソン(フ)5 | 100倍(灌注)<br>2,000倍 | 100倍(灌注)<br>2,000倍 | 2000倍     | 100倍(灌注)<br>2,000倍 |

※プレバソンの灌注はセルトレイまたはペーパーポットのみです。ポリポットへは使用できません。

### 【有害鳥獣駆除】

現在、【サル・イノシシ・ニホンジカ・アライグマ・ハクビシン・アナグマ】の野生鳥獣の  
駆除許可を、管内全域で取っています。

駆除等のご相談は部農会長さんを通し、営農センターへご相談下さい。



## JA静岡市 組合員交流 ゴルフ大会 開催のご案内

日程 11月4日(金) 雨天決行  
会場 小田急西富士ゴルフ倶楽部  
参加者 組合員及び組合員の家族 120人  
参加費 15,000円/人  
申込 部農会回覧に記入か藁科営農経済センターへご連絡下さい。

申込締切  
9月16日(金)



## 【水稲】

散布適期：穂揃い期（粒剤は出穂直前～出穂期）

|    |                      |            |         |     |    |
|----|----------------------|------------|---------|-----|----|
| 液剤 | 穂いもち                 | ブラシフロアブル   | 1000倍   | 7日前 | 混用 |
|    | ウンカ・カメムシ             | スタークル顆粒水溶剤 | 2000倍   | 7日前 |    |
| 粒剤 | ウンカ・カメムシ<br>ツマグロヨコバイ | スタークル粒剤    | 3kg/10a | 7日前 |    |



※ 散布時間は開花中（8時～14時）の防除を避ける。

※ 株元をよく観察し、ウンカの発生している場合にはエミリアフロアブルかエクシードフロアブルでの防除をお願いいたします。

## 【苺】

定植前の管理

- 施肥：育苗後半は定植後の芯どまりの発生を防ぐために大切な時期となります。施肥管理に気をつけてください。置肥は8月25日までをめどとし、それ以降は液肥の施肥にて対応してください。
- 葉かき：常時3～4枚管理（5枚になったら、2枚かく程度）。葉かき作業は晴天時に行い、作業後は必ず炭そ病の予防散布してください。
- 病虫害防除：病虫害を本圃に持ち込まないようにしましょう。ハダニは葉かき後の防除が効果的です。



| 時期   | 農薬名        | RAC  | 倍率         | 使用回数 | 備考             |
|------|------------|------|------------|------|----------------|
| 8月5週 | ファンタジスタ顆粒水 | 11   | 2000倍      | 3回   | 炭疽・灰カビ         |
|      | ピラニカEW     | 21A  | 2000倍      | 2回   | うどんこ・ハダニ・アブラムシ |
| 9月2週 | アントラコール水和剤 | M3   | 500倍       | 6回   | 炭疽             |
|      | エコピタ液剤     | -    | 100倍       | -    | うどんこ・ハダニ       |
| 9月3週 | ゲッター水和剤    | 1.10 | 1000～1500倍 | 3回   | 炭疽             |
|      | プレオフロアブル   | UN   | 1000倍      | 4回   | ヨトウ            |
| 9月4週 | ベルコート水和剤   | M7   | 1000倍（定植前） | 5回   | 炭疽・うどんこ        |
|      | ニッソラン水和剤   | 10A  | 2000～3000倍 | 2回   | ハダニ            |

※ベルコート水和剤は、定植後は4000倍になりますのでご注意ください

- 炭そ病対策：炭そ病は傷口から感染します。少しの気づかいで炭そ病の拡大を防ぎましょう。（葉かき直後の灌水をしない。朝灌水し、水が落ち着いたら葉かきをする。）
- 定植日：定植は花芽分化100%を確認してからにしましょう。
- 農薬の安全使用：いちごは切離し～収穫終了までの回数をカウントします。育苗期と定植後（本圃）では、使用倍率が異なったり、定植後（本圃）では使用できない農薬があります。使用には十分注意しましょう。

| 家の光                               | 地上                         | ちゃぐりん                               | 日本農業新聞          |
|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 旬の農産物の情報が盛りだくさん！！家族みんなで読める情報誌     | 農業専門誌<br>市場の流れなど読みやすく紹介します | こども雑誌<br>やさしいクイズや料理など<br>家庭での食育に最適！ | 営農とくらし、経営を支えます！ |
| 12ヶ月 8,782円                       | 12ヶ月 6,922円                | 12ヶ月 5,664円                         | 1ヶ月 2,623円      |
| <b>購読推進運動実施中！！</b>                |                            |                                     |                 |
| お申込みは最寄りの支店または薫科営農経済センターまでご連絡下さい。 |                            |                                     |                 |

## 【果樹】

| 果樹名                    | 時期                 | 病虫害                    | 農薬名           | 倍率            | 使用基準               |       |
|------------------------|--------------------|------------------------|---------------|---------------|--------------------|-------|
| 温州みかん<br>中晩柑           | 9月中旬               | 黒点病                    | ペンコゼブ水和剤      | 600倍          | 温州30日<br>中晩柑90日 4回 |       |
|                        |                    | ミカンハダニ                 | ダニコングフロアブル    | 4000倍         | 前日-1回              |       |
|                        |                    | チャノキイロザミウマ             | アグリメック        | 2000倍         | 7日-3回              |       |
|                        |                    | カメムシ（発生した場合）           | ロディー乳剤        | 2000倍         | 7日-4回              |       |
| ※ 仕上げ摘果をし、品質の向上に努めましょう |                    |                        |               |               |                    |       |
| 柿                      | 8月上旬               | フジコナカイガラムシ<br>カキノヘタムシガ | モスピラン顆粒水溶剤    | 2000倍         | 前日-3回              |       |
|                        | 9月上旬               | うどんこ病・炭そ病              | ストロビードライフロアブル | 3000倍         | 14日-3回             |       |
|                        | カメムシ類（発生に注意しましょう。） |                        | テルスターフロアブル    | 3000倍         | 3日-2回              |       |
| 梅                      | 9月上旬               | 黒星病                    | サルファーゾル       | 500倍          | —                  |       |
|                        | 9月中旬               | ウメシロカイガラムシ             | アプロードフロアブル    | 1000倍         | 7日-2回              |       |
| キウイフルーツ                | 8月中旬               | レインボーレッド               | 果実軟腐病         | トップジンM水和剤     | 1000倍              | 前日-5回 |
|                        | 9月上旬               | ハイワード                  |               | ベルコート水和剤      | 1000倍              | 前日-5回 |
|                        | 9月中下旬              | クワシロカイガラムシ             | アプロード水和剤      | 1000倍         | 前日-2日              |       |
|                        | 9月中旬               | レインボーレッド               | 貯蔵病害          | ストロビードライフロアブル | 2000倍              | 前日-3日 |
| ブドウ<br>（簡易ハウス）         | 9月中旬<br>（収穫後）      | べと病                    | IC ボルドー66D    | 50倍           | —                  |       |
|                        |                    | クワコナカイガラムシ             | トランスフォームフロアブル | 2000倍         | 14日-3回             |       |

## 【女性部】

<行事・会議>

- 9/5(月)19:00～ ひかりの会【薫科】
- 9/7(水)13:30～ 女性部記念誌会議【本店】
- 9/8(木)12:30～ 婦人科検診【厚生病院】
- 9/13(火)10:30～ 助け合い交流会【農業会館】
- 9/28(水)12:30～ 婦人科検診【厚生病院】
- 9/29(木)12:30～ 婦人科検診【厚生病院】
- 書道 9/9,30(金)18:30～【薫科】
- 清沢フラワー 9/21(水)19:00～【清沢】

<教養講座>

- 一閑張り 9/5(月)13:30～【中薫】
- 料理 9/6(火)9:30～【内牧】
- ピアノ 9/6,20(火)13:30～【薫科】
- 薫科体操 9/6,20(火)19:30～【薫科】
- フラダンス 9/8,22(木)19:00～【薫科】
- 清沢体操 9/8,22(木)19:30～【清沢】
- パッチワーク 9/14,28(水)9:30～【薫科】
- 和太鼓 9/11,25(日)19:00～【公民館】



### 日本のナス

古くから親しまれてきたナスに、産地が力を入れている新しいナス。バラエティー豊かなナスの美味しい食べ方紹介します♪

読みどころ

家の光9月号

もったいないから  
タマネギ染めができた！

たかが玉葱の皮、されど玉葱の皮。シミになったTシャツなど、ちょっと染めたらまた着られる！チャレンジ！