



長田宮農経済センターだより



発行: 令和4年9月14日 電話: 259-3233 Fax: 259-3164

センター長	柑橘・青壮年部	苺・水稻・蔬菜	落葉果樹・茶・有害鳥獣
畑澤	大塚	石原・古井	森
購 買			女性部
天野・渡辺・糟屋・田中			山本

【購買店舗 休業】のお知らせ

日頃、当農協をご利用いただきまして誠にありがとうございます。

9月30日(金) … 12時閉店 仮決算のため

10月1日(土) … 休業 仮決算のため

10月8日(土) … 休業 生活事業大感謝祭のため

ご迷惑おかけしますが、ご理解ご協力を御願いたします。

【お知らせ】肥料価格高騰対策事業について

説明会を予定しております、別刷りの資料をご覧ください。

いちご〔担当: 石原・古井〕

定植後の管理

- 定植後一週間は手灌水を実施し、根張を良くする。
- 葉かきは、定植後2週間は行わず発根を促す。(病害虫が多発生した場合は適宜除去)
- 一番花の出蕾が確認できたら、遅れないようにミツバチを導入をする。

収穫期に向けて、収穫前日数や登録内容に十分注意してください。

① 定植前までしか使用できないもの

キノンドーフロアブル	デランフロアブル【印】	ジマンダイセン水和剤 (収穫76日前)
アントラコール顆粒水和剤	リドミルMZ水和剤	アグリメック【印】

② 収穫前のまでの日数が長いもの

オーソサイド水和剤80	収穫30日前	ベンレート水和剤	収穫30日前
ゲッター水和剤	収穫21日前	ポリオキシ AL 水溶液「科研」	収穫14日前
トクチオン乳剤	収穫75日前	ランマンフロアブル	収穫30日前

③ 育苗期と本圃で倍率が異なるもの

ベルコート水和剤		ベルコートフロアブル	
育苗期	本圃	育苗期	本圃
1,000倍	4,000倍	1,000倍	2,000倍

※ 農薬散布は、ミツバチや天敵資材への影響日数を確認してから行ってください。

里芋(唐芋)〔担当: 石原・古井〕

- 遅い追肥は芋の品質に悪影響が出るので、配合肥料等の施用は控える

病虫害	薬剤名	倍率	使用基準
ハスモンヨトウ	フェニックス顆粒水和剤	2,000倍	前日-2回
ハダニ・ハスモンヨトウ	コテツフロアブル【印】	2,000倍	7日-2回

柑橘〔担当: 大塚〕

- ☆ 青島温州の摘果作業(9月中旬～)、早生ミカン・中晩柑は仕上げ摘果をして下さい。
- ・ 10月上旬までの摘果は糖度を上げる効果があります!
- ・ 粗皮果、大玉果、すそ枝・内なりの小玉果、天成り果(日焼果)、軸太果などの外観不良果の除去
- ☆ 成木青島ミカン・早生ミカンの夏秋梢は、充実した枝を切らずに来年の結果母子として使いましょう。
- ☆ 成木中晩柑の夏秋梢はカイヨウ病の越冬病斑になるのですべて切除して下さい。
- ☆ 幼木は温州みかん・中晩柑ともに、病害虫無被害の枝を充実した堅いところで切り返して残します。
- ☆ 夏秋梢は再発芽しない10月中旬に切除作業をしてください。

防除 …… カメムシの発生に注意* 圃場で見つけたら即防除!

かんきつ、キウイ、柿 に「スタークル顆粒水溶剤 2,000倍 前日 - 3回」

作物	使用時期	病虫害	薬剤名	倍率	使用基準
スルガエレガント	10月中旬	ミドリヒメヨコバイ カメムシ類	テルスター水和剤	2,000倍	前日-3回
		黒点病・赤さび病	オキシンドー水和剤80	1,000倍	60日前-3回
早生温州	収穫7~10日 前混用散布	貯蔵病害 (腐敗防止)	ベンレート水和剤	4,000倍	前日-4回
			ベフラン液剤25【印】	2,000倍	前日-3回

施肥

作物	使用時期	肥料	10a当たりの施肥量
早生温州	10月下旬	みかん50ペレット	5袋
スルガエレガント	10月下旬	スルガペレット	6袋

茶〔担当: 森〕

【防除】

時期	病虫害	薬剤名	倍率	使用基準	使用方法
秋整枝後	カンザワハダニ	オマイト乳剤	1,500倍	14日-2回	単用

輪斑病・赤焼病の発生が予想される圃では、秋整枝直後にカスミンボルドー1,000倍(30日)で散布する。

【管理】 秋整枝について

時期: 平均気温が18~19度以下になった頃(再萌芽を防止するため)

整枝程度: 葉層を8cm以上残すようにする

2番茶摘採面より4~5cm程度(三番茶の葉を2~3枚残す)上で整枝して下さい

落葉果樹 [担当: 森]

防除 ※IC ボルドーは、「412」と「66D」があるので、種類に注意してください。

作物	使用時期	病虫害	薬剤名	倍率	使用基準
桃	10月中旬	せん孔細菌病	IC ボルドー 412	30倍	いずれか
			ムッシュボルドー バイカルティ(混用)	500倍 500倍	
梨	10月上旬	黒星病・黒斑病	キノドーフロアブル	1,000倍	3日前～9回
梅	10月～発芽前	かいはう病	IC ボルドー 66D	50倍	
キウイ	収穫直後(レインボー)	かいはう病	コサイド 3000	2,000倍	
	収穫目安は、糖度がレインボーレッド 6.5 度(9月最下旬位)、東京ゴールドが 9 度(10月下旬位)です。		バイカルティ(混用)	500倍	

施肥

作物	使用時期	肥料	10a 当たりの施肥量
桃	10月上旬	桃秋ペレット	砂地畑 6 袋
			普通畑 3 袋
いちじく	10月中旬	静岡フルーツペレット	4 袋
梨			6 袋
柿(収穫後)・梅			5 袋
キウイ			7 袋
土壌改良材 (柿・梨・梅)	10月中旬	苦土セルカ2号 (上記肥料と同時施用できます)	10 袋

10月の秋肥施用は、果樹にとって最も大事な作業です。落葉前に養分を吸収することで、翌年の生育に大きく関わるので、必ず実施してください。

水稲 [担当: 石原・古井]

- [水管理] 出穂後30日間は間断灌水を行い穂を充実させましょう。
当熟期の夜間の温度が高い場合は夜間のかけ流しを行うと、食味向上に繋がります。
- [落水適期] 収穫前1週間を目安に落水を行いましょ。
- [収穫] 適期刈り取りの目安 籾が90%黄化した時期
出穂後の日数 早生種(35～40日)、中生種(40～45日)、晩生(45～50日)
- [乾燥] 玄米水分を15%に調整しましょう(測定希望の方は、営農センターへ)

[台風後の管理] 圃場を見回り、速やかに排水しましょう

～倒伏してしまったら～

- ・ 収穫時期のものはできるだけ早く収穫しましょう。
→穂発芽が発生すると、品質低下がみられます(キヌヒカリ、キヌムスメなどの品種は穂発芽しやすい)
- ・ 部分的に倒伏してしまった場合は、倒伏程度に応じて刈分けを行い、被害粒の混入を減らしましょう。
- ・ 圃場内にゴミなど異物がないか見回り、速やかに取り除きましょう。
- ・ 収穫までの期間がある場合は、引き起こせば収穫が望めるので、引き起こし草勢の回復を図りましょう。
- ・ ウンカの多飛来が発生する場合があります。
→倒伏している箇所では特に注意し、状況により薬剤防除を行いましょ。
ウンカ多発生時 エミリアフロアブル 1,000倍(収穫7日前～2回)

～ **お知らせ** ～

いきいき都市農業支援事業受付中 (毎月 20 日 J A 締め)

市街化農地で農業を営む方が(農業収入 50 万円以上) その農地で利用する機械・施設等を導入する場合、1/2 (最高 30 万円) の支援金が受けられます。

有害鳥獣情報

- ・8月捕獲実績 イノシシ 8 頭(丸子 4、小坂 3、石部 1) ハクビシン 1 頭(丸子)
- ・毎年9月に入ると鳥獣被害が増えており、今年も9月から被害報告が増えています。
イモ類や早生ミカン、柿、栗など狙って入るので対策をお願いします。



日本農業新聞・家の光・農業経営記録簿の注文受付中!

- ・長田営農経済センターでは、随時購読の申込みを受け付けています!

■「ふれあい座談会・肥料年特座談会」長田支店建設・店舗統廃合説明会(予定)

日程	会場	時間
11月4日(金)	長田支店	午後5時
11月7日(月)	丸子支店	午後5時
11月8日(火)	下川原支店	午後5時

■「長田ブロック農業祭」12月3日(土)開催(予定)

- 荒茶工場燃油価格高騰緊急対策事業の説明会開催について
日時 10月12日(水) 午後1:30～JA 静岡市本店 4 階

詳しくは、長田営農経済センター 担当 森まで

●肥料価格高騰対策事業について

説明会を予定しております、別刷りの資料をご覧ください

購買店舗からのお知らせ!

10月14日(金)・10月17日(月) は、年金感謝デー協賛

「 お茶詰め放題やります!! 」 1袋 1,000円

ジュース・飲料も各種取り揃えてありますので、ご来店お待ちしております。