

センター長	茶	苺・水稻・蔬菜	果樹	女性部（しづはた兼任）	購買
酒井	熊ヶ谷	深井・片井	久留	市川	栗田・萩原・後藤・田山・中村

肥料価格高騰対策事業・

農業生産資材高騰緊急対策支援金 説明会について

肥料等の価格高騰に対し、国、県、市の対策事業があります。
下記日程で説明会を行いますので、ご参加ください。

開催日	会場	① 時間	② 時間
11/7（月）	あさはた支店 2 階	15：30～	18：00～
11/8（火）	西奈支店 2 階	15：30～	18：00～
11/9（水）	千代田支店 2 階	15：30～	18：00～
11/10（木）	あさはた支店 2 階	15：30～	18：00～
11/11（金）	上土支店 2 階	15：30～	18：00～



（国＋県）「肥料価格高騰対策事業」秋肥分について

概要…化学肥料低減の取組を行う農業者に、肥料価格上昇分の 85%（国 70%、県 15%）を支援。
※算定の計算式がある為、「価格上昇分×85%」の支援ではありません
対象者…農産物の販売実績がある方で、令和 4 年 6 月～令和 4 年 10 月に高騰した肥料（秋肥分）を
購入した方。

令和 4 年 11 月～令和 5 年 5 月分（春肥分）については年明けに申請を行います。
※春肥分申請の場合には、今後の予約注文数が申請時に必要となりますが、事業申請後の数量の変更は支援金の返還も生じますので注文時ご注意ください。

静岡市支援金「農業生産資材高騰緊急対策」について

概要…高騰する生産資材（種苗、肥料、農薬、諸材料、動力光熱費）の経費上昇分の一部を助成
対象者…R3 収支決算書（青色・白色）における農産物販売金額が 50 万円以上の農業者（法人を含む）
詳細…今月号のオアシス（P. 21）に記載がありますのでご確認ください。
問合せ…静岡市農業政策課 054-354-2091

※ 上記の国・県が実施する「肥料価格高騰対策事業」や「燃油価格高騰緊急対策事業（施設園芸・茶）」に申請する場合は、該当する経費（肥料、動力光熱費）について申請できませんのでご注意ください。

柑橘

極早生品種の収穫も大詰めを迎え、早生品種の収穫へと移り変わる時期です。今年はハダニの発生が各所で見受けられます。着色期のハダニは果実の外観に悪影響を与えますので、徹底した防除を行ってください。また、ハダニは葉裏に寄生しやすいので、葉裏にまんべんなく薬剤がかかるようにしましょう。

収穫期の近い品種では、農薬の収穫前日数に注意してもらうとともに、収穫の際には果実を丁寧に扱い、傷みによる腐敗果の発生を抑えるようにしましょう。

【防 除】温州みかん

散布時期	病害虫名	農薬名	希釈倍率	使用基準
発生時	ミカンハダニ	カネマイトフロアブル	1,500 倍	7 日－1 回
収穫前	貯蔵病害	ベフラン液剤 25 ㊟	2,000 倍	前日－3 回
		ベンレート水和剤	4,000 倍	前日－4 回

【防 除】中晩柑

散布時期	病害虫名	農薬名	希釈倍率	使用基準
発生時	ミカンハダニ	カネマイトフロアブル	1,500 倍	7 日－1 回

【秋 肥】

品種	施肥時期	肥料名	施肥量
スルガエレガント	10 月下旬	スルガペレット	6 袋／10 a
早生温州		みかん 50 ペレット	5 袋／10 a
青島温州	11 月上旬		6 袋／10 a
ポンカン			6 袋／10 a
不知火・はるみ		新FTE S604	2袋／10 a


落葉果樹

【秋 肥】落葉果樹の元肥時期となります。

作物名	施肥時期	肥料名	施肥量
柿	11 月上旬	静岡フルーツペレット	6 袋／10 a
梨			

土壌分析のお知らせ

1. 受付期間と提出先
令和 4 年 11 月 11 日（金）まで 最寄りの営農経済センターへ提出。
2. 試料について
(1) 風乾した土を 200 g（紙袋へ入れてください）
(2) 袋に「氏名」・「連絡先」・「作物名」・「施設・露地の別」などを明記して下さい。
3. 料金：1,210 円／1 検体（JA 静岡市で半額助成します）



図のように圃場内の 5 カ所から採土し混合する。

茶

【カンザワハダニの防除】

- ＜時 期＞ 10月下旬～11月下旬 （秋整枝後・越冬前）
＜薬 剤＞ オマイト乳剤 1500倍 （14日）

【赤焼病の防除】

- ＜時 期＞ 秋整枝後
＜薬 剤＞ カスミンボルドー 1000倍（30日）

【再整枝（化粧ナラシ）】


- ＜時 期＞ 年内に行う場合は11月中下旬（2月下旬～3月上旬でも結構です。）
＜深 さ＞ 秋整枝位置より絶対に深くしない。
＜目 的＞ 秋整枝後に発生する遅れ芽や立ち葉など、整枝面から上に出ているものを除去する。
※ できるだけ逆刃のナラシ機を使用する。

水稻

1、 貯蔵時の病虫害対策

品名	使い方
ネルパック	<u>真空貯蔵袋</u> 、30kg用。（コクゾウ虫やカビを防ぐ）
エージレス	ネルパックに入っている <u>脱酸素剤</u> で、 <u>詰め替え用</u> 効果の切れた物と入れ替えて使用する（効果1年間）

- ※ 保管場所にクズ米やヌカが落ちていないようきれいに掃除しておくこと。
※ 15℃以下で保存すること（病虫害が活動を停止する温度）



2、 ジャンボタニシ対策

収穫後に耕運し、ジャンボタニシを破砕する。また、厳寒期に耕起し、越冬中の貝を寒さにさらす。耕運速度は遅く回転数を早くすることで、殺貝効果を上げる。

3、 土づくり資材

品 名	施用量/10a	特 徴
けい酸加里プレミアム	2～3袋	ケイ酸、カリ、その他を含む



ケイ酸の効果

- ・ 不稔実米を減少させる。
- ・ 粒張りを良くする。
- ・ 葉をピンと立たせ、光環境を良くし光合成を促進させる。
- ・ ケイ化細胞を強化し茎葉を硬化させ、倒伏・病害に強い稲を作る。
- ・ 根の活力を高める。

いちご

1、 株管理

- （1）摘葉は出蕾時5枚以上になるように実施する。（収穫時期は7～8枚管理とする。）
（2）2芽になるよう、わき芽を整理する。（ドロ芽は除去する。）
（3）頂果房の摘果は7～10果を目安に。
※ 株出来していない株で出蕾してしまった場合はきつめに摘果する。
（4）少量多灌水を基本とする。（給液量は吸水量の1.5倍を目安に）
（5）定期的に給液及び排液の確認をしてください。（EC、PH、排液量）
※ 適当な容器に入れ営農経済センターに御持ち込頂ければ、無料で測定致します。
※ 排液はバケツ等に1日溜めておいたものをお願いします。（1日の平均を見るため）



2、 ミツバチ管理

- （1）導入のタイミングは1番の出蕾を確認した時点です。
（2）到着後すぐには解放せず、蜜蜂が落ち着いたら夕方か夜、早朝に開放してください。
※解放までは、網窓にしておき通気性を確保する。
（3）ミツバチは導入後すぐに訪花せず、2～7日ほど偵察バチがハウス環境を確認してから、働きバチが訪花活動を行います。
（4）餌をあげすぎると、餌を巣穴にため込みすぎて次の子孫を残せなくなってしまう。訪花活動も鈍りますので、基準量をまもりましょう。（納品直後の巣箱の重さが概ね餌の入っている適正重。）
目安（どれどれ）：納品1週間後、その後7～10日間隔で給餌。150～200ml/回施用。
※日中のハウス内気温が18度以下になるハウスは2～3週間に1回。
（5）厳寒期は毛布などを巣箱にかぶせ保温してあげましょう。
（6）ミツバチの定着が悪い場合は、誘引剤を使いましょう。
（7）雨天が続く場合や、ハウス内気温が低い（18℃以下）日が続く場合はマルハナバチの導入もお勧めです。

3、 温度管理 基本の温度25℃～27℃（日中）を意識して、管理しましょう。

- （1）保温開始目安：最低気温が10℃を下回ってから（きらび香の場合は12℃です。）
→保温開始の目安のため、2番の検鏡を実施しましょう。

4、 病虫害防除 『被害が大きならない様に、早めの発見と早めの防除を心掛けましょう。』

☆★天敵利用のポイント★★

- ① ミヤコ、チリの活動温度は12℃以上です。（放飼時のハウス内温度管理に注意しましょう。）
② 放飼前にハダニの防除を徹底しておく。（ゼロ放飼をお願いします。）
③ 天敵放飼後2週間は薬剤散布を控え、定着を促す。
④ 放飼後にハダニが発生した場合は気門封鎖剤をスポット散布し、チリの追加放飼も有効です。

注意したい薬剤 ※一部抜粋です。この他にもありますので十分に調べてから散布してください。

薬剤名	RAC	収穫前日数	天敵（ミヤコ・チリ）	ミツバチ	マルハナバチ
グレーシア乳剤	30	前日	100日	1日	1日
モスピラン顆粒水溶剤	4A	前日	14日	1日	1～3日
カスケード乳剤	15	前日	ミヤコ（7日）	1～2日	2日
サンマイトフロアブル	21A	収穫開始3日前	30日	4日	1～4日
ゲッター水和剤	10・1	収穫開始21日前	14日	1日	1日

玄米品評会のお知らせ

開催日：11月 18日（金）

締 切：11月 15日（火）

規 格：玄米500g（うるちのみ）袋へ氏名・連絡先・品種名を明記してください

提出先：東部営農経済センター（担当：深井）