

2025年

月

作業開始

さやいんげん

生産履歴帳

0100110153-1

生産者(コード/氏名)	品種名(※栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		播種日		定植日		* * / * *
---------	--------	--	-----	--	-----	--	-----------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
コガネムシ類幼虫	ダイアジノン粒剤5	4～6 kg/10a	定植時	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
マメハモグリハエ	アフーム乳剤	2000 倍	1日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
ハダニ類	コテツフロアブル	2000 倍	1日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
ハダニ類	コロマイト乳剤	1500 倍	1日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
ハダニ類	ダニトロンフロアブル	1000～2000 倍	1日	1		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
アザミウマ類、アスキノメイカ、ハスモンヨトウ、ハモグリハエ類	ディアナSC	2500～5000 倍	1日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
ハスモンヨトウ	フェニックス顆粒水和剤	2000～4000 倍	1日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
シロイチモンジヨトウ、ハスモンヨトウ	プレオフロアブル	1000～2000 倍	1日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
カメムシ類、ハモグリハエ類、マメシキイガ	マラソン乳剤	1000 倍	7日	3				* * / * *	* * / * *

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--

2025年

さやいんげん

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 1 5 3 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
アブラムシ類	モスピラン顆粒水溶剤	2000～4000倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
さび病,灰色かび病,角斑病,菌核病	アフエツフロアブル	2000 倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
褐斑細菌病,黒腐病,軟腐病,斑点細菌病	コサイド3000	2000 倍	—		/	/	/	/	/
灰色かび病,菌核病	セイビアーフロアブル20	1000～1500倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

さやいんげん「野菜類 豆類(未成熟):未成熟なさや付き豆を収穫するもの」 いんげんまめ「野菜類 豆類(種実):成熟した種子を収穫するもの」

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

かりん

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 1 5 5 - 1

生産者(コード/氏名)		品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000				a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	定植日	/	管理()	/	管理()	/
---------	--------	---	-----	---	-------	---	-------	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	. kg		/	. kg
	/	. kg		/	. kg

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病虫害	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ハダニ類	アカリタッチ乳剤	1000～3000倍	1日		/	/	/	/	/
サビダニ類,ハダニ類	石灰硫黄合剤	20～40 倍	冬期		/	/	/	/	/
ハマキムシ類	ゼンターリ顆粒水和剤	1000 倍	1日		/	/	/	/	/
ケムシ類	デルフィン顆粒水和剤	1000 倍	1日		/	/	/	/	/
ケムシ類	ファイブスター顆粒水和剤	1000 倍	1日		/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

0 1 0 0 1 1 0 1 5 5 - 1

2025年 月 作業開始

バジル

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 1 5 7 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	播種日	/	定植日	/	/
---------	--------	---	-----	---	-----	---	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ハスモンヨトウ、 マメハモグリバエ	カスケード乳剤	4000 倍	3日	2	/	/	/	/	/
ハダニ類	コロマイト乳剤	2000 倍	1日	1	/	/	/	/	/
アブラムシ類、コナジラミ類	スタークル顆粒水溶剤	3000 倍	3日	2	/	/	/	/	/
アザミウマ類	スピノエース顆粒水和剤	10000 倍	3日	3	/	/	/	/	/
ハスモンヨトウ	プレオフロアブル	1000 倍	7日	2	/	/	/	/	/
ハスモンヨトウ	プレバソンフロアブル5	2000 倍	1日	3	/	/	/	/	/
褐斑細菌病、黒腐病、 軟腐病、斑点細菌病	コサイド3000	2000 倍	—		/	/	/	/	/
灰色かび病	ストロビーフロアブル	3000 倍	7日	2	/	/	/	/	/
うどんこ病 灰かび病	ハーモメイト水溶剤	800～1000 倍	1日		/	/	/	/	/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

バジル

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 1 5 7 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
菌核病	ロブラール水和剤	2000 倍	14日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

野菜類 葉菜類 しそ科葉菜類:茎葉を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 日 作業開始 豆類(未成熟) 生産履歴帳 0100110159 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		播種日		定植日		
---------	--------	----------------------	-----	----------------------	-----	----------------------	----------------------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
コガネムシ類幼虫	ダイアジノン粒剤5	4～6 kg/10a	定植時	2					
ハモグリバエ類	アフーム乳剤	2000 倍	3日	2					
ハダニ類	コテツフロアブル	2000 倍	1日	2					
ハダニ類	コロマイト乳剤	1500 倍	1日	2					
ハダニ類	ダニトロンフロアブル	1000～2000 倍	7日	1					
アザミウマ類,ハスモンヨトウ,ハモグリバエ類	ディアナSC	2500～5000 倍	1日	2					
ハスモンヨトウ	フェニックス顆粒水和剤	2000 倍	1日	2					
シロイチモンジヨトウ,ハスモンヨトウ	プレオフロアブル	1000～2000 倍	1日	2					
カメムシ類,ハモグリバエ類,マメシキイガ	マラソン乳剤	1000 倍	7日	3					

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------

2025年

豆類(未成熟) 生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 1 5 9 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
アザミウマ類	モスピラン顆粒水溶剤	4000 倍	7日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
さび病,灰色かび病,菌核病	アフエットフロアブル	2000 倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
褐斑細菌病,黒腐病,軟腐病,斑点細菌病	コサイド3000	2000 倍	—		/	/	/	/	/
灰色かび病	セイビアーフロアブル20	1000 倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

野菜類

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

果樹類

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 1 6 1 - 1

生産者(コード/氏名)		品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000				a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	定植日	/	管理()	/	管理()	/
---------	--------	---	-----	---	-------	---	-------	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後に単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病虫害	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ハダニ類	アカリタッチ乳剤	1000～3000倍	1日		/	/	/	/	/
サビダニ類,ハダニ類	石灰硫黄合剤	20～40 倍	冬期		/	/	/	/	/
ハマキムシ類	ゼンターリ顆粒水和剤	1000 倍	1日		/	/	/	/	/
ケムシ類	デルフィン顆粒水和剤	1000 倍	1日		/	/	/	/	/
ケムシ類	ファイブスター顆粒水和剤	1000 倍	1日		/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

0 1 0 0 1 1 0 1 6 1 - 1

2025年 月 作業開始 みょうが(花穂) 生産履歴帳 0100110162 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい) ■収穫開始予定月 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		播種日		定植日		
---------	--------	----------------------	-----	----------------------	-----	----------------------	----------------------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病虫害	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ネコブセンチュウ	ネマトリンエース粒剤	20 kg/10a	定植前	1					
根茎腐敗病	ユニフォーム粒剤	18 kg/10a	30日	2					
ハダニ類	アフーム乳剤	2000 倍	1日	2					
コナカイガラムシ類	アクタラ顆粒水溶剤	2000 倍	1日	3					
ハスモンヨトウ	カスケード乳剤	2000 倍	1日	3					
ハダニ類	コテツフロアブル	2000 倍	1日	2					
アザミウマ類	スピノエース顆粒水和剤	5000 倍	1日	2					
ハダニ類	ダニサラバフロアブル	1000 倍	1日	2					
アブラムシ類	チェス顆粒水和剤	5000 倍	1日	3					

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------

2025年

みょうが(花穂) 生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 1 6 2 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ハスモンヨトウ	フェニックス顆粒水和剤	2000 倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
紋枯病	アミスター20フロアブル	2000 倍 土壌灌注	3日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
褐斑細菌病,黒腐病, 軟腐病,斑点細菌病	コサイド3000	2000 倍	—		/	/	/	/	/
紋枯病	ダコニール1000	1000 倍	14日	4	/	/	/	/	* * / * *
いもち病	ベンレート水和剤	2000 倍	3日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
紋枯病	モンカットフロアブル40	2000 倍	3日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
根茎腐敗病	ランマンフロアブル	500 倍	3日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

野菜類:花穂を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

ピタヤ

生産履歴帳

0100110163-1

生産者(コード/氏名)	品種名(※栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		定植日		管理()		管理()
---------	--------	--	-----	--	-------	--	-------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病虫害	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
アブラムシ類	アドマイヤーフロアブル	2000 倍	7日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
ハマキムシ類	ゼンターリ顆粒水和剤	1000 倍	1日						
ケムシ類	デルフィン顆粒水和剤	1000 倍	1日						
炭腐症	アミスター10フロアブル	1000 倍	1日	3				* * / * *	* * / * *
炭腐病	ベンレート水和剤	2000 倍	14日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--

0 1 0 0 1 1 0 1 6 3 - 1

2025年 月 日 作業開始 パッションフルーツ 生産履歴帳 0100110164 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		定植日		管理()		管理()	
---------	--------	----------------------	-----	----------------------	-------	----------------------	-------	----------------------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病虫害	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ハダニ類	アタックオイル	100 倍							
アザミウマ類	アドマイヤー顆粒水和剤	10000 倍	7日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
ケムシ類	デルフィン顆粒水和剤	1000 倍	1日						
ケムシ類	ファイブスター顆粒水和剤	1000 倍	1日						
カイガラムシ類	モスピラン顆粒水溶剤	2000 倍	30日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
疫病	アミスター10フロアブル	1000 倍	1日	3				* * / * *	* * / * *
疫病	アリエッティ水和剤	800 倍	7日	3				* * / * *	* * / * *
疫病	ダコニール1000	1000 倍	14日	3				* * / * *	* * / * *
切り口及び傷口のゆ合促進	トップジンMペースト	1 倍		3				* * / * *	* * / * *

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------

パッションフルーツ 生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 1 6 4 - 1

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

[illegible]

果樹類：果実を収穫するもの（くだものとかいそう）

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

ししとう

生産履歴帳

0100110165-1

生産者(コード/氏名)	品種名(※栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		播種日		定植日		* * / * *
---------	--------	--	-----	--	-----	--	-----------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
コガネムシ類幼虫	ダイアジノン粒剤5	4～6 kg/10a	14日	3				* * / * *	* * / * *
オオタバコガ	アフーム乳剤	2000 倍	7日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
コナジラミ類	スタークル顆粒水溶剤	2000～3000 倍	1日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
オオタバコガ ハダニ類 ミカンキイロアザミウマ	コテツフロアブル	2000 倍	1日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
アブラムシ類、コナジラミ類	コルト顆粒水和剤	4000 倍	1日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
アザミウマ類、タバコガ類	プレオフロアブル	1000 倍	1日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
オオタバコガ	プレバソンフロアブル5	1000～2000 倍	1日	3				* * / * *	* * / * *
オオタバコガ	マツチ乳剤	2000 倍	1日	4					* * / * *
アザミウマ類、アブラムシ類、 コナジラミ類、チャノホコリダニ、ハダニ類	モベントフロアブル	2000 倍	1日	3				* * / * *	* * / * *

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--

2025年

ししとう

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 1 6 5 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
うどんこ病,斑点細菌病,斑点病	カスミンボルドー	1000 倍	1日	5	/	/	/	/	/
褐斑細菌病,黒腐病,軟腐病,斑点細菌病	コサイド3000	2000 倍	—		/	/	/	/	/
うどんこ病	ストロビーフロアブル	4000 倍	1日	2	/	/	* / *	* / *	* / *
うどんこ病	トリフミン水和剤	4000～5000 倍	1日	5	/	/	/	/	/
疫病	ランマンフロアブル	2000 倍	1日	4	/	/	/	/	* / *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

野菜類 とうがらし類:果実を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

サラダ菜

生産履歴帳

0100110166-1

生産者(コード/氏名)	品種名(※栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		播種日		定植日		* * / * *
---------	--------	--	-----	--	-----	--	-----------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ケラ、コガネムシ類 幼虫、ネキリムシ類	ダイアジノン粒剤5	6 kg/10a	播種時又は定植時	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
オオタバコガ、ナメグ リハエ、ハスモンヨトウ	アフーム乳剤	1000～2000倍	3日	3			* * / * *	* * / * *	* * / * *
アブラムシ類	ウララDF	2000倍	1日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
オオタバコガ、ハス モンヨトウ	カスケード乳剤	4000倍	3日	3			* * / * *	* * / * *	* * / * *
アザミウマ類、オオタバコガ、 ハスモンヨトウ、ハメグ リハエ類	ディアナSC	2500～5000倍	1日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
オオタバコガ、ハスモンヨトウ、 ハメグ リハエ類、ヨトウムシ	プレバソンフロアブル5	2000倍	1日	3			* * / * *	* * / * *	* * / * *
アザミウマ類、アブラ ムシ類、ナメグ リハエ	モスピラン顆粒水溶剤	4000倍	7日	1		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
すす枯病、灰色 かび病、菌核病	アフェットフロアブル	2000倍	1日	3			* * / * *	* * / * *	* * / * *
べと病、灰色か び病、菌核病	アミスター20フロアブル	2000倍	7日	4					* * / * *

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--

2025年

サラダ菜

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 1 6 6 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
褐斑細菌病,黒腐病,軟腐病,斑点細菌病	コサイド3000	2000 倍	—		/	/	/	/	/
軟腐病,腐敗病	スターナ水和剤	2000 倍	14日	2	/	/	* / *	* / *	* / *
灰色かび病,菌核病	トップジンM水和剤	1500～2000 倍	21日	2	/	/	* / *	* / *	* / *
すそ枯病,軟腐病,腐敗病	バリダシン液剤5	800 倍	3日	3	/	/	/	* / *	* / *
べと病	ランマンフロアブル	2000 倍	3日	3	/	/	/	* / *	* / *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

野菜類 葉菜類 レタス類 非結球レタス:茎葉を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

葉しょうが

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 1 6 7 - 1

生産者(コード/氏名)		品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000				a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		播種日		定植日		* * / * *
---------	--------	--	-----	--	-----	--	-----------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病虫害	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
根茎腐敗病	ガスタード微粒剤	30 kg/10a	定植21日前まで	1		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
ネコブセンチュウ	ネマトリンエース粒剤	20 kg/10a	植付前	1		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
紋枯病	モンカッタ粒剤	4 kg/10a	植付時	1		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
ハスモンヨトウ	アフアーム乳剤	2000 倍	7日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
アワノメイガ	オルトラン水和剤	1000 倍	21日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
根茎腐敗病	オラクル顆粒水和剤	2000 倍	3日	3				* * / * *	* * / * *
ハスモンヨトウ	トレボン乳剤	1000 倍	7日	3				* * / * *	* * / * *
褐斑細菌病,黒腐病,軟腐病,斑点細菌病	コサイド3000	2000 倍	—						
白星病	トリフミン水和剤	1000 倍	7日	3				* * / * *	* * / * *

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--

2025年

葉しょうが

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 1 6 7 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
紋枯病	モンカットフロアブル40	2000 倍	3日	4	/	/	/	/	* * / * *
根茎腐敗病	ランマンフロアブル	500～1000 倍	3日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

野菜類:生葉のついたまま若い根茎を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

月

作業開始

実えんどう

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 1 6 8 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	播種日	/	定植日	/	/
---------	--------	---	-----	---	-----	---	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
コガネムシ類幼虫	ダイアジノン粒剤5	4～6 kg/10a	定植時	2	/	/	/	/	/
ハモグリバエ類	アフーム乳剤	2000 倍	3日	2	/	/	/	/	/
ハスモンヨトウ, ハダニ類	コテツフロアブル	2000 倍	1日	2	/	/	/	/	/
ハダニ類	コロマイト乳剤	1500 倍	1日	2	/	/	/	/	/
ハダニ類	ダニトロンフロアブル	1000～2000 倍	7日	1	/	/	/	/	/
アザミウマ類, ハスモンヨトウ, ハモグリバエ類	ディアナSC	2500～5000 倍	1日	2	/	/	/	/	/
ハスモンヨトウ	フェニックス顆粒水和剤	2000 倍	1日	2	/	/	/	/	/
シロイチモンジヨトウ, ハスモンヨトウ	プレオフロアブル	1000～2000 倍	1日	2	/	/	/	/	/
カメムシ類, ハモグリバエ類, マメシキイガ	マラソン乳剤	1000 倍	7日	3	/	/	/	/	/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

実えんどう

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 1 6 8 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
アザミウマ類	モスピラン顆粒水溶剤	4000 倍	7日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
さび病,灰色かび病,菌核病	アフエットフロアブル	2000 倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
褐斑細菌病,黒腐病,軟腐病,斑点細菌病	コサイド3000	2000 倍	—		/	/	/	/	/
灰色かび病	セイビアーフロアブル20	1000 倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

実えんどう、さやえんどう:野菜類 豆類(未成熟) えんどうまめ:野菜類 豆類(種実) ※ それぞれで登録農薬の分類が異なります

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

月

作業開始

すいぜんじな

生産履歴帳

0100110169-1

生産者(コード/氏名)	品種名(※栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	播種日	/	定植日	/	/
---------	--------	---	-----	---	-----	---	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
アザミウマ類 アブラムシ類 マメハモグリバエ	ベストガード粒剤	9 kg/10a	3日	1	/	/	/	/	/
アザミウマ類 ハスモンヨトウ ハモグリバエ類	アフーム乳剤	2000 倍	1日	2	/	/	/	/	/
アブラムシ類	ウララDF	4000 倍	7日	2	/	/	/	/	/
ハダニ類	コテツフロアブル	2000 倍	1日	2	/	/	/	/	/
アブラムシ類	スタークル顆粒水溶剤	2000 倍	3日	2	/	/	/	/	/
アザミウマ類	スピノエース顆粒水和剤	5000 倍	1日	2	/	/	/	/	/
褐斑細菌病,黒腐病, 軟腐病,斑点細菌病	コサイド3000	2000 倍	—		/	/	/	/	/
黒斑病	ストロビーフロアブル	3000 倍	14日	2	/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

あずき

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 1 7 0 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		播種日		定植日		* * / * *
---------	--------	--	-----	--	-----	--	-----------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
カラス,ハト	キヒゲンR-2フロアブル	20 ml/kg		1		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
コガネムシ類幼虫	ダイアジノン粒剤5	4～6 kg/10a	60日	4					* * / * *
コナジラミ類	エコピタ液剤	100～200 倍	1日						
アオムシ,ウリノメイガ,オオタバコガ,コナガ,シロイチモンジヨトウ,ハスモンヨトウ	デルフィン顆粒水和剤	1000 倍	1日						
アブラムシ類 カメムシ類 ハスモンヨトウ	トレボン乳剤	1000 倍	14日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
アザミウマ類,アブラムシ類,コナジラミ類	モスピラン顆粒水溶剤	2000～4000 倍	14日	3				* * / * *	* * / * *
うどんこ病	ジーファイン水和剤	750～1000 倍	1日						
うどんこ病,褐斑病,炭疽病	ベルコート水和剤	1000 倍	7日	3				* * / * *	* * / * *

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--

あずき

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 1 7 0 - 1

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

[illegible]

野菜類 豆類(種実):成熟した種子を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

月

作業開始

茎ブロッコリー

生産履歴帳

0100110171-1

生産者(コード/氏名)	品種名(※栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月/日

■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	播種日	/	定植日	/	/
---------	--------	---	-----	---	-----	---	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病虫害	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ネキリムシ類	フォース粒剤	4 kg/10a	定植時	1	/	/	/	/	/
根こぶ病	オラクル粉剤	30 kg/10a	定植時	2	/	/	/	/	/
アオムシ	アディオン乳剤	2000 倍	7日	3	/	/	/	/	/
ハスモンヨトウ	アニキ乳剤	2000 倍	3日	3	/	/	/	/	/
アオムシ	コテツフロアブル	2000 倍	1日	2	/	/	/	/	/
アオムシ	ノーモルト乳剤	2000 倍	3日	2	/	/	/	/	/
アオムシ、アザミウマ類、オオタバコガ、コナガ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ	グレース乳剤	2000～3000 倍	7日	2	/	/	/	/	/
ハスモンヨトウ	プレオフロアブル	1000 倍	3日	2	/	/	/	/	/
ハスモンヨトウ	プレバソンフロアブル5	2000 倍	1日	3	/	/	/	/	/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

茎ブロッコリー 生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 1 7 1 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
アブラムシ類	モスピラン顆粒水溶剤	4000 倍	1日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
菌核病,黒すす病,根朽病	アフエットフロアブル	2000 倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
べと病	シグナムWDG	1500～2000 倍	7日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
軟腐病	Zボルドー	500～1000 倍	—		/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

野菜類 あぶらな科野菜(花蕾及び茎) はなやさい類:花蕾及び花茎を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

月

作業開始

らっかせい

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 1 7 2 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		播種日		定植日		* * / * *
---------	--------	--	-----	--	-----	--	-----------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
カラス,ハト	キヒゲンR-2フロアブル	20 ml/kg		1		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
コナジラミ類幼虫	オンコル粒剤5	9 kg/10a	播種時	1		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
白絹病	フロンサイド粉剤	20 kg/10a	45日	1		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
コナジラミ類	エコピタ液剤	100～200 倍	1日						
アオムシ,ウリノメイガ,オオタバコガ,コナガ,シロイチモンジヨトウ,ハスモンヨトウ	デルフィン顆粒水和剤	1000 倍	1日						
アブラムシ類 マメシクイガ	トレボン乳剤	1000 倍	14日	2		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
アザミウマ類,アブラムシ類,コナジラミ類	モスピラン顆粒水溶剤	2000～4000 倍	14日	3			* * / * *	* * / * *	* * / * *
褐斑細菌病,黒腐病,軟腐病,斑点細菌病	コサイド3000	2000 倍	—						
うどんこ病	ジーファイン水和剤	750～1000 倍	1日						

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--

2025年

らっかせい

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 1 7 2 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
汚斑病 灰色かび病	スミレックス水和剤	1000～2000倍	21日	4	/	/	/	/	* * / * *
褐斑病	ダコニール1000	500倍	14日	4	/	/	/	/	* * / * *
うどんこ病 褐斑病 炭疽病	ベルコート水和剤	1000倍	7日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
褐斑病	ベンレート水和剤	2000～3000倍	7日	4	/	/	/	/	* * / * *
灰色かび病	ロブラール水和剤	1000～1500倍	21日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

野菜類 豆類(種実):成熟した種子を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

だいで

生産履歴帳

0100110173-1

生産者(コード/氏名)	品種名(※栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		播種日		定植日		* * / * *
---------	--------	--	-----	--	-----	--	-----------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病虫害	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
カラス、ハト	キヒゲンR-2フロアブル	20 ml/kg		1		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
カメシ類 マメシクイガ	ダイアジノン粒剤5	4～6 kg/10a	30日	5					
コナジラミ類	エコピタ液剤	100～200 倍	1日						
アオムシ、ウリノメイガ、オオタバコガ、コナガ、シロイチモンジヨトウ、ハスモンヨトウ	デルフィン顆粒水和剤	1000 倍	1日						
カメシ類、マメシクイガ	トレボン乳剤	1000 倍	14日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
アブラムシ類	モスピラン顆粒水溶剤	2000～4000 倍	14日	3				* * / * *	* * / * *
うどんこ病、さび病、灰色かび病、菌核病	アフエットフロアブル	2000 倍	1日	3				* * / * *	* * / * *
紫斑病	アミスター20フロアブル	2000～3000 倍	7日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
うどんこ病	ジーファイン水和剤	750～1000 倍	1日						

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--

2025年

だいた

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 1 7 3 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
べと病、茎疫病	ランマンフロアブル	1000～2000倍	7日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

野菜類 豆類(種実):成熟した種子を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

月

作業開始

未成熟そらまめ

生産履歴帳

0100110174-1

生産者(コード/氏名)	品種名(※栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	播種日	/	定植日	/	/
---------	--------	---	-----	---	-----	---	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
コガネムシ類幼虫	ダイアジノン粒剤5	4～6 kg/10a	定植時	2	/	/	/	/	/
ハモグリバエ類	アフーム乳剤	2000 倍	3日	2	/	/	/	/	/
ハダニ類	コテツフロアブル	2000 倍	1日	2	/	/	/	/	/
ハダニ類	コロマイト乳剤	1500 倍	1日	2	/	/	/	/	/
ハダニ類	ダニトロンフロアブル	1000～2000 倍	7日	1	/	/	/	/	/
アザミウマ類,ハスモンヨトウ,ハモグリバエ類	ディアナSC	2500～5000 倍	1日	2	/	/	/	/	/
ハスモンヨトウ	フェニックス顆粒水和剤	2000 倍	1日	2	/	/	/	/	/
シロイチモンジヨトウ,ハスモンヨトウ	プレオフロアブル	1000～2000 倍	1日	2	/	/	/	/	/
カメムシ類,ハモグリバエ類,マメシキイガ	マラソン乳剤	1000 倍	7日	3	/	/	/	/	/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

未成熟そらまめ 生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 1 7 4 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
アザミウマ類	モスピラン顆粒水溶剤	4000 倍	7日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
さび病,灰色かび病,菌核病	アフエットフロアブル	2000 倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
褐斑細菌病,黒腐病,軟腐病,斑点細菌病	コサイド3000	2000 倍	—		/	/	/	/	/
灰色かび病	セイビアーフロアブル20	1000 倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

未成熟そら豆「野菜類 豆類(未成熟):未熟な種子(さや付きで収穫されるものを含む)を収穫するもの」 そらまめ「野菜類 豆類(種実):成熟した種子を収穫するもの」

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

月

作業開始

ローズマリー

生産履歴帳

0100110175-1

生産者(コード/氏名)	品種名(※栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日

■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	播種日	/	定植日	/	/
---------	--------	---	-----	---	-----	---	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
アブラムシ類	アグロスリン乳剤	2000 倍	7日	1	/	/	/	/	/
ハスモンヨトウ	カスケード乳剤	4000 倍	3日	2	/	/	/	/	/
ハダニ類	コロマイト乳剤	2000 倍	1日	1	/	/	/	/	/
アブラムシ類	スタークル顆粒水溶剤	3000 倍	3日	2	/	/	/	/	/
アザミウマ類	スピノエース顆粒水和剤	10000 倍	3日	3	/	/	/	/	/
褐斑細菌病,黒腐病,軟腐病,斑点細菌病	コサイド3000	2000 倍	—		/	/	/	/	/
灰色かび病	ストロビーフロアブル	3000 倍	7日	2	/	/	/	/	/
うどんこ病 灰色かび病	ハーモメイト水溶剤	800～1000 倍	1日		/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

きび

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 1 7 6 - 1

生産者(コード/氏名)		品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000				a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	播種日	/	定植日	/	/
---------	--------	---	-----	---	-----	---	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病虫害	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
アカシジカスミカメ	トレボン乳剤	1000 倍	14日	3	/	/	/	/	/
アワノメイガ	トアロー水和剤CT	1000 倍	1日		/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

きび

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 1 7 6 - 1

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

[illegible]

穀類 イネ科雑穀類:種子を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

月

作業開始

茶

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 1 7 7 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		管理()		管理()		管理()	
---------	--------	----------------------	-------	----------------------	-------	----------------------	-------	----------------------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病虫害	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
カンザワハダニ、チャノガ、サビダニ、ウンカ、スリップス	アグリメック	1000 倍	7日	1					
カイガラムシ類、チャトゲコナジラミ、チャノガ、サビダニ、チャノホコリダニ	アプロードエースフロアブル	1000 倍	14日	2					
ウンカ・スリップス	ウララDF	1000～2000 倍	7日	1					
ハマキムシ類・ウンカ・スリップス	カスケード乳剤	4000 倍	7日	2					
ウンカ・スリップス	コルト顆粒水和剤	2000～3000 倍	7日	2					
ヨモギエダシヤク・ハマキムシ類	サムコルフロアブル10	2000～4000 倍	3日	1					
ウンカ・スリップス・ツマゲロアオカシカメ	スタークル顆粒水溶剤	2000 倍	7日	2					
チャトゲコナジラミ・ハマキムシ類	ディアナSC	2500～5000 倍	1日	1					
チャノガ、サビダニ、チャノホコリダニ、チャトゲコナジラミ	ハチハチ乳剤	1000～1500 倍	14日	1					

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------

2025年

茶

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 1 7 7 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
カンザワハダニ	バロックフロアブル	1000～3000倍	14日	1	/	/	/	/	/
ハマキムシ類・ヨモギエダシヤク	ファルコンフロアブル	4000～8000倍	7日	2	/	/	/	/	/
クワシロカイガラムシ チャゲコナジラミ	プルートMC	1000倍	30日	1	/	/	/	/	/
カンザワハダニ・チャノナガサビダニ	マイトコーネフロアブル	1000倍	14日	1	/	/	/	/	/
カンザワハダニ	ミルベノック乳剤	1000倍	7日	1	/	/	/	/	/
輪斑病	アミスター20フロアブル	2000倍	14日	3	/	/	/	/	/
褐色円星病 炭疽病 もち病	インダーフロアブル	5000倍	7日	2	/	/	/	/	/
もち病 炭疽病	オンリーワンフロアブル	2000～3000倍	7日	2	/	/	/	/	/
褐色円星病・新梢枯死症(輪斑病菌による)炭疽病	カスミンボルドー	1000倍	14日	2	/	/	/	/	/
赤焼病 もち病 炭疽病 網もち病	ドイツボルドーA	500～1000倍	14日		/	/	/	/	/
もち病 新梢枯死症 炭疽病 網もち病	フロンサイドSC	2000倍	14日	1	/	/	/	/	/
カンザワハダニ・チャゲコナジラミ	マシン油乳剤	50～150倍 散布時期で異なる	秋整枝後		/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

新芽を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

月

作業開始

ぶんたん

生産履歴帳

0100110178-1

生産者(コード/氏名)	品種名(※栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	定植日	/	管理()	/	管理()	/
---------	--------	---	-----	---	-------	---	-------	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ケンキスイ類 コナカイラムシ類 ミカンハモグリカ	アクタラ顆粒水溶剤	2000～3000倍	14日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
カイラムシ類幼虫、ミカン トゲコナジラミ若齢幼虫	アプロードフロアブル	1000倍	45日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
ハダニ サビダニ	カネマイトフロアブル	1000～1500倍	7日	1	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
アブラムシ類、チャ ノキイロアザミウマ	キラップフロアブル	1000～2000倍	21日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
アザミウマ類(ネキアザミウ マを除く)、チャノホコリダニ、 ミカンサビダニ	コテツフロアブル	2000～6000倍	1日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
コナカイラムシ類、 チャノキイロアザミウマ	スタークル顆粒水溶剤	1000～2000倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
ハダニ	ダニエモンフロアブル	4000～6000倍	7日	1	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
アゲハ類 チャノキイロアザミウマ ミカンサビダニ	マツチ乳剤	2000～3000倍	21日	1	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
ミドリヒメコバイ	ロディー乳剤	2000倍	7日	4	/	/	/	/	* * / * *

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

ぶんたん

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 1 7 8 - 1

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病虫害	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
かいよう病 黒点病	ICボルドー412	50 倍	—		/	/	/	/	/
かいよう病	ICボルドー66D	25～200 倍	—		/	/	/	/	/
黒点病	エムダイファー水和剤	600～800 倍	90日	2	/	/	* */ * *	* */ * *	* */ * *
かいよう病	コサイド3000 +クレフノン200倍	2000 倍	—		/	/	/	/	/
灰色かび病	スイッチ顆粒水和剤	2000～3000 倍	45日	2	/	/	* */ * *	* */ * *	* */ * *
灰色かび病 そうか病	ストロビードライフロアブル	2000～3000 倍	14日	3	/	/	/	* */ * *	* */ * *
貯蔵病害	ベフラン液剤25	2000倍～3000倍	1日	2	/	/	* */ * *	* */ * *	* */ * *
黒点病	ペンコゼブ水和剤	600～800 倍	90日	4	/	/	/	/	* */ * *
設定なし	マデックEW	2000～3000 倍	10日	1	/	* */ * *	* */ * *	* */ * *	* */ * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

果樹類 かんきつ: 果実を収穫するもの(ざぼん、ぼんたん、晩白柚、うちむらさき)

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

月

作業開始

あけび(果実)

生産履歴帳

0100110179-1

生産者(コード/氏名)	品種名(※栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	定植日	/	管理()	/	管理()	/
---------	--------	---	-----	---	-------	---	-------	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ハダニ類	カネマイトフロアブル	1000 倍	3日	1	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
サビダニ ハダニ	石灰硫黄合剤	20～40 倍	冬季		/	/	/	/	/
ハマキムシ類	ゼンターリ顆粒水和剤	1000 倍	1日		/	/	/	/	/
ケムシ類	デルフィン顆粒水和剤	1000 倍	1日		/	/	/	/	/
アブラムシ類	テルスター水和剤	1000 倍	7日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
アブラムシ類	モスピラン顆粒水溶剤	4000 倍	7日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
そうか病	ジマンダイセン水和剤	500 倍	60日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
うどんこ病	トップジンM水和剤	1000 倍	7日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
					/	/	/	/	/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

月

作業開始

いちょう(種子)

生産履歴帳

0100110180-1

生産者(コード/氏名)	品種名(※栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日

■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	定植日	/	管理()	/	管理()	/
---------	--------	---	-----	---	-------	---	-------	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病虫害	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ハダニ類	アカリタッチ乳剤	1000～3000倍	1日		/	/	/	/	/
イチョウヒゲビロウドカミキリ成虫	アドマイヤーフロアブル	2000倍	1日	2	/	/	* */ * *	* */ * *	* */ * *
コウモリガ	スミチオン乳剤	樹幹散布100倍	60日	3	/	/	* */ * *	* */ * *	* */ * *
サビダニ類、ハダニ類	石灰硫黄合剤	20～40倍	冬期		/	/	/	/	/
ハマキムシ類	ゼンターリ顆粒水和剤	1000倍	1日		/	/	/	/	/
ケムシ類	デルフィン顆粒水和剤	1000倍	1日		/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

いちょう(種子) 生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 1 8 0 - 1

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

[illegible]

果樹類:種子を収穫するもの(ギンナン)

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

ざくろ

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 1 8 1 - 1

生産者(コード／氏名)		品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000				a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	定植日	/	管理()	/	管理()	/
---------	--------	---	-----	---	-------	---	-------	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病虫害	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ハダニ類	アカリタッチ乳剤	1000～3000倍	1日		/	/	/	/	/
サビダニ類,ハダニ類	石灰硫黄合剤	20～40倍	冬期		/	/	/	/	/
ハマキムシ類	ゼンターリ顆粒水和剤	1000倍	1日		/	/	/	/	/
ケムシ類	デルフィン顆粒水和剤	1000倍	1日		/	/	/	/	/
ケムシ類	ファイブスター顆粒水和剤	1000倍	1日		/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

ざくろ

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 1 8 1 - 1

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病虫害	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

果樹類:果実を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始 さんしょう(果実) 生産履歴帳 0100110182 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			

■農薬使用について(○で囲んで下さい) ■収穫開始予定月 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		播種日		定植日		* * / * *
---------	--------	--	-----	--	-----	--	-----------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後に単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病虫害	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ハダニ類	アカリタッチ乳剤	1000～3000倍	1日						
ミカンハダニ	アタックオイル	150倍	5-10月						
うどんこ病	エコピタ液剤	100倍	1日						
ハマキムシ類	ゼンターリ顆粒水和剤	1000倍	1日						
アザミウマ類,アブラムシ類	モスピラン顆粒水溶剤	4000倍	7日	1		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
さび病	Zボルドー	1000倍	—						

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--

さんしょう(果実) 生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 1 8 2 - 1

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

[illegible]

果樹類:果実を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

月

作業開始

パイナップル

生産履歴帳

0100110183-1

生産者(コード/氏名)	品種名(※栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	定植日	/	管理()	/	管理()	/
---------	--------	---	-----	---	-------	---	-------	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ハダニ類	アカリタッチ乳剤	1000～3000倍	1日		/	/	/	/	/
サビダニ類、ハダニ類	石灰硫黄合剤	20～40倍			/	/	/	/	/
ケムシ類	デルフィン顆粒水和剤	1000倍	1日		/	/	/	/	/
ケムシ類	ファイブスター顆粒水和剤	1000倍	1日		/	/	/	/	/
根腐萎凋病	オーソサイド水和剤80	500倍	21日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

0 1 0 0 1 1 0 1 8 3 - 1

2025年 月 作業開始

しろり

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 1 8 4 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		播種日		定植日		
---------	--------	----------------------	-----	----------------------	-----	----------------------	----------------------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
アブラムシ類	スタークル粒剤	植穴土壌混和 1～2 g	定植時	1					
アザミウマ類 ハスモンヨトウ ハダニ類	アフーム乳剤	2000 倍	1日	2					
ウリノメイガ ミナミキイロアザミウマ	カスケード乳剤	2000 倍	1日	1					
ハダニ類	カネマイトフロアブル	1000～1500 倍	1日	1					
ハダニ類 ミナミキイロアザミウマ	コテツフロアブル	2000 倍	1日	2					
アブラムシ類	チェス顆粒水和剤	5000 倍	1日	2					
ウリハムシ アブラムシ ハダニ	マラソン乳剤	1000 倍	1日	3					
アザミウマ類	モスピラン顆粒水溶剤	2000～4000 倍	1日	3					
うどんこ病 つる枯病 べと病 炭そ病	アミスター20フロアブル	1500～2000 倍	7日	4					

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------

2025年

しろり

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 1 8 4 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準で の薬量・倍率	使用時期 (～日前)	回数					
褐斑細菌病,黒腐病, 軟腐病,斑点細菌病	コサイド3000	2000 倍	—		/	/	/	/	/
うどんこ病	ダコニール1000	1000 倍	1日	4	/	/	/	/	* * / * *
うどんこ病 つる枯病 炭そ病	トップジンM水和剤	1500～2000 倍	1日	5	/	/	/	/	/
うどんこ病 つる枯病 炭そ病	トリフミン水和剤	3000～5000 倍	1日	5	/	/	/	/	/
うどんこ病 つる枯病 炭そ病	ベルコート水和剤	2000～4000 倍	3日	5	/	/	/	/	/
炭そ病	ベンレート水和剤	1000 倍 灌注	45日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

野菜類 うり類(未成熟): 果実を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

とうがん

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 1 8 5 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		播種日		定植日		
---------	--------	----------------------	-----	----------------------	-----	----------------------	----------------------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病虫害	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
アブラムシ類	スタークル粒剤	植穴土壌混和 1～2 g	定植時	1					
アザミウマ類 ハスモンヨトウ ハダニ類 ハモグリバエ類	アフーム乳剤	2000 倍	1日	2					
ミナミキイロアザミウマ	カスケード乳剤	2000 倍	3日	3					
ハダニ類	カネマイトフロアブル	1000～1500 倍	1日	1					
ハダニ類 ミナミキイロアザミウマ	コテツフロアブル	2000 倍	1日	2					
アブラムシ類	チェス顆粒水和剤	5000 倍	1日	2					
ウリハムシ	マラソン乳剤	1000 倍	1日	3					
アザミウマ類	モスピラン顆粒水溶剤	2000～4000 倍	1日	3					
うどんこ病 つる枯病 べと病 炭そ病	アミスター20フロアブル	1500～2000 倍	7日	4					

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------

2025年

とうがん

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 1 8 5 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準で の薬量・倍率	使用時期 (～日前)	回数					
褐斑細菌病,黒腐病, 軟腐病,斑点細菌病	コサイド3000	2000 倍	—		/	/	/	/	/
うどんこ病	ダコニール1000	1000 倍	1日	4	/	/	/	/	* * / * *
うどんこ病 つる枯病 炭そ病	トップジンM水和剤	1500～2000 倍	1日	5	/	/	/	/	/
うどんこ病 つる枯病 炭そ病	トリフミン水和剤	3000～5000 倍	1日	5	/	/	/	/	/
うどんこ病 つる枯病 炭そ病	ベルコート水和剤	2000～4000 倍	3日	5	/	/	/	/	/
炭そ病	ベンレート水和剤	1000 倍 灌注	45日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

野菜類 うり類(未成熟): 果実を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

月作業開始

はやとuri

生産履歴帳

0100110186-1

生産者(コード/氏名)	品種名(※栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	播種日	/	定植日	/	/
---------	--------	---	-----	---	-----	---	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
アブラムシ類	スタークル粒剤	植穴土壌混和 1～2 g	定植時	1	/	/	/	/	/
アザミウマ類 オオタバコガ ハスモンヨトウ ハダニ類	アフーム乳剤	2000 倍	1日	2	/	/	/	/	/
アブラムシ類	ウララDF	2000～4000 倍	1日	2	/	/	/	/	/
ミナミキイロアザミウマ	カスケード乳剤	2000 倍	3日	1	/	/	/	/	/
ハダニ類	カネマイトフロアブル	1000～1500 倍	1日	1	/	/	/	/	/
ハダニ類 ミナミキイロアザミウマ	コテツフロアブル	2000 倍	1日	2	/	/	/	/	/
アブラムシ類	チェス顆粒水和剤	5000 倍	1日	2	/	/	/	/	/
ウリハムシ	マラソン乳剤	1000 倍	1日	3	/	/	/	/	/
アザミウマ類	モスピラン顆粒水溶剤	2000～4000 倍	1日	3	/	/	/	/	/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

はやとうり

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 1 8 6 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
うどんこ病 つる枯病 べと病 炭そ病	アミスター20フロアブル	1500～2000倍	7日	4	/	/	/	/	* * / * *
褐斑細菌病,黒腐病, 軟腐病,斑点細菌病	コサイド3000	2000 倍	—		/	/	/	/	/
うどんこ病	ダコニール1000	1000 倍	1日	4	/	/	/	/	* * / * *
うどんこ病 つる枯病 炭そ病	トップジンM水和剤	1500～2000倍	1日	5	/	/	/	/	/
うどんこ病 つる枯病 炭そ病	トリフミン水和剤	3000～5000倍	1日	5	/	/	/	/	/
うどんこ病 つる枯病 炭そ病	ベルクート水和剤	2000～4000倍	3日	5	/	/	/	/	/
炭そ病	ベンレート水和剤	1000 倍 灌注	45日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

野菜類 うり類(未成熟): 果実を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

月

作業開始

オータムポエム

生産履歴帳

0100110187-1

生産者(コード/氏名)	品種名(※栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		播種日		定植日		* * / * *
---------	--------	--	-----	--	-----	--	-----------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ケラ	ダイアジノン粒剤5	6 kg/10a	は種時	1		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
アオムシコナガ ハイマダラノメイガ ヨトウムシ	アフーム乳剤	1000～2000倍	7日	2		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
コナガ	ディアナSC	2500～5000倍	1日	2		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
アオムシ、ウリノメイガ、オオタバコガ、コナガ、シロイチモンジ、ヨトウ、ハスモンヨトウ	デルフィン顆粒水和剤	1000倍	1日						
コナガ	フェニックス顆粒水和剤	2000～4000倍	1日	2		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
アオムシ、コナガ、ハスモンヨトウ	プレバソンフロアブル5	2000倍	1日	3			* * / * *	* * / * *	* * / * *
アブラムシ類	モスピラン顆粒水溶剤	4000倍	14日	1		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
白さび病	アミスター20フロアブル	2000倍	7日	2		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
褐斑細菌病、黒腐病、軟腐病、斑点細菌病	コサイド3000	2000倍	—						

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--

2025年

オータムポエム 生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 1 8 7 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
うどんこ病	ハーモメイト水溶剤	800～1000倍	1日		/	/	/	/	/
白さび病	ランマンフロアブル	2000倍	3日	3	/	/	/	* / *	* / *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

野菜類 葉菜類 非結球あぶらな科葉菜類 なばな類:茎葉及び花蕾を収穫するもの(アスパラ菜、愛味菜)

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

月

作業開始

こうさいたい

生産履歴帳

0100110188-1

生産者(コード/氏名)	品種名(※栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		播種日		定植日		* * / * *
---------	--------	--	-----	--	-----	--	-----------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病虫害	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ネキリムシ類	ダイアジノン粒剤5	6 kg/10a	は種時または定植時	1		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
アオムシ、コナガ、ハイマダラノメイガ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ	アフーム乳剤	1000～2000倍	7日	2		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
コナガ、ハスモンヨトウ	ディアナSC	2500～5000倍	1日	2		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
アオムシ、ウリノメイガ、オオタバコガ、コナガ、シロイチモンジヨトウ、ハスモンヨトウ	デルフィン顆粒水和剤	1000倍	1日						
コナガ	フェニックス顆粒水和剤	2000～4000倍	1日	2		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
アオムシ、コナガ、ハスモンヨトウ	プレバソンフロアブル5	2000倍	1日	3			* * / * *	* * / * *	* * / * *
アブラムシ類、カブラハバチ、キスジノミハムシ	モスピラン顆粒水溶剤	4000倍	14日	1		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
白さび病	アミスター20フロアブル	2000倍	7日	2		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
褐斑細菌病、黒腐病、軟腐病、斑点細菌病	コサイド3000	2000倍	—						

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--

2025年

こうさいたい

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 1 8 8 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
うどんこ病	ハーモメイト水溶剤	800～1000倍	1日		/	/	/	/	/
白さび病	ランマンフロアブル	2000倍	3日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

野菜類 葉菜類 非結球あぶらな科葉菜類 なばな類:茎葉及び花蕾を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

ひえ

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 1 8 9 - 1

生産者(コード/氏名)		品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000				a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	播種日	/	定植日	/	/
---------	--------	---	-----	---	-----	---	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病虫害	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
アワノメイガ	パダン粒剤4	4 kg/10a	21日	2	/	/	/	/	/
アワノメイガ	ゼンターリ顆粒水和剤	2000 倍	1日		/	/	/	/	/
イネヨウ	トアロー水和剤CT	1000 倍	1日		/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

ひえ

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 1 8 9 - 1

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

[illegible]

穀類 イネ科雑穀類:種子を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

とうがらし

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 1 9 0 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	播種日	/	定植日	/	/
---------	--------	---	-----	---	-----	---	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
コガネムシ類幼虫	ダイアジノン粒剤5	4～6 kg/10a	14日	3	/	/	/	/	/
オオタバコガ	アフーム乳剤	2000 倍	7日	2	/	/	/	/	/
オオタバコガ ハダニ類 ミナキイロアザミウマ	コテツフロアブル	2000 倍	1日	2	/	/	/	/	/
アブラムシ類	コルト顆粒水和剤	4000 倍	1日	2	/	/	/	/	/
コナジラミ類	スタークル顆粒水溶剤	2000～3000 倍	1日	2	/	/	/	/	/
オオタバコガ	プレバソンフロアブル5	1000～2000 倍	1日	3	/	/	/	/	/
タバコガ類 ミナキイロアザミウマ	プレオフロアブル	1000 倍	1日	2	/	/	/	/	/
オオタバコガ	マツチ乳剤	2000 倍	1日	4	/	/	/	/	/
アザミウマ類、アブラムシ類 コナジラミ類、チャノホコリダニ、ハダニ類	モベントフロアブル	2000 倍	1日	3	/	/	/	/	/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

とうがらし

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 1 9 0 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
うどんこ病,斑点細菌病,斑点病	カスミンボルドー	1000 倍	1日	5	/	/	/	/	/
褐斑細菌病,黒腐病,軟腐病,斑点細菌病	コサイド3000	2000 倍	—		/	/	/	/	/
うどんこ病	ストロビーフロアブル	4000 倍	1日	2	/	/	* / *	* / *	* / *
うどんこ病	トリフミン水和剤	4000～5000 倍	1日	5	/	/	/	/	/
疫病	ランマンフロアブル	2000 倍	1日	4	/	/	/	/	* / *
灰色かび病	ロブラール水和剤	2000 倍	3日	2	/	/	* / *	* / *	* / *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

野菜類 なす科果菜類 ピーマン及びとうがらし類:果実を収穫するもの。未成熟の状態で利用する甘味種

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

月

作業開始

からしな

生産履歴帳

0100110191-1

生産者(コード/氏名)	品種名(※栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	播種日	/	定植日	/	/
---------	--------	---	-----	---	-----	---	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ネキリムシ類	ダイアジノン粒剤5	6 kg/10a	は種時又は定植時	1	/	/	/	/	/
根こぶ病	オラクル粉剤	20～30 kg/10a	は種前又は定植時	2	/	/	/	/	/
アオムシ	アディオン乳剤	2000 倍	1日	3	/	/	/	/	/
アオムシ、アザミウマ類、コナガ、ハスモンヨトウ、ハモグリハエ類、ヨトウムシ	アフーム乳剤	1000～2000 倍	7日	3	/	/	/	/	/
アブラムシ類	ウララDF	4000 倍	1日	2	/	/	/	/	/
コナガ、ハスモンヨトウ	ディアナSC	2500～5000 倍	1日	2	/	/	/	/	/
コナガ	フェニックス顆粒水和剤	2000～4000 倍	1日	2	/	/	/	/	/
コナガ、ハスモンヨトウ	プレオフロアブル	1000 倍	7日	2	/	/	/	/	/
アオムシ、コナガ	マツチ乳剤	2000 倍	3日	3	/	/	/	/	/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

からしな

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 1 9 1 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
アブラムシ類、カブラハバチ、キスジノミハムシ	モスピラン顆粒水溶剤	4000 倍	7日	1	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
白さび病	アミスター20フロアブル	2000 倍	7日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
うどんこ病	ジーファイン水和剤	750～1000 倍	1日		/	/	/	/	/
白さび病	ランマンフロアブル	2000 倍	3日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

野菜類 葉菜類:茎葉(花茎がのびだす前のもの)を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

月

作業開始

さんとうさい

生産履歴帳

0100110192-1

生産者(コード/氏名)	品種名(※栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	播種日	/	定植日	/	/
---------	--------	---	-----	---	-----	---	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ネキリムシ類	ダイアジノン粒剤5	6 kg/10a	は種時又は定植時	1	/	/	/	/	/
根こぶ病	オラクル粉剤	20～30 kg/10a	は種前又は定植前	2	/	/	/	/	/
アオムシ	アディオン乳剤	2000～4000 倍	1日	3	/	/	/	/	/
アオムシ、アザミウマ類、コナガ、ハスモンヨトウ、ハモグリハエ類、ヨトウムシ	アフーム乳剤	1000～2000 倍	7日	3	/	/	/	/	/
アブラムシ類	ウララDF	4000 倍	1日	2	/	/	/	/	/
コナガ、ハスモンヨトウ	ディアナSC	2500～5000 倍	1日	2	/	/	/	/	/
コナガ	フェニックス顆粒水和剤	2000～4000 倍	1日	2	/	/	/	/	/
コナガ、ハスモンヨトウ	プレオフロアブル	1000 倍	7日	2	/	/	/	/	/
アオムシ、コナガ	マツチ乳剤	2000 倍	3日	3	/	/	/	/	/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

さんとうさい

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 1 9 2 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
アブラムシ類、カブラハバチ、キスジノミハムシ	モスピラン顆粒水溶剤	4000 倍	7日	1	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
白さび病	アミスター20フロアブル	2000 倍	7日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
うどんこ病	ジーファイン水和剤	750～1000 倍	1日		/	/	/	/	/
白さび病	ランマンフロアブル	2000 倍	3日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

野菜類 葉菜類:茎葉(花茎がのびだす前のもの)を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

てごろ菜

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 1 9 3 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		播種日		定植日		
---------	--------	----------------------	-----	----------------------	-----	----------------------	----------------------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ネキリムシ類	ダイアジノン粒剤5	6 kg/10a	は種時又は定植時	1					
根こぶ病	オラクル粉剤	20～30 kg/10a	は種前又は定植前	2					
アオムシ	アディオン乳剤	2000 倍	1日	3					
アオムシ、アザミウマ類、コナガ、ハスモンヨトウ、ハモグリバエ類、ヨトウムシ	アフーム乳剤	1000～2000 倍	7日	3					
アブラムシ類	ウララDF	4000 倍	1日	2					
コナガ、ハスモンヨトウ	ディアナSC	2500～5000 倍	1日	2					
コナガ	フェニックス顆粒水和剤	2000～4000 倍	1日	2					
コナガ、ハスモンヨトウ	プレオフロアブル	1000 倍	7日	2					
アオムシ、コナガ	マツチ乳剤	2000 倍	3日	3					

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------

2025年

てごろ菜

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 1 9 3 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
アブラムシ類、カブラハバチ、キスジノミハムシ	モスピラン顆粒水溶剤	4000 倍	7日	1	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
白さび病	アミスター20フロアブル	2000 倍	7日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
うどんこ病	ジーファイン水和剤	750～1000 倍	1日		/	/	/	/	/
白さび病	ランマンフロアブル	2000 倍	3日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

野菜類 葉菜類:茎葉(花茎がのびだす前のもの)を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

べんり菜

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 1 9 4 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		播種日		定植日		
---------	--------	----------------------	-----	----------------------	-----	----------------------	----------------------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ネキリムシ類	ダイアジノン粒剤5	6 kg/10a	は種時又は定植時	1					
根こぶ病	オラクル粉剤	20～30 kg/10a	は種前又は定植前	2					
アオムシ	アディオン乳剤	2000 倍	1日	3					
アオムシ、アザミウマ類、コナガ、ハスモンヨトウ、ハモグリバエ類、ヨトウムシ	アフーム乳剤	1000～2000 倍	7日	3					
アブラムシ類	ウララDF	4000 倍	1日	2					
コナガ、ハスモンヨトウ	ディアナSC	2500～5000 倍	1日	2					
コナガ	フェニックス顆粒水和剤	2000～4000 倍	1日	2					
コナガ、ハスモンヨトウ	プレオフロアブル	1000 倍	7日	2					
アオムシ、コナガ	マツチ乳剤	2000 倍	3日	3					

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------

2025年

べんり菜

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 1 9 4 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
アブラムシ類、カブラハバチ、キスジノミハムシ	モスピラン顆粒水溶剤	4000 倍	7日	1	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
白さび病	アミスター20フロアブル	2000 倍	7日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
うどんこ病	ジーファイン水和剤	750～1000 倍	1日		/	/	/	/	/
白さび病	ランマンフロアブル	2000 倍	3日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

野菜類 葉菜類:茎葉(花茎がのびだす前のもの)を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

みぶな

生産履歴帳

0100110195-1

生産者(コード/氏名)	品種名(※栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		播種日		定植日		* * / * *
---------	--------	--	-----	--	-----	--	-----------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ネキリムシ類	ダイアジノン粒剤5	6 kg/10a	は種又は定植時	1		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
根こぶ病	オラクル粉剤	20～30 kg/10a	は種又は定植前	2		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
アオムシ、アザミウマ類、コナガ、ハスモンヨトウ、ハモグリバエ類、ヨトウムシ	アフーム乳剤	1000～2000 倍	7日	3			* * / * *	* * / * *	* * / * *
アブラムシ類	ウララDF	4000 倍	1日	2		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
コナガ、ハスモンヨトウ	ディアナSC	2500～5000 倍	1日	2		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
コナガ	プレバソンフロアブル5	2000 倍	1日	2		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
アブラムシ類、カブラハバチ、キスジノミハムシ	モスピラン顆粒水溶剤	4000 倍	7日	1		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
白さび病	アミスター20フロアブル	2000 倍	7日	2		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
褐斑細菌病、黒腐病、軟腐病、斑点細菌病	コサイド3000	2000 倍	—						

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--

2025年

みぶな

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 1 9 5 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
うどんこ病	ジーファイン水和剤	750～1000倍	1日		/	/	/	/	/
炭疽病,白斑病	ベンレート水和剤	4000倍	14日	1	/	* / *	* / *	* / *	* / *
白さび病	ランマンフロアブル	2000倍	3日	3	/	/	/	* / *	* / *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

野菜類 葉菜類:茎葉(花茎がのびだす前のもの)を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

ルッコラ

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 1 9 6 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	播種日	/	定植日	/	/
---------	--------	---	-----	---	-----	---	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ネキリムシ類	ダイアジノン粒剤5	6 kg/10a	は種時又は定植時	1	/	/	/	/	/
根こぶ病	オラクル粉剤	20～30 kg/10a	は種前又は定植前	2	/	/	/	/	/
アオムシ	アディオン乳剤	2000 倍	1日	3	/	/	/	/	/
アオムシ、アザミウマ類、コナガ、ハスモンヨトウ、ハモグリハエ類、ヨトウムシ	アフーム乳剤	1000～2000 倍	7日	3	/	/	/	/	/
アブラムシ類	ウララDF	4000 倍	1日	2	/	/	/	/	/
コナガ、ハスモンヨトウ	ディアナSC	2500～5000 倍	1日	2	/	/	/	/	/
コナガ	フェニックス顆粒水和剤	2000～4000 倍	1日	2	/	/	/	/	/
コナガ、ハスモンヨトウ	プレオフロアブル	1000 倍	7日	2	/	/	/	/	/
アオムシ、コナガ	マツチ乳剤	2000 倍	3日	3	/	/	/	/	/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

ルッコラ

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 1 9 6 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
アブラムシ類、カブラハバチ、キスジノミハムシ	モスピラン顆粒水溶剤	4000 倍	7日	1	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
白さび病	アミスター20フロアブル	2000 倍	7日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
うどんこ病	ジーファイン水和剤	750～1000 倍	1日		/	/	/	/	/
白さび病	ランマンフロアブル	2000 倍	3日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

野菜類 葉菜類:茎葉(花茎がのびだす前のもの)を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

わさびな

生産履歴帳

0100110197-1

生産者(コード/氏名)	品種名(※栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		播種日		定植日		
---------	--------	----------------------	-----	----------------------	-----	----------------------	----------------------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ネキリムシ類	ダイアジノン粒剤5	6 kg/10a	は種時又は定植時	1					
根こぶ病	オラクル粉剤	20～30 kg/10a	は種前又は定植前	2					
アオムシ	アディオン乳剤	2000 倍	1日	3					
アオムシ、アザミウマ類、コナガ、ハスモンヨトウ、ハモグリバエ類、ヨトウムシ	アフーム乳剤	1000～2000 倍	7日	3					
アブラムシ類	ウララDF	4000 倍	1日	2					
コナガ、ハスモンヨトウ	ディアナSC	2500～5000 倍	1日	2					
コナガ	フェニックス顆粒水和剤	2000～4000 倍	1日	2					
コナガ、ハスモンヨトウ	プレオフロアブル	1000 倍	7日	2					
アオムシ、コナガ	マツチ乳剤	2000 倍	3日	3					

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------

2025年

わさびな

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 1 9 7 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
アブラムシ類、カブラハバチ、キスジノミハムシ	モスピラン顆粒水溶剤	4000 倍	7日	1	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
白さび病	アミスター20フロアブル	2000 倍	7日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
うどんこ病	ジーファイン水和剤	750～1000 倍	1日		/	/	/	/	/
白さび病	ランマンフロアブル	2000 倍	3日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

野菜類 葉菜類:茎葉(花茎がのびだす前のもの)を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

月

作業開始

かきちしゃ

生産履歴帳

0100110198-1

生産者(コード/氏名)	品種名(※栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	播種日	/	定植日	/	/
---------	--------	---	-----	---	-----	---	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ケラ、コガネムシ類 幼虫、ネキリムシ類	ダイアジノン粒剤5	6 kg/10a	播種時又は定植時	2	/	/	/	/	/
オオタバコガ、ナメグ リハエ、ハスモンヨトウ	アフーム乳剤	1000～2000倍	3日	3	/	/	/	/	/
アブラムシ類	ウララDF	2000倍	1日	2	/	/	/	/	/
オオタバコガ、ハス モンヨトウ	カスケード乳剤	4000倍	3日	3	/	/	/	/	/
アザミウマ類、オオタバコガ、 ハスモンヨトウ、ハメグ リハエ類	ディアナSC	2500～5000倍	1日	2	/	/	/	/	/
オオタバコガ、ハスモンヨトウ、 ハメグ リハエ類、ヨトウムシ	プレバソンフロアブル5	2000倍	1日	3	/	/	/	/	/
アザミウマ類、アブラ ムシ類、ナメグ リハエ	モスピラン顆粒水溶剤	4000倍	7日	1	/	/	/	/	/
すす枯病、灰色 かび病、菌核病	アフエットフロアブル	2000倍	1日	3	/	/	/	/	/
べと病、灰色か び病、菌核病	アミスター20フロアブル	2000倍	7日	4	/	/	/	/	/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

かきちしゃ

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 1 9 8 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
褐斑細菌病,黒腐病,軟腐病,斑点細菌病	コサイド3000	2000 倍	—		/	/	/	/	/
軟腐病,腐敗病	スターナ水和剤	2000 倍	14日	2	/	/	* / *	* / *	* / *
灰色かび病,菌核病	トップジンM水和剤	1500～2000 倍	21日	2	/	/	* / *	* / *	* / *
すそ枯病,軟腐病,腐敗病	バリダシン液剤5	800 倍	3日	3	/	/	/	* / *	* / *
べと病	ランマンフロアブル	2000 倍	3日	3	/	/	/	* / *	* / *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

野菜類 葉菜類 レタス類 非結球レタス:葉を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

あしたば

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 1 9 9 - 1

生産者(コード/氏名)		品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000				a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	播種日	/	定植日	/	/
---------	--------	---	-----	---	-----	---	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病虫害	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ウドノメイガ	コテツフロアブル	2000 倍	7日	2	/	/	/	/	/
ハダニ類	コロマイト乳剤	2000 倍	1日	1	/	/	/	/	/
アブラムシ類	トレボン乳剤	2000 倍	14日	3	/	/	/	/	/
ヨトウムシ	プレバソンフロアブル5	2000 倍	7日	1	/	/	/	/	/
アブラムシ類	モスピラン顆粒水溶剤	4000 倍	1日	3	/	/	/	/	/
葉枯病	ロブラール水和剤	1000 倍	7日	3	/	/	/	/	/
軟腐病	Zボルドー	500～1000 倍	—		/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

うど

生産履歴帳

0100110200-1

生産者(コード/氏名)	品種名(※栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい) ■収穫開始予定月 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		播種日		定植日		* * / * *
---------	--------	--	-----	--	-----	--	-----------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
アブラムシ類	アドマイヤーフロアブル	2000 倍	60日	3				* * / * *	* * / * *
アオムシ、ウリノメイガ、オオタバコガ、コナガ、シロイチモンジ、ヨトウ、ハスモンヨトウ	デルフィン顆粒水和剤	1000 倍	1日						
アブラムシ類	トレボン乳剤	1000 倍	45日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
べと病、褐斑細菌病、黒斑細菌病、黒腐病、斑点細菌病	Zボルドー	500 倍	—						
黒斑病	ロブラール水和剤	1000 倍	50日	3				* * / * *	* * / * *

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--

うど

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 0 0 - 1

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

[illegible]

野菜類 茎野菜類：若い茎葉部を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始 さんしょう(葉) 生産履歴帳 0 1 0 0 1 1 0 2 0 1 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい) ■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	播種日	/	定植日	/	/
---------	--------	---	-----	---	-----	---	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ハダニ類 うどんこ病	アカリタッチ乳剤	1000～3000倍	1日		/	/	/	/	/
アブラムシ類、うどんこ病、ハダニ類	エコピタ液剤	100倍	1日		/	/	/	/	/
アオムシ、コナガ、ヨトウムシ	ゼンターリ顆粒水和剤	1000～2000倍	1日		/	/	/	/	/
アオムシ、ウリノメイガ、オオタバコガ、コナガ、シロイチモンジヨトウ、ハスモンヨトウ	デルフィン顆粒水和剤	1000倍	1日		/	/	/	/	/
アオムシ、コナガ	バシレックス水和剤	1000～2000倍	1日		/	/	/	/	/
うどんこ病	カリグリーン	800～1000倍	1日		/	/	/	/	/
褐斑細菌病	コサイド3000	2000倍	—		/	/	/	/	/
うどんこ病	ジーファイン水和剤	750～1000倍	1日		/	/	/	/	/
うどんこ病	ハーモメイト水溶剤	800～1000倍	1日		/	/	/	/	/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

0 1 0 0 1 1 0 2 0 1 - 1

2025年 月 作業開始

食用アロエ

生産履歴帳

0100110202 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい) ■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用										
---------	--------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病虫害	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ハダニ類	アカリタッチ乳剤	1000～3000倍	1日						
アブラムシ類、うどんこ病、ハダニ類	エコピタ液剤	100倍	1日						
アオムシ、コナガ、ヨトウムシ	ゼンターリ顆粒水和剤	1000～2000倍	1日						
アオムシ、ウリノメイガ、オオタバコガ、コナガ、シロイチモンジヨトウ、ハスモンヨトウ	デルフィン顆粒水和剤	1000倍	1日						
アオムシ、コナガ	バシレックス水和剤	1000～2000倍	1日						
うどんこ病、さび病	カリグリーン	800～1000倍	1日						
褐斑細菌病、黒腐病、軟腐病、斑点細菌病	コサイド3000	2000倍	—						
うどんこ病	ジーファイン水和剤	750～1000倍	1日						
うどんこ病	ハーモメイト水溶剤	800～1000倍	1日						

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------

0 1 0 0 1 1 0 2 0 2 - 1

2025年 月 作業開始

食用ゆり

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 0 3 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	播種日	/	定植日	/	/
---------	--------	---	-----	---	-----	---	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ハダニ類 うどんこ病	アカリタッチ乳剤	1000～3000倍	1日		/	/	/	/	/
アブラムシ類、うどんこ病、ハダニ類	エコピタ液剤	100倍	1日		/	/	/	/	/
アオムシ、コナガ、ヨトウムシ	ゼンターリ顆粒水和剤	1000～2000倍	1日		/	/	/	/	/
アオムシ、ウリノメイガ、オオタバコガ、コナガ、シロイチモンジヨトウ、ハスモンヨトウ	デルフィン顆粒水和剤	1000倍	1日		/	/	/	/	/
アオムシ、コナガ	バシレックス水和剤	1000～2000倍	1日		/	/	/	/	/
うどんこ病	カリグリーン	800～1000倍	1日		/	/	/	/	/
褐斑細菌病、黒腐病、軟腐病、斑点細菌病	コサイド3000	2000倍	—		/	/	/	/	/
うどんこ病	ジーファイン水和剤	750～1000倍	1日		/	/	/	/	/
うどんこ病	ハーモメイト水溶剤	800～1000倍	1日		/	/	/	/	/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

0 1 0 0 1 1 0 2 0 3 - 1

2025年

月

作業開始

ぜんまい

生産履歴帳

0100110204-1

生産者(コード/氏名)	品種名(※栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		播種日		定植日		* * / * *
---------	--------	--	-----	--	-----	--	-----------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ハダニ類 うどんこ病	アカリタッチ乳剤	1000～3000倍	1日						
アブラムシ類、うどんこ病、ハダニ類	エコピタ液剤	100倍	1日						
アオムシ、ウリナメイガ、オオタバコガ、コナガ、シロイチモンジヨトウ、ハスモンヨトウ	デルフィン顆粒水和剤	1000倍	1日						
褐斑細菌病、黒腐病、軟腐病、斑点細菌病	コサイド3000	2000倍	—						
さび病	ハーモメイト水溶剤	800倍	1日						

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--

2025年

ぜんまい

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 0 4 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

野菜類 茎野菜類:葉を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

たらのき

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 0 5 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	管理()	/	管理()	/	管理()	/
---------	--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病虫害	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ハダニ類	アカリタッチ乳剤	1000～3000倍	1日		/	/	/	/	/
アブラムシ類,うどんこ病,ハダニ類	エコピタ液剤	100倍	1日		/	/	/	/	/
アオムシ,コナガ,ヨトウムシ	ゼンターリ顆粒水和剤	1000～2000倍	1日		/	/	/	/	/
アオムシ,ウリノメイガ,オオタバコガ,コナガ,シロイチモンジヨトウ,ハスモンヨトウ	デルフィン顆粒水和剤	1000倍	1日		/	/	/	/	/
アオムシ,コナガ	バシレックス水和剤	1000～2000倍	1日		/	/	/	/	/
うどんこ病	カリグリーン	800～1000倍	1日		/	/	/	/	/
褐斑細菌病,黒腐病,軟腐病,斑点細菌病	コサイド3000	2000倍	—		/	/	/	/	/
うどんこ病	ジーファイン水和剤	750～1000倍	1日		/	/	/	/	/
うどんこ病	ハーモメイト水溶剤	800～1000倍	1日		/	/	/	/	/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

たらのき

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 0 5 - 1

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

[illegible]

野菜類:新芽を収穫するもの(たらのめ 含む)

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

月

作業開始

のびる

生産履歴帳

0100110206-1

生産者(コード/氏名)	品種名(※栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日

■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		播種日		定植日		* * / * *
---------	--------	--	-----	--	-----	--	-----------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病虫害	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ハダニ類 うどんこ病	アカリタッチ乳剤	1000～3000倍	1日						
アブラムシ類、うどんこ病、ハダニ類	エコピタ液剤	100倍	1日						
アオムシ、ウリナメカ、オオタバコガ、コナガ、シロイチモンジヨトウ、ハスモンヨトウ	デルフィン顆粒水和剤	1000倍	1日						
褐斑細菌病、黒腐病、軟腐病、斑点細菌病	コサイド3000	2000倍	—						
うどんこ病、軟腐病、白さび病	ジーファイン水和剤	750～1000倍	1日						

農薬散布後
収穫予定日農薬散布後
収穫予定日農薬散布後
収穫予定日農薬散布後
収穫予定日農薬散布後
収穫予定日

0 1 0 0 1 1 0 2 0 6 - 1

2025年 月 作業開始

葉にんにく

生産履歴帳

0100110207-1

生産者(コード/氏名)	品種名(※栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	播種日	/	定植日	/	*/	*/
---------	--------	---	-----	---	-----	---	----	----

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ネキリムシ類	ダイアジノン粒剤5 (にんにく使用不可)	9 kg/10a	植付前	1	/	*/	*/	*/	*/
フザリウム・リゾクトニア菌による病害	ベンレートT水和剤20	0.4～0.5 %/乾燥種子重量	播種前	1	/	*/	*/	*/	*/
ハダニ類	アカリタッチ乳剤	1000～3000 倍	1日		/	/	/	/	/
ネギアザミウマ	アグロスリン乳剤 (にんにく使用不可)	2000 倍	1日	3	/	/	/	*/	*/
ハダニ類	コテツフロアブル (にんにく使用不可)	2000 倍	14日	1	/	*/	*/	*/	*/
アオムシ、ウリノメイガ、オオタバコガ、コナガ、シロイチモンジヨトウ、ハスモンヨトウ	デルフィン顆粒水和剤	1000 倍	1日		/	/	/	/	/
褐斑細菌病、黒腐病、軟腐病、斑点細菌病	コサイド3000	2000 倍	—		/	/	/	/	/
さび病	ストロビーフロアブル	2000 倍	14日	3	/	/	/	*/	*/
うどんこ病	ハーモメイト水溶剤	800～1000 倍	1日		/	/	/	/	/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 日 作業開始 ふき(ふきのとう) 生産履歴帳 0100110208 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい) ■収穫開始予定月 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		播種日		定植日		* * / * *
---------	--------	----------------------	-----	----------------------	-----	----------------------	-----------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病虫害	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ハダニ類	アカリタッチ乳剤	1000～3000倍	1日						
アブラムシ類,うどんこ病,ハダニ類	エコピタ液剤	100倍	1日						
アオムシ,コナガ,ヨトウムシ	ゼンターリ顆粒水和剤	1000～2000倍	1日						
アオムシ,ウリノメイガ,オオタバコガ,コナガ,シロイチモンジヨトウ,ハスモンヨトウ	デルフィン顆粒水和剤	1000倍	1日						
アオムシ,コナガ	バシレックス水和剤	1000～2000倍	1日						
うどんこ病	カリグリーン	800～1000倍	1日						
褐斑細菌病,黒腐病,軟腐病,斑点細菌病	コサイド3000	2000倍	—						
うどんこ病	ジーファイン水和剤	750～1000倍	1日						
うどんこ病	ハーモメイト水溶剤	800～1000倍	1日						

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------

ふき(ふきのとう) 生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 0 8 - 1

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

[illegible]

野菜類:ふきのとうを収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

まくわうり

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 0 9 - 1

生産者(コード/氏名)		品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000				a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	播種日	/	定植日	/	/
---------	--------	---	-----	---	-----	---	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病虫害	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
アブラムシ類	アドマイヤー1粒剤	1 g/株	定植時	1	/	/	/	/	/
アオムシ、ウリノメイガ、オオタバコガ、コナガ、シロイチモンジヨトウ、ハスモンヨトウ	デルフィン顆粒水和剤	1000 倍	1日		/	/	/	/	/
アブラムシ類	モスピラン顆粒水溶剤	4000 倍	1日	2	/	/	/	/	/
褐斑細菌病、黒腐病、軟腐病、斑点細菌病	コサイド3000	2000 倍	—		/	/	/	/	/
つる枯病	トップジンMペースト	原液塗布	発病初期	5	/	/	/	/	/
うどんこ病 灰色かび病	ハーモメイト水溶剤	800 倍	1日		/	/	/	/	/
うどんこ病	モレスタン水和剤	2000～4000 倍	3日	10	/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

まくわうり

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 0 9 - 1

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

[illegible]

野菜類 うり類 うり類(成熟):成熟した果実を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始 やまのいも(むかご) 生産履歴帳 0100110210 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい) ■収穫開始予定月 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		播種日		定植日		
---------	--------	----------------------	-----	----------------------	-----	----------------------	----------------------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
褐色腐敗病 青かび病	ベンレートT水和剤20	100～200 倍	植付前	1					
ネコブセンチュウ	ネマトリンエース粒剤	20 kg/10a	植付前	1					
タネバエ	フォース粒剤	4 kg/10a	植付時	1					
ナガイモコガ	アタブロン乳剤	2000 倍	7日	3					
カンザワハタニ ナガイモコガ	コテツフロアブル	2000 倍	3日	2					
カンザワハタニ	コロマイト乳剤	1000 倍	7日	2					
アオムシ、ウリノメイガ、オオタバコガ、コナガ、シロイチモン、ヨトウ、ハスモンヨトウ	デルフィン顆粒水和剤	1000 倍	1日						
アブラムシ類 ヤマノイモコガ	トレボン乳剤	1000 倍	14日	3					
ナガイモコガ	フェニックス顆粒水和剤	2000～4000 倍	14日	2					

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------

2025年

やまのいも(むかご) 生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 1 0 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
アザミウマ類	モスピラン顆粒水溶剤	4000 倍	21日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
炭疽病,葉渋病	オンリーワンフロアブル	1000 倍	7日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
葉渋病	ストロビーフロアブル	2000 倍	7日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
べと病,褐斑細菌病,黒斑細菌病,黒腐病,斑点細菌病	Zボルドー	500 倍	—		/	/	/	/	/
葉渋病	フロンサイド水和剤	2000 倍	7日	4	/	/	/	/	* * / * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

野菜類:むかご(肉芽)を収穫するもの ※「やまのいも」とは登録分類が異なります

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

わらび

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 1 1 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		播種日		定植日		* * / * *
---------	--------	--	-----	--	-----	--	-----------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ハダニ類 うどんこ病	アカリタッチ乳剤	1000～3000倍	1日						
ナガセンマイハバチ	スミチオン乳剤	1000倍	90日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
アオムシ、ウリノメイガ、オオタバコガ、コナガ、シロイチモンジヨトウ、ハスモンヨトウ	デルフィン顆粒水和剤	1000倍	1日						
うどんこ病 さび病	カリグリーン	800～1000倍	1日						
褐斑細菌病、黒腐病、軟腐病、斑点細菌病	コサイド3000	2000倍	—						

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--

わらび

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 1 1 - 1

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

[illegible]

野菜類 茎野菜類:葉を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

えのきたけ

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 1 2 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	植菌日	/	管理()	/	管理()	/
---------	--------	---	-----	---	-------	---	-------	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病虫害	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
トリコデルマ菌によるほだ木の障害	きのこ用ベンレート水和剤	1000 倍	30日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

エリンギ

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 1 3 - 1

生産者(コード／氏名)		品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000				a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	植菌日	/	管理()	/	管理()	/
---------	--------	---	-----	---	-------	---	-------	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
トリコデルマ菌による生育障害	きのこ用ベンレート水和剤	培地量0.02%	培地調整時	1	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

エリング

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 1 3 - 1

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

[illegible]

きのこ類:子実体(きのこ)を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日			/			農薬散布後 収穫予定日			/			農薬散布後 収穫予定日			/			農薬散布後 収穫予定日			/			農薬散布後 収穫予定日			/		
----------------	--	--	---	--	--	----------------	--	--	---	--	--	----------------	--	--	---	--	--	----------------	--	--	---	--	--	----------------	--	--	---	--	--

2025年 月 作業開始

なめこ

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 1 4 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		植菌日		管理()		管理()
---------	--------	--	-----	--	-------	--	-------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病虫害	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
トリコデルマ菌によるほだ木の障害	きのこ用ベンレート水和剤	1000 倍	30日	3				* * / * *	* * / * *

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--

なめこ

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 1 4 - 1

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

[illegible]

きのこ類:子実体(きのこ)を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日			/			農薬散布後 収穫予定日			/			農薬散布後 収穫予定日			/			農薬散布後 収穫予定日			/			農薬散布後 収穫予定日			/		
----------------	--	--	---	--	--	----------------	--	--	---	--	--	----------------	--	--	---	--	--	----------------	--	--	---	--	--	----------------	--	--	---	--	--

2025年 月 作業開始

ひらたけ

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 1 5 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	植菌日	/	管理()	/	管理()	/
---------	--------	---	-----	---	-------	---	-------	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
トリコデルマ菌によるほだ木の障害	きのこ用ベンレート水和剤	1000 倍	30日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

ひらたけ

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 1 5 - 1

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

[illegible]

きのこ類:子実体(きのこ)を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日			/			農薬散布後 収穫予定日			/			農薬散布後 収穫予定日			/			農薬散布後 収穫予定日			/			農薬散布後 収穫予定日			/		
----------------	--	--	---	--	--	----------------	--	--	---	--	--	----------------	--	--	---	--	--	----------------	--	--	---	--	--	----------------	--	--	---	--	--

2025年 月 作業開始

ぶなしめじ

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 1 6 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	植菌日	/	管理()	/	管理()	/
---------	--------	---	-----	---	-------	---	-------	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病虫害	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
トリコデルマ菌によるほだ木の障害	きのこ用ベンレート水和剤	1000 倍	30日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

0 1 0 0 1 1 0 2 1 6 - 1

2025年 月 作業開始

まいたけ

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 1 7 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	植菌日	/	管理()	/	管理()	/
---------	--------	---	-----	---	-------	---	-------	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
トリコデルマ菌によるほだ木の障害	きのこ用ベンレート水和剤	1000 倍	30日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

月

作業開始

えんどうまめ

生産履歴帳

0100110218-1

生産者(コード/氏名)	品種名(※栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	播種日	/	定植日	/	* * / * *
---------	--------	---	-----	---	-----	---	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
タネバエ、苗立枯病	キヒゲンR-2フロアブル	20 ml/kg		1	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
コナジラミ類幼虫	ダイアジノン粒剤5	4～6 kg/10a	60日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
コナジラミ類	エコピタ液剤	100～200 倍	1日		/	/	/	/	/
アオムシ、ウリノメイガ、オオタバコガ、コナジラミ、シロイチョウ、ヨトウ、ハスモンヨトウ	デルフィン顆粒水和剤	1000 倍	1日		/	/	/	/	/
アブラムシ類、カメムシ類、ハスモンヨトウ	トレボン乳剤	1000 倍	14日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
アザミウマ類、アブラムシ類、コナジラミ類	モスピラン顆粒水溶剤	2000～4000 倍	14日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
うどんこ病	ジーファイン水和剤	750～1000 倍	1日		/	/	/	/	/
炭疽病、うどんこ病、褐斑病	ベルコート水和剤	1000 倍	7日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
					/	/	/	/	/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

そらまめ

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 1 9 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		播種日		定植日		
---------	--------	----------------------	-----	----------------------	-----	----------------------	----------------------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
カラス,ハト	キヒゲンR-2フロアブル	20 ml/kg		1					
コガネムシ類幼虫	ダイアジノン粒剤5	4～6 kg/10a	60日	3					
コナジラミ類	エコピタ液剤	100～200 倍	1日						
アオムシ,ウリノメイガ,オオタバコガ,コナガ,シロイチモンジ,ヨトウ,ハスモンヨトウ	デルフィン顆粒水和剤	1000 倍	1日						
アブラムシ類 カメムシ類	トレボン乳剤	1000 倍	14日	2					
アザミウマ類,アブラムシ類,コナジラミ類	モスピラン顆粒水溶剤	2000～4000 倍	14日	3					
うどんこ病	ジーファイン水和剤	750～1000 倍	1日						
うどんこ病,褐斑病,炭疽病	ベルコート水和剤	1000 倍	7日	3					

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------

2025年 月 作業開始

はっか

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 2 0 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		播種日		定植日		
---------	--------	----------------------	-----	----------------------	-----	----------------------	----------------------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病虫害	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ハスモンヨトウ	カスケード乳剤	4000 倍	3日	2					
ハダニ類	コロマイト乳剤	2000 倍	1日	1					
アザミウマ類	スピノエース顆粒水和剤	10000 倍	3日	3					
アブラムシ類	モスピラン顆粒水溶剤	8000 倍	7日	3					
褐斑細菌病,黒腐病,軟腐病,斑点細菌病	コサイド3000	2000 倍	—						
灰色かび病	ストロビーフロアブル	3000 倍	7日	2					
うどんこ病 灰色かび病	ハーモメイト水溶剤	800～1000 倍	1日						

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------

はっか

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 2 0 - 1

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

[illegible]

野菜類 葉菜類 しそ科葉菜類: 茎葉を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

ラズベリー

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 2 1 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	定植日	/	管理()	/	管理()
---------	--------	---	-----	---	-------	---	-------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病虫害	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
サビダニ類 ハダニ類	石灰硫黄合剤	20～40 倍	—		/	/	/	/	/
ケムシ類	デルフィン顆粒水和剤	1000 倍	1日		/	/	/	/	/
斑点病	オキシラン水和剤	600 倍	収穫終了後	3	/	/	/	*/	*/
灰色かび病	フルピカフロアブル	2000 倍	1日	3	/	/	/	*/	*/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

はるみ

生産履歴帳

0100110222 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		定植日		管理()		管理()
---------	--------	--	-----	--	-------	--	-------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
アザミウマ類 カメシ類	アクタラ顆粒水溶剤	2000 倍	14日	3				* * / * *	* * / * *
カイガラムシ類幼虫,ミント コナジラミ若齢幼虫	アプロードフロアブル	1000 倍	45日	3				* * / * *	* * / * *
ハダニ サビダニ	カネマイトフロアブル	1000～1500 倍	7日	1		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
アブラムシ類,チャ ノキイロアザミウマ	キラップフロアブル	1000～2000 倍	21日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
アザミウマ類(ネキアザミウ マを除く),チャノホコリダニ, ミカンサビダニ	コテツフロアブル	2000～6000 倍	1日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
コナカイガラムシ類, チャノキイロアザミウマ	スタークル顆粒水溶剤	1000～2000 倍	1日	3				* * / * *	* * / * *
ハダニ	ダニエモンフロアブル	4000～6000 倍	7日	1		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
アゲハ類 チャノキイロアザミウマ ミカンサビダニ	マツチ乳剤	2000～3000 倍	21日	1		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
チャノキイロアザミウ マミドリヒメコバエ	ロディー乳剤	2000 倍	7日	4					* * / * *

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--

2025年

はるみ

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 2 2 - 1

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病虫害	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
かいよう病 黒点病	ICボルドー412	50 倍	—		/	/	/	/	/
かいよう病	ICボルドー66D	25～200 倍	—		/	/	/	/	/
黒点病 小黒点病	エムダイファー水和剤	600～800 倍	90日	2	/	/	* */ * *	* */ * *	* */ * *
かいよう病	コサイド3000 +クレフノン200倍	2000 倍	—		/	/	/	/	/
灰色かび病	スイッチ顆粒水和剤	2000～3000 倍	45日	2	/	/	* */ * *	* */ * *	* */ * *
灰色かび病 そうか病	ストロビードライフロアブル	2000～3000 倍	14日	3	/	/	/	* */ * *	* */ * *
貯蔵病害	ベフラン液剤25	2000 倍	1日	2	/	/	* */ * *	* */ * *	* */ * *
黒点病	ペンコゼブ水和剤	600～800 倍	90日	4	/	/	/	/	* */ * *
設定なし	マデックEW	2000～3000 倍	10日	1	/	* */ * *	* */ * *	* */ * *	* */ * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

果樹類 かんきつ:果実を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

いちご

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 2 3 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		※		定植月/日		* * / * *
---------	--------	--	---	--	-------	--	-----------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
うどんこ病,灰色かび病,輪斑病	アフエットフロアブル	2000 倍	1日	3				* * / * *	* * / * *
うどんこ病	アミスター20フロアブル	1500～2000 倍	1日	4					* * / * *
炭疽病	アントラコール顆粒水和剤	500 倍	仮植栽培期	6					
芽枯病,灰色かび病,炭疽病	オーソサイド水和剤80	800 倍	14日	5					
炭疽病	キノンドーフロアブル	500～800 倍	育苗期	3				* * / * *	* * / * *
炭疽病	ゲッター水和剤	1000 倍	21日	3				* * / * *	* * / * *
アブラムシ類,ハダニ類,灰色かび病	サンヨール	500 倍	1日	6					
うどんこ病	サンリット水和剤	2000～4000 倍	1日	3				* * / * *	* * / * *
うどんこ病,炭疽病	シグナムWDG	2000 倍	1日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--

2025年

いちご

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 2 3 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
じゃのめ病,炭疽病	ジマンダイセン水和剤	600 倍	76日	6	/	/	/	/	/
うどんこ病,灰色かび病	ショウチノスケフロアブル	2000 倍	1日	2	/	/	/	/	/
うどんこ病	ストロビーフロアブル	3000～5000 倍	1日	3	/	/	/	/	/
黒腐病,炭疽病	セイビアーフロアブル20	1000 倍	1日	3	/	/	/	/	/
炭疽病	デランフロアブル	1000 倍	育苗期	2	/	/	/	/	/
うどんこ病	トリフミン水和剤	3000～5000 倍	1日	5	/	/	/	/	/
うどんこ病,灰色かび病	パレード20フロアブル	2000～4000 倍	1日	3	/	/	/	/	/
うどんこ病	パンチョTF顆粒水和剤	2000 倍	1日	2	/	/	/	/	/
炭疽病	ファンタジスタ顆粒水和剤	2000 倍	1日	3	/	/	/	/	/
うどんこ病,灰色かび病	フルピカフロアブル	2000～3000 倍	1日	3	/	/	/	/	/
うどんこ病	プロパティフロアブル	3000～4000 倍	1日	3	/	/	/	/	/
うどんこ病,炭疽病,輪斑病	ベルコートフロアブル	1000 倍	育苗期	5	/	/	/	/	/
うどんこ病	ベルコートフロアブル	2000～4000 倍	1日	5	/	/	/	/	/
うどんこ病,ハダニ類,灰色かび病	ポリオキシシンAL水溶剤	5000 倍	14日	3	/	/	/	/	/
疫病	リドミルゴールドMZ	1000 倍	育苗期	3	/	/	/	/	/

※生産履歴は必ず3枚一緒に提出して下さい。【共販出荷の方へ】農薬散布の翌日に各支部提出先(集荷場所)に提出して下さい。

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 * * 月 作業開始

いちご

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 2 3 - 2

生産者(コード/氏名)		品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			* * * *	* * * * *

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
---------	--------	-----------	-----------	-----------	-----------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病虫害	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
アブラムシ類	アドマイヤー1粒剤	0.5 g/株	定植時	1	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
オオタバコガ、ハスモンヨトウ、ハダニ類、コナジラミ	アフーム乳剤	2000 倍	1日	2	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
コナジラミ類	ウララDF	2000 倍	1日	2	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
アザミウマ類、ハスモンヨトウ	カウンター乳剤	2000 倍	1日	4	/	/	/	/	* * / * *
アザミウマ類、クロハネキコバエ類、ハスモンヨトウ	カスケード乳剤	4000 倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
ハダニ類	カネマイトフロアブル	1000～1500 倍	1日	1	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
シクラメンホコリダニ、ハスモンヨトウ、ハダニ類、ミカンキイロアザミウマ	コテツフロアブル	2000 倍	1日	2	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
アブラムシ類、コナジラミ類	コルト顆粒水和剤	3000～4000 倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
シクラメンホコリダニ、ハダニ類	コロマイト水和剤	2000 倍	1日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

いちご

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 2 3 - 2

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
シクラメンホリダニ、ハダニ類	スターマイトフロアブル	2000 倍	1日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
アザミウマ類	スピノエース顆粒水和剤	5000 倍	1日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
ハダニ類	ダニオーテフロアブル	2000 倍	1日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
ハダニ類	ダニコングフロアブル	3000 倍	1日	1	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
ハダニ類	ダニサラバフロアブル	1000 倍	1日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
アブラムシ類,コナジラミ類	チェス顆粒水和剤	5000 倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
アザミウマ類,ハスモンヨトウ	ディアナSC	2500～5000 倍	1日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
ハダニ類	ニツソラン水和剤	2000～3000 倍	1日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
ハダニ類	バロックフロアブル	2000 倍	1日	1	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
ハダニ類	ピラニカEW	2000～3000 倍	1日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
アザミウマ類	ファインセーブフロアブル	1000～2000 倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
オオタバコガ,ハスモンヨトウ	フェニックス顆粒水和剤	2000～4000 倍	1日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
オオタバコガ,ハスモンヨトウ	プレオフロアブル	1000 倍	1日	4	/	/	/	/	* * / * *
ハスモンヨトウ	プレバソンフロアブル5	2000 倍	1日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
アザミウマ類,アブラムシ類,コナジラミ類	ベネビアOD	2000 倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *

※生産履歴は必ず3枚一緒に提出して下さい。【共販出荷の方へ】農薬散布の翌日に各支部提出先(集荷場所)に提出して下さい。

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 * * 月 作業開始

いちご

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 2 3 - 3

生産者(コード/氏名)		品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			* * * *	* * * * *

■農薬使用について(○で囲んで下さい) ■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
---------	--------	-----------	-----------	-----------	-----------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病虫害	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ハダニ類	マイトコーネフロアブル	1000 倍	1日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
アザミウマ類	マツチ乳剤	1000～2000 倍	1日	4	/	/	/	/	* * / * *
アブラムシ類,ハダニ類	マラソン乳剤	2000～3000 倍	3日	5	/	/	/	/	/
アザミウマ類,コナジラミ類	モスピラン顆粒水溶剤	2000 倍	1日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
アザミウマ類,アブラムシ類,コナジラミ類	モベントフロアブル	2000 倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
うどんこ病	イオウフロアブル	2000 倍	—		/	/	/	/	/
アブラムシ類,うどんこ病,ハダニ類	エコピタ液剤	100 倍	1日		/	/	/	/	/
うどんこ病	カリグリーン	800～1000 倍	1日		/	/	/	/	/
褐斑細菌病,黒腐病,軟腐病,斑点細菌病	コサイド3000	2000 倍	—		/	/	/	/	/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

いちご

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 2 3 - 3

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
アブラムシ類,ハダニ類	サフオイル乳剤	300～500 倍	1日		/	/	/	/	/
うどんこ病	ジーファイン水和剤	750～1000 倍	1日		/	/	/	/	/
うどんこ病	ハーモメイト水溶剤	800～1000 倍	1日		/	/	/	/	/
うどんこ病,灰色かび病	ボトキラー水和剤	1000 倍	—		/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

※生産履歴は必ず3枚一緒に提出して下さい。【共販出荷の方へ】農薬散布の翌日に各支部提出先(集荷場所)に提出して下さい。

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

西洋なし

生産履歴帳

0100110224 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	定植日	/	管理()	/	管理()
---------	--------	---	-----	---	-------	---	-------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
アブラムシ類 カメムシ類 シツクイムシ類 ハマキムシ類	アグロスリン水和剤	1000～2000倍	1日	3	/	/	/	*/	*/
アブラムシ類	ウララDF	2000～4000倍	14日	2	/	/	*/	*/	*/
アブラムシ	オリオン水和剤40	1000倍	3日	2	/	/	*/	*/	*/
カイガラムシ類	コルト顆粒水和剤	3000～4000倍	1日	3	/	/	/	*/	*/
アブラムシ類 カメムシ類 ケムシ類 シツクイムシ類	スタークル顆粒水溶剤	2000倍	1日	3	/	/	/	*/	*/
カメムシ類	テルスター水和剤	1000～2000倍	1日	2	/	/	*/	*/	*/
カイガラムシ類	トモノールS	25～50倍	発芽前		/	/	/	/	/
クワコナカイガラムシ	バリアード顆粒水和剤	4000倍	1日	3	/	/	/	*/	*/
ケムシ類、シツクイムシ類、ハマキムシ類	フェニックス顆粒水和剤	4000倍	1日	2	/	/	*/	*/	*/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

西洋なし

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 2 4 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
アブラムシ類、カイガラムシ類、カキノヒメコバ、イカメムシ類、シンクイムシ類	モスピラン顆粒水溶剤	2000～4000倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
褐色斑点病 黒星病 黒斑病 輪紋病	キノンドーフロアブル	1000 倍	3日	9	/	/	/	/	/
黒星病、赤星病	スコア顆粒水和剤	2000～4000倍	14日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
うどんこ病 黒斑病 輪紋病	ストロビードライフフロアブル	2000～3000倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
黒星病、赤星病	トリフミン水和剤	2000～3000倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
黒星病 黒斑病 炭疽病 輪紋病	ナリアWDG	2000 倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
胴枯病	バッチレート	1 倍	剪定時	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
うどんこ病、黒星病、黒斑病、輪紋病	ベルクート水和剤	1000～1500倍	14日	5	/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

果樹類 仁果類:果実を収穫するもの(日本なし、西洋なし、中国なし)

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

月作業開始

小粒種ぶどう

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 2 5 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	定植日	/	管理()	/	管理()	/
---------	--------	---	-----	---	-------	---	-------	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
チャノキイロアサミウマコナカイガラムシ	アクタラ顆粒水溶剤	2000 倍	7日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
ハダニ	カネマイトフロアブル	1000～1500 倍	14日	1	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
ハダニ	コロマイト水和剤	2000 倍	7日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
コナカイガラムシ類	スタークル顆粒水溶剤	1000～2000 倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
アブラムシ類、フタテンヒメコバ、フドウスミシバ、フドウトリハ	スミチオン乳剤	1000～2000 倍	90日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
サビダニ類、ハダニ類	石灰硫黄合剤	20～40 倍			/	/	/	/	/
チャノキイロアサミウマ	ダントツ水溶剤	2000～4000 倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
ブドウトラカミキリ	トラサイドA乳剤	200～300 倍	発芽前	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
アザミウマ類、カイガラムシ類、コナメシ類成虫、フタテンヒメコバ	モスピラン顆粒水溶剤	2000～4000 倍	14日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

小粒種ぶどう

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 2 5 - 1

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病虫害	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
べと病	ICボルドー66D	25～200 倍	—		/	/	/	/	/
うどんこ病 灰色かび病 黒とう病	インダーフロアブル	8000 倍	30日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
べと病,黒とう病, 枝膨病	キノンドーフロアブル	600 倍	45日	4	/	/	/	/	* * / * *
さび病	ジマンダイセン水和剤	1000 倍	45日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
べと病 灰色かび病 褐斑病 黒とう病	ストロビードライフロアブル	2000～3000 倍	14日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
さび病,べと病, 褐斑病	Zボルドー	500～800 倍	—		/	/	/	/	/
黒とう病,枝膨病	ベフラン液剤25	1000 倍	60日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
灰色かび病, 白腐病	ロブラール水和剤	1000～1500 倍	60日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

果樹類 ベリー類 等の小粒果実類:果実を収穫するもの(小粒種ぶどう、大粒種ぶどう) ※ スミチオン乳剤のみ使用時期が異なる 大粒:21日 小粒:90日

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

根深ねぎ

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 2 6 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		播種日		定植日		
---------	--------	----------------------	-----	----------------------	-----	----------------------	----------------------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
コガネムシ類幼虫	ダイアジノン粒剤5	4～6 kg/10a	定植時	2					
白絹病	モンカッタ粒剤	4～6 kg/10a	30日	4					
シロイチモジヨトウ	アフアーム乳剤	1000～2000倍	7日	3					
シロイチモジヨトウ、ネキコガ、ハモグリハエ類	プレバソンフロアブル5	2000倍	3日	3					
アザミウマ類、クロハネキノコハエ類、シロイチモジヨトウ、ネキコガ、ハモグリハエ類	グレーシア乳剤	2000～3000倍	7日	2					
アザミウマ類、シロイチモジヨトウ、ネキコガ、ネキハモグリハエ	ディアナSC	2500～5000倍	1日	2					
アザミウマ類	スピノエース顆粒水和剤	2500～5000倍	3日	3					
アブラムシ類、ネキアザミウマ、ネキハモグリハエ	コルト顆粒水和剤	2000倍	3日	3					
アザミウマ類	モスピラン顆粒水溶剤	2000倍	7日	3					

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------

2025年

根深ねぎ

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 2 6 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
さび病,黒斑病,小菌核病,小菌核腐敗病,白絹病,葉枯病	アフエットフロアブル	2000 倍	1日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
さび病,べと病,リッパ葉腐敗病,黄斑病,黒斑病,葉枯病	アミスター20フロアブル	2000 倍	3日	4	/	/	/	/	* * / * *
べと病	ランマンフロアブル	2000 倍	3日	4	/	/	/	/	* * / * *
軟腐病	スターナ水和剤	2000 倍	7日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
さび病,べと病,黒斑病	ジマンダイセン水和剤	600 倍	14日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
黒腐菌核病,小菌核腐敗病,白絹病	セイビアーフロアブル20	1000 倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
さび病,黒斑病	オンリーワンフロアブル	1000 倍	14日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
軟腐病	バリダシン液剤5	500 倍	1日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
軟腐病	カスミンボルドー	1000 倍	14日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
褐斑細菌病,黒腐病,軟腐病,斑点細菌病	コサイド3000	2000 倍			/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

野菜類 鱗茎類 鱗茎類(葉物):茎葉を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

月

作業開始

リーフレタス

生産履歴帳

0100110227-1

生産者(コード/氏名)	品種名(※栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	播種日	/	定植日	/	/
---------	--------	---	-----	---	-----	---	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ケラ、コガネムシ類 幼虫、ネキリムシ類	ダイアジノン粒剤5	6 kg/10a	は種時又は定植時	2	/	/	/	/	/
オオタバコガ、ナモグリハエ、ハスモンヨトウ	アフーム乳剤	1000～2000倍	3日	3	/	/	/	/	/
アブラムシ類	ウララDF	2000倍	1日	2	/	/	/	/	/
オオタバコガ、ハスモンヨトウ	カスケード乳剤	4000倍	3日	3	/	/	/	/	/
アザミウマ類、オオタバコガ、ハスモンヨトウ、ハモグリハエ類	ディアナSC	2500～5000倍	1日	2	/	/	/	/	/
オオタバコガ、ハスモンヨトウ、ハモグリハエ類、ヨトウムシ	プレバソンフロアブル5	2000倍	1日	3	/	/	/	/	/
アザミウマ類、アブラムシ類、ナモグリハエ	モスピラン顆粒水溶剤	4000倍	7日	1	/	/	/	/	/
すす枯病、灰色かび病、菌核病	アフエットフロアブル	2000倍	1日	3	/	/	/	/	/
べと病、灰色かび病、菌核病	アミスター20フロアブル	2000倍	7日	4	/	/	/	/	/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

リーフレタス

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 2 7 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
褐斑細菌病,黒腐病,軟腐病,斑点細菌病	コサイド3000	2000 倍	—		/	/	/	/	/
軟腐病,腐敗病	スターナ水和剤	2000 倍	14日	2	/	/	* / *	* / *	* / *
灰色かび病,菌核病	トップジンM水和剤	1500～2000 倍	21日	2	/	/	* / *	* / *	* / *
すそ枯病,軟腐病,腐敗病	バリダシン液剤5	800 倍	3日	3	/	/	/	* / *	* / *
べと病	ランマンフロアブル	2000 倍	3日	3	/	/	/	* / *	* / *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

野菜類 葉菜類 レタス類 非結球レタス:茎葉を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

伊予柑

生産履歴帳

0100110228 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		定植日		管理()		管理()
---------	--------	--	-----	--	-------	--	-------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ケンキスイ類 コナカイラムシ類 ミカンハモグリカ	アクタラ顆粒水溶剤	2000～3000倍	14日	3				*/*/*/*	*/*/*/*
カイラムシ類幼虫、ミカン トゲコナジラミ若齢幼虫	アプロードフロアブル	1000倍	45日	3				*/*/*/*	*/*/*/*
ハダニ、サビダニ	カネマイトフロアブル	1000～1500倍	7日	1		*/*/*/*	*/*/*/*	*/*/*/*	*/*/*/*
アブラムシ類、チャ ノキイロアザミウマ	キラップフロアブル	1000～2000倍	21日	2			*/*/*/*	*/*/*/*	*/*/*/*
アザミウマ類(ネキアザミウ マを除く)、チャノホコリダニ、 ミカンサビダニ	コテツフロアブル	2000～6000倍	1日	2			*/*/*/*	*/*/*/*	*/*/*/*
コナカイラムシ類、 チャノキイロアザミウマ	スタークル顆粒水溶剤	1000～2000倍	1日	3				*/*/*/*	*/*/*/*
ハダニ	ダニエモンフロアブル	4000～6000倍	7日	1		*/*/*/*	*/*/*/*	*/*/*/*	*/*/*/*
アゲハ類 チャノキイロアザミウマ ミカンサビダニ	マツチ乳剤	2000～3000倍	21日	1		*/*/*/*	*/*/*/*	*/*/*/*	*/*/*/*
ミドリヒメコバイ	ロディー乳剤	2000倍	7日	4					*/*/*/*

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--

2025年

伊予柑

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 2 8 - 1

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病虫害	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
かいよう病 黒点病	ICボルドー412	50 倍	—		/	/	/	/	/
かいよう病	ICボルドー66D	25～200 倍	—		/	/	/	/	/
黒点病	エムダイファー水和剤	600～800 倍	90日	2	/	/	* */ * *	* */ * *	* */ * *
かいよう病	コサイド3000 +クレフノン200倍	2000 倍	—		/	/	/	/	/
灰色かび病	スイッチ顆粒水和剤	2000～3000 倍	45日	2	/	/	* */ * *	* */ * *	* */ * *
そうか病 灰色かび病	ストロビードライフロアブル	2000～3000 倍	14日	3	/	/	/	* */ * *	* */ * *
貯蔵病害	ベフラン液剤25	2000 倍	1日	2	/	/	* */ * *	* */ * *	* */ * *
黒点病	ペンコゼブ水和剤	600～800 倍	90日	4	/	/	/	/	* */ * *
設定なし	兼商マデックEW	2000～3000 倍	10日	1	/	* */ * *	* */ * *	* */ * *	* */ * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

果樹類 かんきつ:果実を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

月作業開始

かぼす

生産履歴帳

0100110229-1

生産者(コード/氏名)	品種名(※栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	定植日	/	管理()	/	管理()	/
---------	--------	---	-----	---	-------	---	-------	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
カイガラムシ類幼虫、ミカントゲコナジラミ若齢幼虫	アプロードフロアブル	1000 倍	45日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
ハダニ サビダニ	カネマイトフロアブル	1000～1500 倍	7日	1	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
アザミウマ類(ネキアザミウマを除く)、チャノホコリダニ、ミカンサビダニ	コテツフロアブル	2000～6000 倍	1日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
チャノキイロアザミウマ カイガラムシ	コルト顆粒水和剤	2000 倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
ハダニ サビダニ	コロマイト水和剤	2000 倍	7日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
コナカイガラムシ類、チャノキイロアザミウマ	スタークル顆粒水溶剤	1000～2000 倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
ハダニ	ダニエモンフロアブル	4000～6000 倍	7日	1	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
カメムシ類、チャノキイロアザミウマ、ミカンハモグリガ	テルスター水和剤	1000～2000 倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
アブラムシ アザミウマ、ハモグリバエ	モスピラン水溶剤	2000～4000 倍	14日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

かぼす

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 2 9 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ミドリヒメコバイ	ロディー乳剤	2000 倍	7日	4	/	/	/	/	* * / * *
かいよう病	ICボルドー66D	25～200 倍	—		/	/	/	/	/
黒点病	エムダイファー水和剤	600～800 倍	90日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
かいよう病	コサイド3000 +クレフノン	1000～2000 倍	—		/	/	/	/	/
灰色かび病	スイッチ顆粒水和剤	2000～3000 倍	45日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
そうか病 灰色かび病	ストロビードライフロアブル	2000～3000 倍	14日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
貯蔵病害	ベフラン液剤25	2000 倍	1日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
黒点病	ペンコゼブ水和剤	600～800 倍	90日	4	/	/	/	/	* * / * *
貯蔵病害(黒斑病), 貯蔵病害(軸腐病), 貯蔵病害(青かび病)	ベンレート水和剤	4000～6000 倍	1日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

果樹類 かんきつ:果実を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

清見

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 3 0 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		定植日		管理()		管理()
---------	--------	--	-----	--	-------	--	-------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ケンキスイ類 コナカイラムシ類 ミカンハモグリカ	アクタラ顆粒水溶剤	2000～3000倍	14日	3				* * / * *	* * / * *
カイラムシ類幼虫、ミカン トゲコナジラミ若齢幼虫	アプロードフロアブル	1000倍	45日	3				* * / * *	* * / * *
ハダニ サビダニ	カネマイトフロアブル	1000～1500倍	7日	1		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
アブラムシ類、チャ ノキイロアザミウマ	キラップフロアブル	1000～2000倍	21日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
アザミウマ類(ネキアザミウマを除く)、チャノホコリダニ、 ミカンサビダニ	コテツフロアブル	2000～6000倍	1日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
コナカイラムシ類、 チャノキイロアザミウマ	スタークル顆粒水溶剤	1000～2000倍	1日	3				* * / * *	* * / * *
ハダニ	ダニエモンフロアブル	4000～6000倍	7日	1		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
アゲハ類 チャノキイロアザミウマ ミカンサビダニ	マツチ乳剤	2000～3000倍	21日	1		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
ミドリヒメコバイ	ロディー乳剤	2000倍	7日	4					* * / * *

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--

2025年

清見

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 3 0 - 1

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病虫害	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
かいよう病 黒点病	ICボルドー412	50 倍	—		/	/	/	/	/
かいよう病	ICボルドー66D	25～200 倍	—		/	/	/	/	/
黒点病	エムダイファー水和剤	600～800 倍	90日	2	/	/	* */ * *	* */ * *	* */ * *
かいよう病	コサイド3000 +クレフノン200倍	2000 倍	—		/	/	/	/	/
灰色かび病	スイッチ顆粒水和剤	2000～3000 倍	45日	2	/	/	* */ * *	* */ * *	* */ * *
灰色かび病 そうか病	ストロビードライフロアブル	2000～3000 倍	14日	3	/	/	/	* */ * *	* */ * *
貯蔵病害	ベフラン液剤25	2000 倍	1日	2	/	/	* */ * *	* */ * *	* */ * *
黒点病	ペンコゼブ水和剤	600～800 倍	90日	4	/	/	/	/	* */ * *
設定なし	マデックEW	2000～3000 倍	10日	1	/	* */ * *	* */ * *	* */ * *	* */ * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

果樹類 かんきつ:果実を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

月

作業開始

きんかん

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 3 1 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		定植日		管理()		管理()
---------	--------	--	-----	--	-------	--	-------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ケンセイイ類 コナカイガラムシ類 ミカンハモグリカ	アクタラ顆粒水溶剤	2000～3000倍	14日	3				* * / * *	* * / * *
カイガラムシ類幼虫、ミカン トゲコナジラミ若齢幼虫	アプロードフロアブル	1000倍	45日	3				* * / * *	* * / * *
ハダニ、サビダニ	カネマイトフロアブル	1000～1500倍	7日	1		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
アブラムシ類、チャ ノキイロアザミウマ	キラップフロアブル	1000～2000倍	21日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
カネタキ、スグリゾウムシ、ハ スモンヨトウ、ヨモギエダシヤ ク	コテツフロアブル	2000～4000倍	1日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
コナカイガラムシ類、 チャノキイロアザミウマ	スタークル顆粒水溶剤	1000～2000倍	1日	3				* * / * *	* * / * *
ハダニ	ダニエモンフロアブル	4000～6000倍	7日	1		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
アゲハ類 チャノキイロアザミウマ ミカンサビダニ	マツチ乳剤	2000～3000倍	21日	1		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
ミドリヒメコバイ	ロディー乳剤	2000倍	7日	4					* * / * *

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--

2025年

きんかん

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 3 1 - 1

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病虫害	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
かいよう病 黒点病	ICボルドー412	50 倍	—		/	/	/	/	/
かいよう病	ICボルドー66D	25～200 倍	—		/	/	/	/	/
黒点病	エムダイファー水和剤	600～800 倍	90日	2	/	/	* */ * *	* */ * *	* */ * *
かいよう病	コサイド3000 +クレフノン200倍	1000～2000 倍	—		/	/	/	/	/
灰色かび病	スイッチ顆粒水和剤	2000～3000 倍	45日	2	/	/	* */ * *	* */ * *	* */ * *
灰色かび病 そうか病	ストロビードライフロアブル	2000～3000 倍	14日	3	/	/	/	* */ * *	* */ * *
貯蔵病害	ベフラン液剤25	2000 倍	1日	2	/	/	* */ * *	* */ * *	* */ * *
黒点病	ペンコゼブ水和剤	600～800 倍	90日	4	/	/	/	/	* */ * *
設定なし	マデックEW	2000～3000 倍	10日	1	/	* */ * *	* */ * *	* */ * *	* */ * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

果樹類 きんかん: 果実を収穫するもの(ニンポウキンカン、マルキンカン)

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 日 作業開始 グレープフルーツ 生産履歴帳 0 1 0 0 1 1 0 2 3 2 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい) ■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		定植日		管理()		管理()	
---------	--------	----------------------	-----	----------------------	-------	----------------------	-------	----------------------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ケンキスイ類 コナカイガラムシ類 ミカンハモグリカ	アクタラ顆粒水溶剤	2000～3000倍	14日	3				* * / * *	* * / * *
アカマルカイガラムシ、アサミウマ類、アブラムシ類、カメムシ類、コナカイガラムシ類	アドマイヤー顆粒水和剤	5000～10000倍	14日	3				* * / * *	* * / * *
ハダニ、サビダニ	カネマイトフロアブル	1000～1500倍	7日	1		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
アザミウマ類、チャノホコリダニ、ミカンサビダニ	コテツフロアブル	2000～6000倍	1日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
ハダニ	ダニエモンフロアブル	4000～6000倍	7日	1		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
カイガラムシ類 ハダニ類	トモノールS	60～80倍	—						
ミカンハダニ	バロックフロアブル	2000～3000倍	14日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
チャノキイロアザミウマ ミカンサビダニ ミカンハモグリカ	マツチ乳剤	2000～3000倍	21日	1		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
ミドリヒメコバイ	ロディー乳剤	2000倍	7日	4					* * / * *

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------

2025年

グレープフルーツ 生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 3 2 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
かいよう病 黒点病	ICボルドー412	50 倍	発芽直前		/	/	/	/	/
かいよう病	ICボルドー66D	25～200 倍	—		/	/	/	/	/
黒点病	エムダイファー水和剤	600～800 倍	90日	2	/	/	* */ * *	* */ * *	* */ * *
灰色かび病	スイッチ顆粒水和剤	2000～3000 倍	45日	2	/	/	* */ * *	* */ * *	* */ * *
灰色かび病 そうか病	ストロビードライフフロアブル	2000～3000 倍	14日	3	/	/	/	* */ * *	* */ * *
貯蔵病害	ベフラン液剤25	2000 倍	1日	2	/	/	* */ * *	* */ * *	* */ * *
黒点病	ペンコゼブ水和剤	600～800 倍	90日	4	/	/	/	/	* */ * *
かいよう病,黄斑症,黄斑病,黒点病	MICコサイドボルドー	2000 倍			/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

果樹類 かんきつ:果実を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

すだち

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 3 3 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	定植日	/	管理()	/	管理()	/
---------	--------	---	-----	---	-------	---	-------	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
アザミウマ類 カメシ類	アクタラ顆粒水溶剤	2000 倍	14日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
カイガラムシ類幼虫、ミントゲコナジミ若齢幼虫	アプロードフロアブル	1000 倍	45日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
ハダニ サビダニ	カネマイトフロアブル	1000～1500 倍	7日	1	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
アブラムシ類、チャノキイロアザミウマ	キラップフロアブル	1000～2000 倍	21日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
アザミウマ類(ネキアザミウマを除く)、チャノホコリダニ、ミカンサビダニ	コテツフロアブル	2000～6000 倍	1日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
コナカイガラムシ類、チャノキイロアザミウマ	スタークル顆粒水溶剤	1000～2000 倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
ハダニ	ダニエモンフロアブル	4000～6000 倍	7日	1	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
アゲハ類 チャノキイロアザミウマ ミカンサビダニ	マツチ乳剤	2000～3000 倍	21日	1	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
ミドリヒメコバイ	ロディー乳剤	2000 倍	7日	4	/	/	/	/	* * / * *

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

すだち

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 3 3 - 1

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病虫害	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
かいよう病 黒点病	ICボルドー412	50 倍	—		/	/	/	/	/
かいよう病	ICボルドー66D	25～200 倍	—		/	/	/	/	/
黒点病	エムダイファー水和剤	600～800 倍	90日	2	/	/	* */ * *	* */ * *	* */ * *
かいよう病	コサイド3000 +クレフノン200倍	2000 倍	—		/	/	/	/	/
灰色かび病	スイッチ顆粒水和剤	2000～3000 倍	45日	2	/	/	* */ * *	* */ * *	* */ * *
灰色かび病 そうか病	ストロビードライフロアブル	2000～3000 倍	14日	3	/	/	/	* */ * *	* */ * *
貯蔵病害	ベフラン液剤25	2000 倍	1日	2	/	/	* */ * *	* */ * *	* */ * *
黒点病	ペンコゼブ水和剤	600～800 倍	90日	4	/	/	/	/	* */ * *
設定なし	マデックEW	2000～3000 倍	10日	1	/	* */ * *	* */ * *	* */ * *	* */ * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

果樹類 かんきつ:果実を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

不知火

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 3 4 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		定植日		管理()		管理()
---------	--------	--	-----	--	-------	--	-------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ケンキスイ類 コナカイラムシ類 ミカンハモグリカ	アクタラ顆粒水溶剤	2000～3000倍	14日	3				* * / * *	* * / * *
カイラムシ類幼虫、ミントケコナジラミ若齢幼虫	アプロードフロアブル	1000倍	45日	3				* * / * *	* * / * *
ハダニ、サビダニ	カネマイトフロアブル	1000～1500倍	7日	1		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
アブラムシ類、チャノキイロアザミウマ	キラップフロアブル	1000～2000倍	21日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
アザミウマ類(ネキアザミウマを除く)、チャノホコリダニ、ミカンサビダニ	コテツフロアブル	2000～6000倍	1日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
コナカイラムシ類、チャノキイロアザミウマ	スタークル顆粒水溶剤	1000～2000倍	1日	3				* * / * *	* * / * *
ハダニ	ダニエモンフロアブル	4000～6000倍	7日	1		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
アゲハ類 チャノキイロアザミウマ ミカンサビダニ	マツチ乳剤	2000～3000倍	21日	1		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
ミドリヒメコバイ	ロディー乳剤	2000倍	7日	4					* * / * *

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--

2025年

不知火

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 3 4 - 1

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病虫害	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
かいよう病 黒点病	ICボルドー412	50 倍	—		/	/	/	/	/
かいよう病	ICボルドー66D	25～200 倍	—		/	/	/	/	/
黒点病	エムダイファー水和剤	600～800 倍	90日	2	/	/	* / *	* / *	* / *
かいよう病	コサイド3000 +クレフノン200倍	1000 ～2000 倍	—		/	/	/	/	/
灰色かび病	スイッチ顆粒水和剤	2000～3000 倍	45日	2	/	/	* / *	* / *	* / *
灰色かび病 そうか病	ストロビードライフロアブル	2000～3000 倍	14日	3	/	/	/	* / *	* / *
貯蔵病害	ベフラン液剤25	2000 倍	1日	2	/	/	* / *	* / *	* / *
黒点病	ペンコゼブ水和剤	600～800 倍	90日	4	/	/	/	/	* / *
設定なし	マデックEW	2000～3000 倍	10日	1	/	* / *	* / *	* / *	* / *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

果樹類 かんきつ:果実を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

月

作業開始

なつみかん

生産履歴帳

0100110235-1

生産者(コード/氏名)	品種名(※栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	定植日	/	管理()	/	管理()	/
---------	--------	---	-----	---	-------	---	-------	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ケシキイ類 コナカイラムシ類 ミカンハモグリカ	アクタラ顆粒水溶剤	2000～3000倍	14日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
カイラムシ類幼虫、ミカン トゲコナジラミ若齢幼虫	アプロードフロアブル	1000倍	45日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
ハダニ サビダニ	カネマイトフロアブル	1000～1500倍	7日	1	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
アブラムシ類、チャ ノキイロアザミウマ	キラップフロアブル	1000～2000倍	21日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
アザミウマ類(ネキアザミウマを除く)、チャノホコリダニ、 ミカンサビダニ	コテツフロアブル	2000～6000倍	1日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
コナカイラムシ類、 チャノキイロアザミウマ	スタークル顆粒水溶剤	1000～2000倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
ハダニ	ダニエモンフロアブル	4000～6000倍	7日	1	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
アゲハ類 チャノキイロアザミウマ ミカンサビダニ	マツチ乳剤	2000～3000倍	21日	1	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
ミドリヒメコバイ	ロディー乳剤	2000倍	7日	4	/	/	/	/	* * / * *

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

なつみかん

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 3 5 - 1

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病虫害	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
かいよう病 黒点病	ICボルドー412	50 倍	—		/	/	/	/	/
かいよう病	ICボルドー66D	25～200 倍	—		/	/	/	/	/
黒点病	エムダイファー水和剤	600～800 倍	90日	2	/	/	* */ * *	* */ * *	* */ * *
かいよう病	コサイド3000 +クレフノン200倍	2000 倍	—		/	/	/	/	/
灰色かび病	スイッチ顆粒水和剤	2000～3000 倍	45日	2	/	/	* */ * *	* */ * *	* */ * *
灰色かび病 そうか病	ストロビードライフロアブル	2000～3000 倍	14日	3	/	/	/	* */ * *	* */ * *
貯蔵病害	ベフラン液剤25	2000 倍	1日	2	/	/	* */ * *	* */ * *	* */ * *
黒点病	ペンコゼブ水和剤	600～800 倍	90日	4	/	/	/	/	* */ * *
設定なし	マデックEW	2000～3000 倍	10日	1	/	* */ * *	* */ * *	* */ * *	* */ * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

果樹類 かんきつ:果実を収穫するもの(甘夏、なつだいだい)

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

ネーブル

生産履歴帳

0100110236-1

生産者(コード/氏名)	品種名(※栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		定植日		管理()		管理()
---------	--------	--	-----	--	-------	--	-------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ケンキスイ類 コナカイラムシ類 ミカンハモグリカ	アクタラ顆粒水溶剤	2000～3000倍	14日	3				*/*/*/*	*/*/*/*
カイラムシ類幼虫、ミカン トゲコナジラミ若齢幼虫	アプロードフロアブル	1000倍	45日	3				*/*/*/*	*/*/*/*
ハダニ サビダニ	カネマイトフロアブル	1000～1500倍	7日	1		*/*/*/*	*/*/*/*	*/*/*/*	*/*/*/*
アブラムシ類、チャ ノキイロアザミウマ	キラップフロアブル	1000～2000倍	21日	2			*/*/*/*	*/*/*/*	*/*/*/*
アザミウマ類(ネキアザミウ マを除く)、チャノホコリダニ、 ミカンサビダニ	コテツフロアブル	2000～6000倍	1日	2			*/*/*/*	*/*/*/*	*/*/*/*
コナカイラムシ類、 チャノキイロアザミウマ	スタークル顆粒水溶剤	1000～2000倍	1日	3				*/*/*/*	*/*/*/*
ハダニ	ダニエモンフロアブル	4000～6000倍	7日	1		*/*/*/*	*/*/*/*	*/*/*/*	*/*/*/*
アゲハ類 チャノキイロアザミウマ ミカンサビダニ	マツチ乳剤	2000～3000倍	21日	1		*/*/*/*	*/*/*/*	*/*/*/*	*/*/*/*
ミドリヒメコバイ	ロディー乳剤	2000倍	7日	4					*/*/*/*

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--

2025年

ネーブル

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 3 6 - 1

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病虫害	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
かいよう病 黒点病	ICボルドー412	50 倍	—		/	/	/	/	/
かいよう病	ICボルドー66D	25～200 倍	—		/	/	/	/	/
黒点病	エムダイファー水和剤	600～800 倍	90日	2	/	/	* */ * *	* */ * *	* */ * *
かいよう病	コサイド3000 +クレフノン200倍	2000 倍	—		/	/	/	/	/
灰色かび病	スイッチ顆粒水和剤	2000～3000 倍	45日	2	/	/	* */ * *	* */ * *	* */ * *
灰色かび病 そうか病	ストロビードライフロアブル	2000～3000 倍	14日	3	/	/	/	* */ * *	* */ * *
貯蔵病害	ベフラン液剤25	2000 倍	1日	2	/	/	* */ * *	* */ * *	* */ * *
黒点病	ペンコゼブ水和剤	600～800 倍	90日	4	/	/	/	/	* */ * *
設定なし	マデックEW	2000～3000 倍	10日	1	/	* */ * *	* */ * *	* */ * *	* */ * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

果樹類 かんきつ:果実を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

はっさく

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 3 7 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		定植日		管理()		管理()	
---------	--------	----------------------	-----	----------------------	-------	----------------------	-------	----------------------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ケンキスイ類 コナカイラムシ類 ミカンハモグリカ	アクタラ顆粒水溶剤	2000～3000倍	14日	3				* * / * *	* * / * *
カイガラムシ類	アプロードエースフロアブル	1000倍	45日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
ハダニ、サビダニ	カネマイトフロアブル	1000～1500倍	7日	1		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
アブラムシ類、チャノキイロアザミウマ	キラップフロアブル	1000～2000倍	21日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
アザミウマ類(ネキアザミウマを除く)、チャノホコリダニ、ミカンサビダニ	コテツフロアブル	2000～6000倍	1日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
コナカイラムシ類、チャノキイロアザミウマ	スタークル顆粒水溶剤	1000～2000倍	1日	3				* * / * *	* * / * *
ハダニ	ダニエモンフロアブル	4000～6000倍	7日	1		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
アゲハ類 チャノキイロアザミウマ ミカンサビダニ	マツチ乳剤	2000～3000倍	21日	1		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
ミドリヒメコバイ	ロディー乳剤	2000倍	7日	4					* * / * *

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------

2025年

はっさく

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 3 7 - 1

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病虫害	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
かいよう病 黒点病	ICボルドー412	50 倍	—		/	/	/	/	/
かいよう病	ICボルドー66D	25～200 倍	—		/	/	/	/	/
黒点病	エムダイファー水和剤	600～800 倍	90日	2	/	/	* / *	* / *	* / *
かいよう病	コサイド3000 +クレフノン200倍	2000 倍	—		/	/	/	/	/
灰色かび病	スイッチ顆粒水和剤	2000～3000 倍	45日	2	/	/	* / *	* / *	* / *
灰色かび病 そうか病	ストロビードライフロアブル	2000～3000 倍	14日	3	/	/	/	* / *	* / *
貯蔵病害	ベフラン液剤25	2000 倍	1日	2	/	/	* / *	* / *	* / *
黒点病	ペンコゼブ水和剤	600～800 倍	90日	4	/	/	/	/	* / *
設定なし	マデックEW	2000～3000 倍	10日	1	/	* / *	* / *	* / *	* / *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

果樹類 かんきつ:果実を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

日向夏

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 3 8 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		定植日		管理()		管理()
---------	--------	--	-----	--	-------	--	-------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ケンキスイ類 コナカイラムシ類 ミカンハモグリカ	アクタラ顆粒水溶剤	2000～3000倍	14日	3				* * / * *	* * / * *
カイラムシ類幼虫、ミカントケコナジラミ若齢幼虫	アプロードフロアブル	1000倍	45日	3				* * / * *	* * / * *
ハダニ サビダニ	カネマイトフロアブル	1000～1500倍	7日	1		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
アブラムシ類、チャノキイロアザミウマ	キラップフロアブル	1000～2000倍	21日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
アザミウマ類(ネキアザミウマを除く)、チャノホコリダニ、ミカンサビダニ	コテツフロアブル	2000～6000倍	1日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
コナカイラムシ類、チャノキイロアザミウマ	スタークル顆粒水溶剤	1000～2000倍	1日	3				* * / * *	* * / * *
ハダニ	ダニエモンフロアブル	4000～6000倍	7日	1		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
アゲハ類 チャノキイロアザミウマ ミカンサビダニ	マツチ乳剤	2000～3000倍	21日	1		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
ミドリヒメコバイ	ロディー乳剤	2000倍	7日	4					* * / * *

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--

2025年

日向夏

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 3 8 - 1

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病虫害	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
かいよう病 黒点病	ICボルドー412	50 倍	—		/	/	/	/	/
かいよう病	ICボルドー66D	25～200 倍	—		/	/	/	/	/
黒点病	エムダイファー水和剤	600～800 倍	90日	2	/	/	* */ * *	* */ * *	* */ * *
かいよう病	コサイド3000 +クレフノン200倍	2000 倍	—		/	/	/	/	/
灰色かび病	スイッチ顆粒水和剤	2000～3000 倍	45日	2	/	/	* */ * *	* */ * *	* */ * *
灰色かび病 そうか病	ストロビードライフロアブル	2000～3000 倍	14日	3	/	/	/	* */ * *	* */ * *
貯蔵病害	ベフラン液剤25	2000倍～3000倍	1日	2	/	/	* */ * *	* */ * *	* */ * *
黒点病	ペンコゼブ水和剤	600～800 倍	90日	4	/	/	/	/	* */ * *
設定なし	マデックEW	2000～3000 倍	10日	1	/	* */ * *	* */ * *	* */ * *	* */ * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

果樹類 かんきつ:果実を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

月

作業開始

ぼんかん

生産履歴帳

0100110239-1

生産者(コード/氏名)	品種名(※栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	定植日	/	管理()	/	管理()	/
---------	--------	---	-----	---	-------	---	-------	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
アザミウマ類 カメシ類	アクタラ顆粒水溶剤	2000 倍	14日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
カイガラムシ類幼虫,ミント コナジラミ若齢幼虫	アプロードフロアブル	1000 倍	45日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
ハダニ サビダニ	カネマイトフロアブル	1000～1500 倍	7日	1	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
アブラムシ類,チャ ノキイロアザミウマ	キラップフロアブル	1000～2000 倍	21日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
アザミウマ類(ネキアザミウ マを除く),チャノホコリダニ, ミカンサビダニ	コテツフロアブル	2000～6000 倍	1日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
コナカイガラムシ類, チャノキイロアザミウマ	スタークル顆粒水溶剤	1000～2000 倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
ハダニ	ダニエモンフロアブル	4000～6000 倍	7日	1	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
アゲハ類 チャノキイロアザミウマ ミカンサビダニ	マツチ乳剤	2000～3000 倍	21日	1	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
ミドリヒメコバイ	ロディー乳剤	2000 倍	7日	4	/	/	/	/	* * / * *

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

ぼんかん

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 3 9 - 1

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病虫害	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
かいよう病 黒点病	ICボルドー412	50 倍	—		/	/	/	/	/
かいよう病	ICボルドー66D	25～200 倍	—		/	/	/	/	/
黒点病	エムダイファー水和剤	600～800 倍	90日	2	/	/	* */ * *	* */ * *	* */ * *
かいよう病	コサイド3000 +クレフノン200倍	2000 倍	—		/	/	/	/	/
灰色かび病	スイッチ顆粒水和剤	2000～3000 倍	45日	2	/	/	* */ * *	* */ * *	* */ * *
灰色かび病 そうか病	ストロビードライフロアブル	2000～3000 倍	14日	3	/	/	/	* */ * *	* */ * *
貯蔵病害	ベフラン液剤25	2000 倍	1日	2	/	/	* */ * *	* */ * *	* */ * *
黒点病	ペンコゼブ水和剤	600～800 倍	90日	4	/	/	/	/	* */ * *
設定なし	マデックEW	2000～3000 倍	10日	1	/	* */ * *	* */ * *	* */ * *	* */ * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

果樹類 かんきつ:果実を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

みかん

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 4 0 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		定植日		管理()		管理()
---------	--------	--	-----	--	-------	--	-------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
アザミウマ類 カメシ類 ロウシ類	アクタラ顆粒水溶剤	2000 倍	14日	3				* * / * *	* * / * *
アカマルカイガラムシ、アザミウマ類、アブラムシ類、カメシ類、コナカイガラムシ類	アドマイヤー顆粒水和剤	5000～10000 倍	14日	3				* * / * *	* * / * *
カイガラムシ類幼虫、ミカンゲコナジラミ若齢幼虫	アプロードフロアブル	1000 倍	14日	3				* * / * *	* * / * *
ハダニ サビダニ	カネマイトフロアブル	1000～1500 倍	7日	1		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
アブラムシ類 アブラムシ類 チャノキイロアザミウマ	キラップフロアブル	1000～2000 倍	21日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
アザミウマ類(ネキアザミウマを除く)、チャノキコリダニ、ミカンサビダニ	コテツフロアブル	2000～6000 倍	1日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
コナカイガラムシ類、チャノキイロアザミウマ	スタークル顆粒水溶剤	1000～2000 倍	1日	3				* * / * *	* * / * *
ハダニ	ダニエモンフロアブル	4000～6000 倍	7日	1		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
カイガラムシ類、ミカンハダニ	ハーベストオイル	150～200 倍	6月～7月中旬						

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--

2025年

みかん

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 4 0 - 1

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病虫害	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
チャノキアザミウマ ミカンサビダニ ミカンハモグリガ	マツチ乳剤	2000～3000倍	14日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
アブラムシ類 カメムシ類 チャノキアザミウマ	ロディー乳剤	2000倍	7日	4	/	/	/	/	* * / * *
黒点病	エムダイファー水和剤	600～800倍	60日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
灰色かび病	スイッチ顆粒水和剤	2000～3000倍	7日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
灰色かび病 そうか病	ストロビードライフフロアブル	2000～3000倍	14日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
貯蔵病害	ベフラン液剤25	2000倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
黒点病	ペンコゼブ水和剤	400～800倍	30日	4	/	/	/	/	* * / * *
貯蔵病害(黒斑病). 貯蔵病害(軸腐病). 貯蔵病害(青かび)	ベンレート水和剤	4000～6000倍	1日	4	/	/	/	/	* * / * *
そうか病	マネージDF	4000～6000倍	30日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

果樹類 かんきつ: 果実を収穫するもの(温州みかん、紀州みかん) ※ ダニコングフロアブルは残留基準値が2020/3/20より変更されます

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

ゆず

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 4 1 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		定植日		管理()		管理()
---------	--------	--	-----	--	-------	--	-------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
アザミウマ類 カメシ類	アクタラ顆粒水溶剤	2000 倍	14日	3				* * / * *	* * / * *
カイガラムシ類幼虫,ミントゲコナジラミ若齢幼虫	アプロードフロアブル	1000 倍	45日	3				* * / * *	* * / * *
ハダニ サビダニ	カネマイトフロアブル	1000～1500 倍	7日	1		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
アブラムシ類,チャノキイロアザミウマ	キラップフロアブル	1000～2000 倍	21日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
アザミウマ類(ネキアザミウマを除く),チャノホコリダニ,ミカンサビダニ	コテツフロアブル	2000～6000 倍	1日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
コナカイガラムシ類,チャノキイロアザミウマ	スタークル顆粒水溶剤	1000～2000 倍	1日	3				* * / * *	* * / * *
ハダニ	ダニエモンフロアブル	4000～6000 倍	7日	1		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
アゲハ類 チャノキイロアザミウマ ミカンサビダニ	マツチ乳剤	2000～3000 倍	21日	1		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
ミドリヒメコバイ	ロディー乳剤	2000 倍	7日	4					* * / * *

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--

2025年

ゆず

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 4 1 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
かいよう病 黒点病	ICボルドー412	50 倍	—		/	/	/	/	/
かいよう病	ICボルドー66D	25～200 倍	—		/	/	/	/	/
黒点病	エムダイファー水和剤	600～800 倍	90日	2	/	/	* */ * *	* */ * *	* */ * *
かいよう病	コサイド3000 +クレフノン200倍	2000 倍	—		/	/	/	/	/
灰色かび病	スイッチ顆粒水和剤	2000～3000 倍	45日	2	/	/	* */ * *	* */ * *	* */ * *
灰色かび病 そうか病	ストロビードライフフロアブル	2000～3000 倍	14日	3	/	/	/	* */ * *	* */ * *
幹腐病,貯蔵病害(すす斑病),貯蔵病害(黒腐病),貯蔵病害(白かび病)	ベフラン液剤25	2000 倍	1日	2	/	/	* */ * *	* */ * *	* */ * *
黒点病	ペンコゼブ水和剤	600～800 倍	90日	4	/	/	/	/	* */ * *
設定なし	マデックEW	2000～3000 倍	10日	1	/	* */ * *	* */ * *	* */ * *	* */ * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

果樹類 かんきつ:果実を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

レモン

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 4 2 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	定植日	/	管理()	/	管理()
---------	--------	---	-----	---	-------	---	-------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
アザミウマ類 カメシ類	アクタラ顆粒水溶剤	2000 倍	14日	3	/	/	/	*/	*/
カイガラムシ類幼虫,ミント コナジラミ若齢幼虫	アプロードフロアブル	1000 倍	45日	3	/	/	/	*/	*/
ハダニ サビダニ	カネマイトフロアブル	1000～1500 倍	7日	1	/	*/	*/	*/	*/
アブラムシ類,チャ ノキイロアザミウマ	キラップフロアブル	1000～2000 倍	21日	2	/	/	*/	*/	*/
アザミウマ類(ネキアザミウ マを除く),チャノホリダニ, ミカンサビダニ	コテツフロアブル	2000～6000 倍	1日	2	/	/	*/	*/	*/
コナカイガラムシ類, チャノキイロアザミウマ	スタークル顆粒水溶剤	1000～2000 倍	1日	3	/	/	/	*/	*/
ハダニ	ダニエモンフロアブル	4000～6000 倍	7日	1	/	*/	*/	*/	*/
アゲハ類 チャノキイロアザミウマ ミカンサビダニ	マツチ乳剤	2000～3000 倍	21日	1	/	*/	*/	*/	*/
ミドリヒメコバイ	ロディー乳剤	2000 倍	7日	4	/	/	/	/	*/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

レモン

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 4 2 - 1

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病虫害	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
かいよう病 黒点病	ICボルドー412	50 倍	—		/	/	/	/	/
かいよう病	ICボルドー66D	25～200 倍	—		/	/	/	/	/
黒点病	エムダイファー水和剤	600～800 倍	90日	2	/	/	* */ * *	* */ * *	* */ * *
かいよう病	コサイド3000 +クレフノン200倍	2000 倍	—		/	/	/	/	/
灰色かび病	スイッチ顆粒水和剤	2000～3000 倍	45日	2	/	/	* */ * *	* */ * *	* */ * *
灰色かび病 そうか病	ストロビードライフロアブル	2000～3000 倍	14日	3	/	/	/	* */ * *	* */ * *
貯蔵病害	ベフラン液剤25	2000 倍	1日	2	/	/	* */ * *	* */ * *	* */ * *
黒点病	ペンコゼブ水和剤	600～800 倍	90日	4	/	/	/	/	* */ * *
設定なし	マデックEW	2000～3000 倍	10日	1	/	* */ * *	* */ * *	* */ * *	* */ * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

果樹類 かんきつ:果実を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

月

作業開始

かんきつ

生産履歴帳

0100110243-1

生産者(コード/氏名)	品種名(※栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	定植日	/	管理()	/	管理()	/
---------	--------	---	-----	---	-------	---	-------	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ケキシイ類 コナカイガラムシ類 ミカンハモグリカ	アクタラ顆粒水溶剤	2000～3000倍	14日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
カイガラムシ類幼虫、ミカン トゲコナジラミ若齢幼虫	アプロードフロアブル	1000倍	45日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
ハダニ サビダニ	カネマイトフロアブル	1000～1500倍	7日	1	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
アブラムシ類 チャノキイロアザミウマ	キラップフロアブル	1000～2000倍	21日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
カネタタキ、スグリゾウムシ、ハ スモンヨトウ、ヨモギエダシヤ ク	コテツフロアブル	2000～4000倍	1日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
コナカイガラムシ類、 チャノキイロアザミウマ	スタークル顆粒水溶剤	1000～2000倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
ハダニ	ダニエモンフロアブル	4000～6000倍	7日	1	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
アゲハ類 チャノキイロアザミウマ ミカンサビダニ	マツチ乳剤	2000～3000倍	21日	1	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
ミドリヒメコバイ	ロディー乳剤	2000倍	7日	4	/	/	/	/	* * / * *

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

かんきつ

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 4 3 - 1

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病虫害	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
かいよう病 黒点病	ICボルドー412	50 倍	—		/	/	/	/	/
かいよう病	ICボルドー66D	25～200 倍	—		/	/	/	/	/
黒点病	エムダイファー水和剤	600～800 倍	90日	2	/	/	* */ * *	* */ * *	* */ * *
かいよう病	コサイド3000 +クレフノン200倍	1000～2000 倍	—		/	/	/	/	/
灰色かび病	スイッチ顆粒水和剤	2000～3000 倍	45日	2	/	/	* */ * *	* */ * *	* */ * *
灰色かび病 そうか病	ストロビードライフロアブル	2000～3000 倍	14日	3	/	/	/	* */ * *	* */ * *
貯蔵病害	ベフラン液剤25	2000 倍	1日	2	/	/	* */ * *	* */ * *	* */ * *
黒点病	ペンコゼブ水和剤	600～800 倍	90日	4	/	/	/	/	* */ * *
設定なし	マデックEW	2000～3000 倍	10日	1	/	* */ * *	* */ * *	* */ * *	* */ * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

かんきつ

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

うめ

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 4 4 - 1

生産者(コード/氏名)		品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000				a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	定植日	/	管理()	/	管理()	/
---------	--------	---	-----	---	-------	---	-------	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病虫害	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
アブラムシ類	アクタラ顆粒水溶剤	2000～3000倍	7日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
カイガラムシ類	アタックオイル	50 倍	12月		/	/	/	/	/
カイガラムシ類幼虫	アプロードフロアブル	1000 倍	7日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
アブラムシ類 カメシ類	スタークル顆粒水溶剤	2000 倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
アブラムシ類、カメシ類、ケムシ類	ダントツ水溶剤	2000～4000倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
アブラムシ類、カメシ類、シクイムシ類	テルスターフロアブル	3000 倍	1日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
かいよう病	ICボルドー66D	50 倍	発芽前		/	/	/	/	/
すす斑病 黒星病	インダーフロアブル	5000 倍	1日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
黒星病	オーシャイン水和剤	3000 倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

うめ

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 4 4 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
黒星病	オーソサイド水和剤80	800～1000倍	21日	3	/	/	/	* */ * *	* */ * *
すす斑病 黒星病	ストロビードライフフロアブル	2000～3000倍	7日	3	/	/	/	* */ * *	* */ * *
かいよう病	Zボルドー	500倍	—		/	/	/	/	/
かいよう病	スターナ水和剤	1000倍	7日	3	/	/	/	* */ * *	* */ * *
すす斑病,灰色かび病,灰星病,黒星病	ファンタジスタ顆粒水和剤	3000倍	1日	2	/	/	* */ * *	* */ * *	* */ * *
すす斑病	ベルコートフロアブル	2000倍	30日	3	/	/	/	* */ * *	* */ * *
灰色かび病	ロブラール水和剤	1000～1500倍	45日	2	/	/	* */ * *	* */ * *	* */ * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

果樹類 核果類 小粒核果類:果実を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

月

作業開始

さやえんどう

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 4 5 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	播種日	/	定植日	/	/
---------	--------	---	-----	---	-----	---	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
コガネムシ類幼虫	ダイアジノン粒剤5	4～6 kg/10s	定植時	2	/	/	/	/	/
ハモグリハエ類	アフーム乳剤	2000 倍	3日	2	/	/	/	/	/
ハスモンヨトウ, ハダニ類	コテツフロアブル	2000 倍	1日	2	/	/	/	/	/
ハダニ類	コロマイト乳剤	1500 倍	1日	2	/	/	/	/	/
ハダニ類	ダニトロンフロアブル	1000～2000 倍	7日	1	/	/	/	/	/
アザミウマ類, ハスモンヨトウ, ハモグリハエ類	ディアナSC	2500～5000 倍	1日	2	/	/	/	/	/
ハスモンヨトウ	フェニックス顆粒水和剤	2000～4000 倍	1日	2	/	/	/	/	/
シロイチモンジヨトウ, ハスモンヨトウ	プレオフロアブル	1000～2000 倍	1日	2	/	/	/	/	/
カメムシ類, ハモグリハエ類, マメシキイガ	マラソン乳剤	1000 倍	7日	3	/	/	/	/	/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

さやえんどう

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 4 5 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
アザミウマ類	モスピラン顆粒水溶剤	4000 倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
さび病,灰色かび病,菌核病	アフエットフロアブル	2000 倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
褐斑細菌病,黒腐病,軟腐病,斑点細菌病	コサイド3000	2000 倍	—		/	/	/	/	/
灰色かび病,菌核病	セイビアーフロアブル20	1000 倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

実えんどう、さやえんどう:野菜類 豆類(未成熟) えんどうまめ:野菜類 豆類(種実) ※ それぞれで登録農薬の分類が異なります

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

ささげ

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 4 6 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		播種日		定植日		* * / * *
---------	--------	--	-----	--	-----	--	-----------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
カラス、ハト	キヒゲンR-2フロアブル	20 ml/kg		1		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
コナジラミ類幼虫	ダイアジノン粒剤5	4～6 kg/10a	60日	3				* * / * *	* * / * *
コナジラミ類	エコピタ液剤	100～200 倍	1日						
アオムシ、ウリノメイガ、オオタバコガ、コナガ、シロイチモンジ、ヨトウ、ハスモンヨトウ	デルフィン顆粒水和剤	1000 倍	1日						
アブラムシ類 カメムシ類	トレボン乳剤	1000 倍	14日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
アザミウマ類、アブラムシ類、コナジラミ類	モスピラン顆粒水溶剤	2000～4000 倍	14日	3				* * / * *	* * / * *
うどんこ病	ジーファイン水和剤	750～1000 倍	1日						
うどんこ病 褐斑病 炭そ病	ベルクート水和剤	1000 倍	7日	3				* * / * *	* * / * *

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--

0 1 0 0 1 1 0 2 4 6 - 1

2025年 月 作業開始

食用ぎく

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 4 7 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	播種日	/	定植日	/	*/	*/
---------	--------	---	-----	---	-----	---	----	----

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
フザリウム菌による病害	ベンレート水和剤	乾燥種子重量0.16%	播種前	1	/	*/	*/	*/	*/
ハダニ類	アカリタッチ乳剤	1000～3000倍	1日		/	/	/	/	/
アブラムシ類,うどんこ病,ハダニ類	エコピタ液剤	100倍	1日		/	/	/	/	/
アオムシ,コナガ,ヨトウムシ	ゼンターリ顆粒水和剤	1000～2000倍	1日		/	/	/	/	/
うどんこ病	カリグリーン	800～1000倍	1日		/	/	/	/	/
べと病,褐斑細菌病,黒斑細菌病,黒腐病,斑点細菌病	Zボルドー	500倍	—		/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

ヤーコン

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 4 8 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	播種日	/	定植日	/	/
---------	--------	---	-----	---	-----	---	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ハダニ類 うどんこ病	アカリタッチ乳剤	2000 倍	1日		/	/	/	/	/
アブラムシ類,うどんこ病,ハダニ類	エコピタ液剤	100 倍	1日		/	/	/	/	/
うどんこ病	ジーファイン水和剤	750～1000 倍	1日		/	/	/	/	/
アオムシ,ウリノメイガ,オオタバコガ,コナガ,シロイチモンジヨトウ,ハスモンヨトウ	デルフィン顆粒水和剤	1000 倍	1日		/	/	/	/	/
褐斑細菌病,黒腐病,軟腐病,斑点細菌病	コサイド3000	2000 倍	—		/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

ヤーコン

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 4 8 - 1

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

[illegible]

野菜類 いも類:塊根を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

月

作業開始

ヤーコン(茎葉)

生産履歴帳

0100110249-1

生産者(コード/氏名)	品種名(※栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	播種日	/	定植日	/	/
---------	--------	---	-----	---	-----	---	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ハダニ類 うどんこ病	アカリタッチ乳剤	1000～3000倍	1日		/	/	/	/	/
アブラムシ類,うどんこ病,ハダニ類	エコピタ液剤	100倍	1日		/	/	/	/	/
アオムシ,ウリナメカ,オオタバコガ,コナガ,シロイチモンジヨトウ,ハスモンヨトウ	デルフィン顆粒水和剤	1000倍	1日		/	/	/	/	/
アオムシ,コナガ	バシレックス水和剤	1000～2000倍	1日		/	/	/	/	/
褐斑細菌病,黒腐病,軟腐病,斑点細菌病	コサイド3000	2000倍	—		/	/	/	/	/
うどんこ病 軟腐病 白さび病	ジーファイン水和剤	1000倍	1日		/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

ヤーコン(茎葉) 生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 4 9 - 1

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

[illegible]

野菜類 葉菜類 レタス類以外のきく科葉菜類: 茎葉を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

うこん

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 5 0 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい) ■収穫開始予定月 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	/	/	/	/
---------	--------	---	---	---	---	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
アオムシ,コナガ	バシレックス水和剤	1000～2000倍	1日		/	/	/	/	/
褐斑細菌病,黒腐病,軟腐病,斑点細菌病	コサイド3000	2000倍	—		/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

うこん

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 5 0 - 1

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

[illegible]

野菜類 根菜類 畑地根菜類:根茎を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

月

作業開始

コールラビ

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 5 1 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	播種日	/	定植日	/	/
---------	--------	---	-----	---	-----	---	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ハダニ類 うどんこ病	アカリタッチ乳剤	1000～3000倍	1日		/	/	/	/	/
コナジラミ類	エコピタ液剤	100～200倍	1日		/	/	/	/	/
アオムシ、ウリノメイガ、オオタバコガ、コナガ、シロイチモンジヨトウ、ハスモンヨトウ	デルフィン顆粒水和剤	1000倍	1日		/	/	/	/	/
褐斑細菌病、黒腐病、軟腐病、斑点細菌病	コサイド3000	2000倍	—		/	/	/	/	/
うどんこ病	ハーモメイト水溶剤	800～1000倍	1日		/	/	/	/	/
軟腐病	Zボルドー	500～1000倍	—		/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

0 1 0 0 1 1 0 2 5 1 - 1

2025年 月 作業開始

きくいも

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 5 2 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		播種日		定植日		* * / * *
---------	--------	--	-----	--	-----	--	-----------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ハダニ類 うどんこ病	アカリタッチ乳剤	2000 倍	1日						
アブラムシ類,うどんこ病,ハダニ類	エコピタ液剤	100 倍	1日						
アオムシ,ウリハメカ,オオタバコガ,コナガ,シロイチモンジヨトウ,ハスモンヨトウ	デルフィン顆粒水和剤	1000 倍	1日						
うどんこ病	ジーファイン水和剤	750～1000 倍	1日						

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--

0 1 0 0 1 1 0 2 5 2 - 1

2025年 月 作業開始

イモ類

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 5 3 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい) ■収穫開始予定月 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		播種日		定植日		* * / * *
---------	--------	--	-----	--	-----	--	-----------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ハダニ類 うどんこ病	アカリタッチ乳剤	2000～3000倍	1日						
アブラムシ類、うどんこ病、ハダニ類	エコピタ液剤	100倍	1日						
アオムシ、ウリナメイガ、オオタバコガ、コナガ、シロイチモンジヨトウ、ハスモンヨトウ	デルフィン顆粒水和剤	1000倍	1日						
うどんこ病	イオウフロアブル	500～1000倍	—						
うどんこ病	ジーファイン水和剤	750～1000倍	1日						

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--

イモ類

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 5 3 - 1

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

[illegible]

野菜類

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

月

作業開始

やまのいも

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 5 4 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	播種日	/	定植日	/	/
---------	--------	---	-----	---	-----	---	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
褐色腐敗病 青かび病	ベンレート水和剤20	100～200 倍	植付前	1	/	/	/	/	/
タネハエ	フォース粒剤	4 kg/10a	植付時	1	/	/	/	/	/
ネコブセンチュウ	ネマトリンエース粒剤	20 kg/10a	植付前	1	/	/	/	/	/
ナガイモコガ	アタブロン乳剤	2000 倍	7日	3	/	/	/	/	/
カンザワハタニ ナガイモコガ	コテツフロアブル	2000 倍	1日	2	/	/	/	/	/
カンザワハタニ	コロマイト乳剤	1000 倍	7日	2	/	/	/	/	/
アオムシ、ウリノメイガ、オオタバコガ、コナガ、シロイチモン、ヨトウ、ハスモンヨトウ	デルフィン顆粒水和剤	1000 倍	1日		/	/	/	/	/
アブラムシ類、ハスモンヨトウ、ヤマノイモコガ	トレボン乳剤	1000 倍	14日	3	/	/	/	/	/
ナガイモコガ	フェニックス顆粒水和剤	2000～4000 倍	1日	2	/	/	/	/	/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

やまのいも

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 5 4 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
アザミウマ類	モスピラン顆粒水溶剤	4000 倍	7日	5					
炭疽病,葉渋病	オンリーワンフロアブル	1000 倍	7日	3				* *	* *
葉渋病	ストロビーフロアブル	2000～3000 倍	7日	3				* *	* *
べと病,褐斑細菌病,黒斑細菌病,黒腐病,斑点細菌病	Zボルドー	500 倍	—						
つる枯病 炭疽病 葉渋病	ダコニール1000	1000 倍	30日	6					
炭疽病 葉渋病	トップジンM水和剤	800 倍	7日	5					
葉渋病	フロンサイド水和剤	2000 倍	7日	4					* *

野菜類 いも類:塊茎を収穫するもの ※ やまのいも(むかご)とは登録分類が異なります

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------

2025年 月 作業開始

わさび

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 5 5 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		播種日		定植日		* * / * *
---------	--------	----------------------	-----	----------------------	-----	----------------------	-----------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病虫害	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ナトビハムシ	トレボン粒剤	3 kg/10a	畑育苗期	1		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
アブラムシ類	アドマイヤーフロアブル	4000 倍	畑育苗期	3				* * / * *	* * / * *
アオムシ、ウリノメイガ、オオタバコガ、コナガ、シロイチモンジヨトウ、ハスモンヨトウ	デルフィン顆粒水和剤	1000 倍	1日						
アオムシ、コナガ	バシレックス水和剤	1000～2000 倍	1日						
白さび病	アミスター20フロアブル	2000 倍	畑育苗期	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
褐斑細菌病	コサイド3000	2000 倍	—						
軟腐病	バイオキパー水和剤	500～2000 倍	発病前初期						
うどんこ病	ハーモメイト水溶剤	800～1000 倍	1日						
うどんこ病	ボトキラー水和剤	1000 倍	発病前初期						

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------

2025年

わさび

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 5 5 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
軟腐病	Zボルドー	500～1000倍	—		/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

野菜類:葉、花茎、根茎及び根を収穫するもの。水系で栽培されるもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---