

2025年 月 作業開始

キャベツ

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 7 1 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	播種日	/	定植日	/	/
---------	--------	---	-----	---	-----	---	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病虫害	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
根こぶ病	オラクル粉剤	30 kg/10a		2	/	/	/	/	/
アオムシコナガ タマキンウハ ハスモンヨトウ	アフーム乳剤	1000～2000倍	1日	3	/	/	/	/	/
アブラムシ類	ウララDF	2000～3000倍	1日	2	/	/	/	/	/
アオムシ ハスモンヨトウ	コテツフロアブル	2000 倍	1日	2	/	/	/	/	/
アブラムシ類	コルト顆粒水和剤	3000～4000倍	1日	3	/	/	/	/	/
アオムシ アブラムシ類 コナガ ヨトウムシ	トレボン乳剤	1000～2000倍	3日	3	/	/	/	/	/
アオムシ、ウハ類、オオタバコガ、コナガ、ヨトウムシ	フェニックス顆粒水和剤	2000～4000倍	1日	3	/	/	/	/	/
アオムシ、ウハ類、コナガ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ	プレバソンフロアブル5	2000 倍	1日	3	/	/	/	/	/
アオムシ、コナガ、ヨトウムシ	マツチ乳剤	2000～3000倍	7日	3	/	/	/	/	/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

キャベツ

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 7 1 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
アオムシ、カブラハバチ	マラソン乳剤	1000 倍	1日	5	/	/	/	/	/
アザミウマ類 アブラムシ類	モスピラン顆粒水溶剤	2000～4000 倍	7日	5	/	/	/	/	/
株腐病 菌核病	アフエットフロアブル	2000 倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
株腐病 菌核病	アミスター20フロアブル	2000 倍	7日	4	/	/	/	/	* * / * *
黒腐病 軟腐病	カスミンボルドー	1000 倍	7日	4	/	/	/	/	* * / * *
褐斑細菌病、黒腐病、 軟腐病、斑点細菌病	コサイド3000	2000 倍	—		/	/	/	/	/
べと病	ダコニール1000	1000 倍	14日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
菌核病	トップジンM水和剤	1000～1500 倍	3日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
株腐病 黒腐病 軟腐病	バリダシン液剤5	800 倍	7日	5	/	/	/	/	/
べと病	ランマンフロアブル	2000 倍	3日	4	/	/	/	/	* * / * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

野菜類 葉菜類 結球あぶらな科葉菜類:結球した茎葉を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

月作業開始

はくさい

生産履歴帳

0100110272-1

生産者(コード/氏名)	品種名(※栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	播種日	/	定植日	/	/
---------	--------	---	-----	---	-----	---	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ケラコガネムシ類幼虫 ネキリムシ類	ダイアジノン粒剤5	4 kg/10a	播種時	1	/	/	/	/	/
根こぶ病	オラクル粉剤	30 kg/10a	定植前	2	/	/	/	/	/
アオムシコナガ、ヨトウムシ	アファーム乳剤	1000～2000倍	7日	3	/	/	/	/	/
アブラムシ類	ウララDF	2000～3000倍	1日	2	/	/	/	/	/
アオムシ	カスケード乳剤	2000～4000倍	7日	2	/	/	/	/	/
アブラムシ類	コルト顆粒水和剤	4000倍	3日	3	/	/	/	/	/
アオムシ・コナガ・ハイマダラノメイガ	ディアナSC	2500～5000倍	1日	2	/	/	/	/	/
アオムシ オオタバコガ コナガ ヨトウムシ	プレオフロアブル	1000倍	7日	2	/	/	/	/	/
アオムシコナガ ハイマダラノメイガ ハスモンヨトウ ヨトウムシ	プレバソンフロアブル5	2000倍	1日	3	/	/	/	/	/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

はくさい

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 7 2 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
アブラムシ類	モスピラン顆粒水溶剤	2000～4000倍	14日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
べと病 黒斑病 白さび病	アミスター20フロアブル	2000 倍	7日	4	/	/	/	/	* * / * *
褐斑細菌病,黒腐病, 軟腐病,斑点細菌病	コサイド3000	2000 倍	—		/	/	/	/	/
黒斑細菌病	スターナ水和剤	1000 倍	7日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
白斑病,べと病, 白さび病,黒斑病	ダコニール1000	1000 倍	7日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
白斑病	トップジンM水和剤	1500 倍	7日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
軟腐病	バリダシン液剤5	500 倍	3日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
べと病	ランマンフロアブル	2000 倍	3日	4	/	/	/	/	* * / * *
菌核病,白斑病	ロブラール水和剤	1000～1500倍	14日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

野菜類 葉菜類 結球あぶらな科葉菜類:結球した茎葉を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

レタス

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 7 3 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		播種日		定植日		
---------	--------	----------------------	-----	----------------------	-----	----------------------	----------------------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ケラコガネムシ類幼虫 ネキリムシ類	ダイアジノン粒剤5	4～6 kg/10a	播種時又は定植時	2					
ハスモンヨトウ ナモグリバエ	アフーム乳剤	1000～2000倍	3日	3					
アブラムシ類	ウララDF	2000倍	1日	2					
ハスモンヨトウ オオタバコガ	カスケード乳剤	4000倍	3日	3					
オオタバコガ	ディアナSC	2500～5000倍	1日	2					
オオタバコガ ハスモンヨトウ	プレバソンフロアブル5	2000倍	1日	3					
アブラムシ類	モスピラン顆粒水溶剤	2000～4000倍	1日	3					
すそ枯病	アフェットフロアブル	2000倍	1日	3					
すそ枯病 べと病 灰色かび病 菌核病	アミスター20フロアブル	2000倍	7日	4					

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------

2025年

レタス

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 7 3 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
褐斑細菌病,黒腐病,軟腐病,斑点細菌病	コサイド3000	2000 倍	—		/	/	/	/	/
軟腐病	スターナ水和剤	2000 倍	7日	2	/	/	* / *	* / *	* / *
灰色かび病,菌核病	トップジンM水和剤	1500～2000 倍	7日	2	/	/	* / *	* / *	* / *
すそ枯病,軟腐病,腐敗病	バリダシン液剤5	800 倍	1日	3	/	/	/	* / *	* / *
べと病	ランマンフロアブル	2000 倍	3日	3	/	/	/	* / *	* / *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

野菜類 葉菜類 レタス類:結球した茎葉を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

月

作業開始

ほうれんそう

生産履歴帳

0100110274-1

生産者(コード/氏名)		品種名(※栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000				a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	播種日	/	定植日	/	/
---------	--------	---	-----	---	-----	---	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病虫害	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
タネバエ	ダイアジノン粒剤5	6 kg/10a	播種時	1	/	/	/	/	/
アブラムシ類,ウリハムシ,モドキ	アクタラ顆粒水溶剤	2000 倍	3日	2	/	/	/	/	/
ハスモンヨトウ ホウレンソウケナカコナダニ	アフーム乳剤	2000 倍	3日	2	/	/	/	/	/
アシクロハモグリハエ	カスケード乳剤	4000 倍	3日	3	/	/	/	/	/
ハダニ類	ダニトロンフロアブル	2000 倍	21日	1	/	/	/	/	/
シロビノメイガ	ディアナSC	2500～5000 倍	1日	2	/	/	/	/	/
ミナミキイロアザミウマ	パダンSG水溶剤	1500 倍	7日	2	/	/	/	/	/
ハスモンヨトウ	プレバソンフロアブル5	2000 倍	1日	3	/	/	/	/	/
べと病	アリエッティ水和剤	1500 倍	1日	2	/	/	/	/	/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

ほうれんそう

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 7 4 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
褐斑細菌病,黒腐病,軟腐病,斑点細菌病	コサイド3000	2000 倍	—		/	/	/	/	/
べと病	ランマンフロアブル	2000 倍	3日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

野菜類 葉菜類 ヒユ科葉菜類:茎葉を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

こまつな

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 7 5 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい) ■収穫開始予定月 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	播種日	/	定植日	/	/
---------	--------	---	-----	---	-----	---	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病虫害	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ネキリムシ類	ダイアジノン粒剤5	6 kg/10a		1	/	/	/	/	/
根こぶ病	オラクル粉剤	20～30 kg/10a		2	/	/	/	/	/
コナガ	アフーム乳剤	2000 倍	3日	2	/	/	/	/	/
アブラムシ類、カブラハバチ、キスジノミハムシ	モスピラン顆粒水溶剤	4000 倍	7日	1	/	/	/	/	/
アオムシ、アザミウマ類、コナガ、ハイマダラノメイガ、ハスモンヨトウ	ディアナSC	2500～5000 倍	1日	2	/	/	/	/	/
コナガ	プレバソンフロアブル5	2000 倍	1日	2	/	/	/	/	/
アブラムシ類	ウララDF	4000 倍	1日	2	/	/	/	/	/
白さび病、白斑病	アミスター20フロアブル	2000 倍	7日	2	/	/	/	/	/
褐斑細菌病、黒腐病、軟腐病、斑点細菌病	コサイド3000	2000 倍	—		/	/	/	/	/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

こまつな

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 7 5 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
うどんこ病	ジーファイン水和剤	750～1000倍	1日		/	/	/	/	/
炭疽病,白斑病	ベンレート水和剤	4000倍	21日	1	/	* / *	* / *	* / *	* / *
白さび病	ランマンフロアブル	2000倍	3日	3	/	/	/	* / *	* / *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

野菜類 葉菜類:茎葉(花茎がのびだす前のもの)を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

しゅんぎく

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 7 6 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		播種日		定植日		
---------	--------	----------------------	-----	----------------------	-----	----------------------	----------------------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病虫害	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ハモグリハエ類	スタークル粒剤	9 kg/10a	定植時	1					
アザミウマ マメハモグリハエ シロイチモジトウ	アフーム乳剤	2000 倍	7日	2					
アブラムシ類	ウララDF	4000 倍	1日	2					
アザミウマ ヨトウ マメハモグリハエ	カスケード乳剤	2000～4000 倍	7日	2					
オオタバコガ、ハスモン ヨトウ、ハモグリハエ類	ディアナSC	2500～5000 倍	1日	2					
ハスモンヨトウ	プレオフロアブル	1000 倍	1日	2					
アブラムシ類	モスピラン顆粒水溶剤	8000 倍	3日	2					
炭疽病	アミスター20フロアブル	2000 倍	1日	2					
褐斑細菌病、黒腐病、 軟腐病、斑点細菌病	コサイド3000	2000 倍	—						

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------

しゅんぎく

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 7 6 - 1

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

[illegible]

野菜類 葉菜類 レタス類以外のきく科葉菜類: 茎葉を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

みずな

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 7 7 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		播種日		定植日		* * / * *
---------	--------	--	-----	--	-----	--	-----------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ネキリムシ類	ダイアジノン粒剤5	6 kg/10a	は種又は定植時	1		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
根こぶ病	オラクル粉剤	20～30 kg/10a	は種又は定植前	2		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
アオムシ、アザミウマ類、コナガ、ハスモンヨトウ、ハモグリバエ類、ヨトウムシ	アフーム乳剤	1000～2000 倍	7日	3			* * / * *	* * / * *	* * / * *
アブラムシ類	ウララDF	4000 倍	1日	2		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
コナガ、ハスモンヨトウ	ディアナSC	2500～5000 倍	1日	2		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
コナガ	プレバソンフロアブル5	2000 倍	1日	2		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
アブラムシ類、カブラハバチ、キスジノミハムシ	モスピラン顆粒水溶剤	4000 倍	7日	1		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
白さび病	アミスター20フロアブル	2000 倍	7日	2		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
褐斑細菌病、黒腐病、軟腐病、斑点細菌病	コサイド3000	2000 倍	—						

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--

2025年

みずな

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 7 7 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
うどんこ病	ジーファイン水和剤	750～1000倍	1日		/	/	/	/	/
炭疽病,白斑病	ベンレート水和剤	4000倍	14日	1	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
白さび病	ランマンフロアブル	2000倍	3日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

野菜類 葉菜類:茎葉(花茎がのびだす前のもの)を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

月作業開始

ブロッコリー

生産履歴帳

0100110278-1

生産者(コード/氏名)	品種名(※栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	播種日	/	定植日	/	/
---------	--------	---	-----	---	-----	---	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
コガネムシ類幼虫	ダイアジノン粒剤5	4～6 kg	30日	2	/	/	/	/	/
根こぶ病	オラクル粉剤	20 kg/10a	定植前	2	/	/	/	/	/
コナガアブラムシ類	アディオン乳剤	2000 倍	3日	5	/	/	/	/	/
アオムシ・オオタバコガ・コナガ・ヨトウムシ	アフーム乳剤	1000～2000 倍	3日	3	/	/	/	/	/
アブラムシ類	ウララDF	2000～3000 倍	1日	2	/	/	/	/	/
ハスモンヨトウ	カスケード乳剤	4000 倍	7日	2	/	/	/	/	/
アオムシ・アザミウマ類・ウハ・類・オオタバコガ・コナガ・シロイチモンジヨトウ	グレーシア乳剤	2000～3000 倍	7日	2	/	/	/	/	/
アブラムシ類	コルト顆粒水和剤	4000 倍	1日	3	/	/	/	/	/
アオムシ・コナガ・ハスモンヨトウ	ディアナSC	2500～5000 倍	1日	2	/	/	/	/	/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

ブロッコリー

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 7 8 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
コナガハスモンヨトウ	プレオフロアブル	1000 倍	7日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
アオムシコナガハスモンヨトウ	プレバソンフロアブル5	2000 倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
アオムシアブラムシ類アザミウマ類	モスピラン顆粒水溶剤	2000 倍	14日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
菌核病,黒すす病,根朽病	アフェットフロアブル	2000 倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
べと病,菌核病,黒すす病	アミスター20フロアブル	2000 倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
黒腐病	カスミンボルドー	1000 倍	7日	4	/	/	/	/	* * / * *
べと病	シグナムWDG	1500～2000 倍	7日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
べと病	ダコニール1000	1000 倍	21日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
菌核病	トップジンM水和剤	2000 倍	14日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
べと病	ランマンフロアブル	2000 倍	3日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
軟腐病	Zボルドー	500～1000 倍	—		/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

野菜類 あぶらな科野菜(花蕾及び茎) はなやさい類:花蕾及び花茎を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

月作業開始

カリフラワー

生産履歴帳

0100110279-1

生産者(コード/氏名)	品種名(※栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	播種日	/	定植日	/	/
---------	--------	---	-----	---	-----	---	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
コガネムシ類幼虫 ケラネキムシ類	ダイアジノン粒剤5	4～6 kg/10a	30日	2	/	/	/	/	/
根こぶ病	オラクル粉剤	20 kg/10a	定植前	2	/	/	/	/	/
コナガ	アタブロン乳剤	2000 倍	7日	2	/	/	/	/	/
コナガ アブラムシ類	アディオン乳剤	2000 倍	3日	5	/	/	/	/	/
アオムシコナガ アザミウマ	アフーム乳剤	1000～2000 倍	3日	3	/	/	/	/	/
アブラムシ類	ウララDF	2000 倍	14日	2	/	/	/	/	/
コナガ	コテツフロアブル	2000 倍	3日	2	/	/	/	/	/
アオムシアザミウマ類、ウハ ハ類、オオタバコガ、コナガ、 シロイチモジヨトウ	グレーシア乳剤	2000～3000 倍	7日	2	/	/	/	/	/
コナガ	ディアナSC	2500～5000 倍	1日	2	/	/	/	/	/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

カリフラワー

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 7 9 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
コナガ	プレオフロアブル	1000 倍	3日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
アオムシコナガハスモンヨトウ	プレバソンフロアブル5	2000 倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
アオムシ	モスピラン顆粒水溶剤	2000 倍	7日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
アブラムシ類,ヨウムシ	ランネート45DF	1000 倍	7日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
菌核病,黒すす病,根朽病	アフェットフロアブル	2000 倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
べと病	シグナムWDG	1500～2000 倍	7日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
軟腐病	スターナ水和剤	2000 倍	14日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
べと病	ダコニール1000	1000 倍	14日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
菌核病	トップジンM水和剤	2000 倍	1日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
菌核病	ベンレート水和剤	2000 倍	7日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
べと病	ランマンフロアブル	2000 倍	3日	4	/	/	/	/	* * / * *
軟腐病	Zボルドー	500～1000 倍	—		/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

野菜類 あぶらな科野菜(花蕾及び茎) はなやさい類:花蕾及び花茎を収穫するもの(ロマネスコ、カリフラワー含む)

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

メキャベツ

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 8 0 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	播種日	/	定植日	/	*/	*/
---------	--------	---	-----	---	-----	---	----	----

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後に単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病虫害	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
アブラムシ類	オンコル粒剤5	1 g/株	定植時	1	/	*/	*/	*/	*/
根こぶ病	フロンサイド粉剤	30～40kg/10a	播種又は定植	1	/	*/	*/	*/	*/
ハスモンヨトウ	アフーム乳剤	1000 倍	3日	3	/	/	/	*/	*/
ハスモンヨトウ	コテツフロアブル	2000 倍	7日	2	/	/	*/	*/	*/
ハスモンヨトウ	スピノエース顆粒水和剤	5000 倍	7日	3	/	/	/	*/	*/
アオムシ、ウハ類、コナガ	フェニックス顆粒水和剤	2000 倍	1日	3	/	/	/	*/	*/
アブラムシ類	モスピラン顆粒水溶剤	2000 倍	7日	1	/	*/	*/	*/	*/
黒腐病	カスミンボルドー	1000 倍	21日	3	/	/	/	*/	*/
褐斑細菌病、黒腐病、軟腐病、斑点細菌病	コサイド3000	2000 倍	—		/	/	/	/	/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

メキヤベツ

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 8 0 - 1

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

[illegible]

野菜類 葉菜類 結球あぶらな科葉菜類:結球した腋芽(脇芽)を収穫するもの

[illegible]

2025年

月

作業開始

モロヘイヤ

生産履歴帳

0100110281-1

生産者(コード/氏名)		品種名(※栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000				a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	播種日	/	定植日	/	/
---------	--------	---	-----	---	-----	---	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病虫害	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ハスモンヨトウ	アフーム乳剤	2000 倍	1日	3	/	/	/	/	/
ハスモンヨトウ	カスケード乳剤	4000 倍	7日	2	/	/	/	/	/
アザミウマ類	コテツフロアブル	2000 倍	7日	1	/	/	/	/	/
ハダニ類	コロマイト乳剤	1500 倍	1日	1	/	/	/	/	/
アザミウマ類	スタークル顆粒水溶剤	2000 倍	1日	2	/	/	/	/	/
アザミウマ	スピノエース顆粒水和剤	5000 倍	3日	3	/	/	/	/	/
ハダニ類	ダニサラバフロアブル	1000 倍	1日	2	/	/	/	/	/
アザミウマ	トレボン乳剤	1000 倍	14日	1	/	/	/	/	/
ハスモンヨトウ	プレバソンフロアブル5	2000 倍	1日	2	/	/	/	/	/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

モロヘイヤ

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 8 1 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
灰色かび病	アミスター20フロアブル	2000 倍	1日	4	/	/	/	/	* * / * *
褐斑細菌病,黒腐病, 軟腐病,斑点細菌病	コサイド3000	2000 倍	—		/	/	/	/	/
うどんこ病	ハーモメイト水溶剤	800～1000 倍	1日		/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

野菜類 葉菜類:茎葉を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

月

作業開始

チンゲンサイ

生産履歴帳

0100110282-1

生産者(コード/氏名)	品種名(※栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	播種日	/	定植日	/	/
---------	--------	---	-----	---	-----	---	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病虫害	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
根こぶ病	オラクル粉剤	20～30 kg/10a		2	/	/	/	/	/
ネキリムシ類	ダイアジノン粒剤5	6 kg/10a	は種又は定植前	1	/	/	/	/	/
アオムシ、コナガ	アフーム乳剤	1000～2000 倍	3日	3	/	/	/	/	/
アブラムシ類	ウララDF	4000 倍	1日	2	/	/	/	/	/
コナガ、ハスモンヨトウ、ハモグリバエ類	ディアナSC	2500～5000 倍	1日	2	/	/	/	/	/
コナガ	プレバソンフロアブル5	2000 倍	1日	2	/	/	/	/	/
アブラムシ類、カブラハバチ、キスジノミハムシ	モスピラン顆粒水溶剤	4000 倍	7日	1	/	/	/	/	/
白さび病	アミスター20フロアブル	2000 倍	7日	2	/	/	/	/	/
褐斑細菌病、黒腐病、軟腐病、斑点細菌病	コサイド3000	2000 倍	—		/	/	/	/	/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

チンゲンサイ 生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 8 2 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
うどんこ病	ジーファイン水和剤	750～1000倍	1日		/	/	/	/	/
炭疽病,白斑病	ベンレート水和剤	4000倍	7日	1	/	* / *	* / *	* / *	* / *
白さび病	ランマンフロアブル	2000倍	3日	3	/	/	/	* / *	* / *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

野菜類 葉菜類:茎葉(花茎がのびだす前のもの)を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

にら

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 8 3 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		播種日		定植日		* * / * *
---------	--------	--	-----	--	-----	--	-----------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ネキリムシ類	ダイアジノン粒剤5	5 kg/10a	定植時	1		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
白絹病	フロンサイド粉剤	20 kg/10a	30日	1		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
アザミウマ・ネキコガ・ハモグリバエ・ヨトウムシ類	アグロスリン乳剤	2000 倍	7日	3				* * / * *	* * / * *
アザミウマ類	ディアナSC	2500～5000 倍	1日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
アザミウマ類	モスピラン顆粒水溶剤	4000 倍	1日	3				* * / * *	* * / * *
さび病、黒腐菌核病、白絹病、白斑葉枯病	アフエットフロアブル	2000 倍	1日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
白斑葉枯病	アミスター20フロアブル	2000 倍	14日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
褐斑細菌病、黒腐病、軟腐病、斑点細菌病	コサイド3000	2000 倍	—						
さび病	トリフミン水和剤	2000 倍	14日	3				* * / * *	* * / * *

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--

2025年

にら

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 8 3 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
葉腐病	バリダシン液剤5	800 倍	XI揃え前	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

野菜類 鱗茎類 鱗茎類(葉物):葉を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

わけぎ

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 8 4 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		播種日		定植日		* * / * *
---------	--------	--	-----	--	-----	--	-----------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
コガネムシ類幼虫	ダイアジノン粒剤5	4～6 kg/10a	定植時	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
ネギアザミウマ	アドマイヤーフロアブル	2000～4000倍	3日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
シロイチモンジヨトウ	アフーム乳剤	1000～2000倍	7日	3				* * / * *	* * / * *
シロイチモンジヨトウ	スピノエース顆粒水和剤	5000倍	3日	3				* * / * *	* * / * *
シロイチモンジヨトウ	マツチ乳剤	2000倍	21日	3				* * / * *	* * / * *
アザミウマ類	モスピラン顆粒水溶剤	2000倍	7日	3				* * / * *	* * / * *
べと病 さび病 黒腐病 葉斑病	アミスター20フロアブル	2000倍	7日	4					* * / * *
べと病 疫病	アリエッティ水和剤	800倍	3日	3				* * / * *	* * / * *
褐斑細菌病,黒腐病, 軟腐病,斑点細菌病	コサイド3000	2000倍	—						

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--

2025年

わけぎ

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 8 4 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
べと病 さび病 黒斑病 葉枯病	ダコニール1000	1000 倍	14日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
さび病	ラリー水和剤	2000 倍	7日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
べと病	ランマンフロアブル	2000 倍	3日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
黒斑病 ホトリチス葉枯病	ロブラール水和剤	1000～1500 倍	14日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

野菜類 鱗茎類 鱗茎類(葉物):葉及び鱗茎を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

みつば

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 8 5 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	播種日	/	定植日	/	/
---------	--------	---	-----	---	-----	---	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病虫害	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
タネバエ	ダイアジノン粒剤5	6 kg/10a	播種前	1	/	/	/	/	/
キアゲハ、ハスモンヨトウ、ハダニ類、ヨトウムシ	アフーム乳剤	2000 倍	7日	2	/	/	/	/	/
アブラムシ類	ウララDF	2000～4000 倍	3日	2	/	/	/	/	/
キアゲハ、ハスモンヨトウ、ハダニ類	カスケード乳剤	2000 倍	7日	2	/	/	/	/	/
ハスモンヨトウ	コテツフロアブル	2000 倍	14日	1	/	/	/	/	/
ハダニ類	コロマイト乳剤	2000 倍	3日	2	/	/	/	/	/
ハスモンヨトウ	スピノエース顆粒水和剤	5000 倍	7日	2	/	/	/	/	/
ハダニ類	ダニサラバフロアブル	1000 倍	1日	2	/	/	/	/	/
アブラムシ類	モスピラン顆粒水溶剤	8000 倍	7日	1	/	/	/	/	/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

みつば

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 8 5 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
灰色かび病	アミスター20フロアブル	2000 倍	14日	1	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
べと病	アリエッティ水和剤	1000 倍	14日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
菌核病	トップジンM水和剤	2000 倍	14日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
べと病	ランマンフロアブル	2000 倍	3日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
軟腐病	Zボルドー	500～1000 倍	—		/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

野菜類 葉菜類 セリ科葉菜類:茎葉を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

月

作業開始

しそ

生産履歴帳

0100110286-1

生産者(コード/氏名)	品種名(※栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	播種日	/	定植日	/	/
---------	--------	---	-----	---	-----	---	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
カンザワハダニ ハスモンヨトウ ヨトウムシ	アフーム乳剤	2000 倍	7日	2	/	/	/	/	/
アブラムシ類	ウララDF	4000 倍	3日	2	/	/	/	/	/
ハスモンヨトウ	カスケード乳剤	4000 倍	3日	2	/	/	/	/	/
サビダニ類	コロマイト乳剤	2000 倍	1日	2	/	/	/	/	/
ハスモンヨトウ	プレオフロアブル	1000 倍	7日	2	/	/	/	/	/
ハスモンヨトウ	プレバソンフロアブル5	2000 倍	1日	3	/	/	/	/	/
アブラムシ類	モスピラン顆粒水溶剤	4000 倍	14日	2	/	/	/	/	/
灰色かび病	アフエットフロアブル	2000 倍	3日	2	/	/	/	/	/
さび病	アミスター20フロアブル	2000 倍	1日	2	/	/	/	/	/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

しそ

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 8 6 - 1

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

[illegible]

野菜類 葉菜類 しそ科葉菜類: 茎葉を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

月

作業開始

おかひじき

生産履歴帳

0100110287-1

生産者(コード/氏名)	品種名(※栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	播種日	/	定植日	/	/
---------	--------	---	-----	---	-----	---	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ハダニ類 うどんこ病	アカリタッチ乳剤	1000～3000倍	1日		/	/	/	/	/
アブラムシ類	ウララDF	4000倍	3日	2	/	/	/	/	/
アブラムシ類、うどんこ病、ハダニ類	エコピタ液剤	100倍	1日		/	/	/	/	/
アオムシ、ウリノメイガ、オオタバコガ、コナガ、シロイチモンジ、トウ、ハスモンヨトウ	デルフィン顆粒水和剤	1000倍	1日		/	/	/	/	/
アブラムシ類	モスピラン顆粒水溶剤	4000倍	7日	2	/	/	/	/	/
褐斑細菌病、黒腐病、軟腐病、斑点細菌病	コサイド3000	2000倍	—		/	/	/	/	/
うどんこ病	ハーモメイト水溶剤	800～1000倍	1日		/	/	/	/	/
べと病	ランマンフロアブル	2000倍	3日	2	/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

0 1 0 0 1 1 0 2 8 7 - 1

2025年 月 作業開始

タアサイ

生産履歴帳

0100110288-1

生産者(コード/氏名)	品種名(※栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		播種日		定植日		* * / * *
---------	--------	--	-----	--	-----	--	-----------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病虫害	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ネキリムシ類	ダイアジノン粒剤5	6 kg/10a	は種時又は定植時	1		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
根こぶ病	オラクル粉剤	20～30 kg/10a	は種前又は定植前	2		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
アオムシ	アディオン乳剤	2000 倍	1日	3			* * / * *	* * / * *	* * / * *
アオムシ、アザミウマ類、コナガ、ハスモンヨトウ、ハモグリバエ類、ヨトウムシ	アフーム乳剤	1000～2000 倍	7日	3			* * / * *	* * / * *	* * / * *
アブラムシ類	ウララDF	4000 倍	1日	2		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
コナガ、ハスモンヨトウ	ディアナSC	2500～5000 倍	1日	2		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
コナガ	フェニックス顆粒水和剤	2000～4000 倍	1日	2		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
コナガ、ハスモンヨトウ	プレオフロアブル	1000 倍	7日	2		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
アオムシ、コナガ	マツチ乳剤	2000 倍	3日	3			* * / * *	* * / * *	* * / * *

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--

2025年

タアサイ

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 8 8 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
アブラムシ類、カブラハバチ、キスジノミハムシ	モスピラン顆粒水溶剤	4000 倍	7日	1	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
白さび病	アミスター20フロアブル	2000 倍	7日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
うどんこ病	ジーファイン水和剤	750～1000 倍	1日		/	/	/	/	/
白さび病	ランマンフロアブル	2000 倍	3日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

野菜類 葉菜類:茎葉(花茎がのびだす前のもの)を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

セルリー

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 8 9 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	播種日	/	定植日(1)	/	定植日(2)	/
---------	--------	---	-----	---	--------	---	--------	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病虫害	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
アブラムシ類	スタークル粒剤	2 g/株	定植時	1	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
アブラムシ類	アドマイヤーフロアブル	4000 倍	7日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
オオタバコガ ハスモンヨトウ マメハモグリバエ ヨトウムシ	アフーム乳剤	2000 倍	7日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
アブラムシ類	ウララDF	4000 倍	1日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
コナジラミ類 ハスモンヨトウ マメハモグリバエ	カスケード乳剤	4000 倍	14日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
ヨトウムシ	コテツフロアブル	2000 倍	14日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
ハダニ類	コロマイト乳剤	2000 倍	3日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
ハスモンヨトウ	ディアナSC	2500～5000 倍	1日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
ハスモンヨトウ、ハモグリバエ類	プレオフロアブル	1000 倍	1日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

セルリー

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 8 9 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ヨトウムシ	プレバソンフロアブル5	2000 倍	7日	1	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
菌核病,斑点病	アフェットフロアブル	2000 倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
斑点病	アミスター20フロアブル	2000 倍	3日	4	/	/	/	/	* * / * *
軟腐病,斑点病	カスミンボルドー	1000 倍	7日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
斑点病	トリフミン水和剤	2000 倍	1日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
軟腐病	Zボルドー	500～1000 倍	—		/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

野菜類 葉菜類 セリ科葉菜類:茎葉を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

パセリ

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 9 0 - 1

生産者(コード/氏名)		品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000				a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	播種日	/	定植日	/	/
---------	--------	---	-----	---	-----	---	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
アブラムシ類	アドマイヤー1粒剤	3 kg/10a 株元散布	14日	1	/	/	/	/	/
疫病	ユニフォーム粒剤	12 kg/10a	21日	3	/	/	/	/	/
ハスモンヨトウ	アフーム乳剤	2000 倍	7日	1	/	/	/	/	/
ハスモンヨトウ	カスケード乳剤	4000 倍	7日	1	/	/	/	/	/
ハダニ類	コロマイト乳剤	2000 倍	3日	1	/	/	/	/	/
ヨトウムシ	スピノエース顆粒水和剤	2500 倍	14日	2	/	/	/	/	/
ハスモンヨトウ	プレバソンフロアブル5	2000 倍	7日	1	/	/	/	/	/
アブラムシ類	モスピラン顆粒水溶剤	8000 倍	3日	1	/	/	/	/	/
うどんこ病	アミスター20フロアブル	2000 倍	45日	1	/	/	/	/	/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

パセリ

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 9 0 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
褐斑細菌病,黒腐病,軟腐病,斑点細菌病	コサイド3000	2000 倍	—		/	/	/	/	/
軟腐病	スターナ水和剤	2000 倍	14日	2	/	/	* / *	* / *	* / *
うどんこ病	トリフミン水和剤	8000 倍	30日	1	/	* / *	* / *	* / *	* / *
べと病,褐斑細菌病,黒斑細菌病,黒腐病,斑点細菌病	Zボルドー	500 倍	—		/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

野菜類 葉菜類 セリ科葉菜類:茎葉を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

なばな

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 9 1 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		播種日		定植日		
---------	--------	----------------------	-----	----------------------	-----	----------------------	----------------------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ケラ、コガネムシ類幼虫	ダイアジノン粒剤5	6 kg/10a	は種時	1					
アオムシ、コナガ、ハイマダラメイガ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ	アフーム乳剤	1000～2000倍	7日	2					
コナガ、ハスモンヨトウ	ディアナSC	2500～5000倍	1日	2					
アオムシ、ウリノメイガ、オオタバコガ、コナガ、シロイチモンジヨトウ、ハスモンヨトウ	デルフィン顆粒水和剤	1000倍	1日						
コナガ	フェニックス顆粒水和剤	2000～4000倍	1日	2					
アオムシ、コナガ、ハスモンヨトウ	プレバソンフロアブル5	2000倍	1日	3					
アブラムシ類、カブラハバチ、キスジノミハムシ	モスピラン顆粒水溶剤	4000倍	14日	1					
褐斑細菌病、黒腐病、軟腐病、斑点細菌病	コサイド3000	2000倍	—						
うどんこ病	ハーモメイト水溶剤	800～1000倍	1日						

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------

2025年

なばな

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 9 1 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
白さび病	ランマンフロアブル	2000 倍	3日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

野菜類 葉菜類 非結球あぶらな科葉菜類 なばな類:茎葉及び花蕾を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

月

作業開始

だいこん

生産履歴帳

0100110292-1

生産者(コード/氏名)	品種名(※栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	播種日	/	管理()	/	/
---------	--------	---	-----	---	-------	---	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
キスジノミハムシ	ダイアジノン粒剤5	6 kg/10a	21日	2	/	/	/	/	/
ネコブセンチュウ	ネマトリンエース粒剤	15～20 kg/10a	播種前	1	/	/	/	/	/
アオムシコナガ	アフーム乳剤	1000～2000 倍	7日	3	/	/	/	/	/
アブラムシ類	ウララDF	2000 倍	1日	2	/	/	/	/	/
アオムシコナガ ハイマダラノメイガ	カスケード乳剤	2000～4000 倍	14日	3	/	/	/	/	/
アオムシ、カブラハバチ、コナガ、 ハイマダラノメイガ、ハモグリハエ類、ヨトウムシ	ディアナSC	2500～5000 倍	1日	2	/	/	/	/	/
アオムシ、カブラハバチ、コナガ、 ヨトウムシ	プレオフロアブル	1000 倍	14日	2	/	/	/	/	/
アオムシ、カブラハバチ類、コナガ、 ハイマダラノメイガ、ハモグリハエ類、ヨトウムシ	プレバソンフロアブル5	2000 倍	1日	3	/	/	/	/	/
アオムシ、カブラハバチ、ハモグリハエ	マラソン乳剤	1000 倍	14日	6	/	/	/	/	/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

だいこん

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 9 2 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
アブラムシ類 カブラハバチ	モスピラン顆粒水溶剤	2000～4000倍	14日	1	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
白さび病 ワッカ症	アミスター20フロアブル	2000 倍	14日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
黒斑細菌病 軟腐病	カスミンボルドー	1000 倍	14日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
軟腐病	バリダシン液剤5	500 倍	7日	4	/	/	/	/	* * / * *
白さび病 ワッカ症	ランマンフロアブル	2000 倍	3日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

野菜類 根菜類 畑地根菜類: 茎葉及び根を収穫するもの(葉だいこん、だいこな 含む)

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

月

作業開始

非結球レタス

生産履歴帳

0100110293-1

生産者(コード/氏名)	品種名(※栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	播種日	/	定植日	/	/
---------	--------	---	-----	---	-----	---	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ケラ、コガネムシ類 幼虫、ネキリムシ類	ダイアジノン粒剤5	6 kg/10a	播種時又は定植時	2	/	/	/	/	/
オオタバコガ [*] ナモグリハエ [*] ハスモンヨトウ	アフーム乳剤	1000～2000倍	3日	3	/	/	/	/	/
アブラムシ類	ウララDF	2000倍	1日	2	/	/	/	/	/
オオタバコガ [*] ハスモンヨトウ	カスケード乳剤	4000倍	3日	3	/	/	/	/	/
オオタバコガ [*]	ディアナSC	2500～5000倍	1日	2	/	/	/	/	/
オオタバコガ [*] ナモグリハエ [*] ハスモンヨトウ ヨトウムシ	プレバソンフロアブル5	2000倍	1日	3	/	/	/	/	/
アザミウマ類	モスピラン顆粒水溶剤	4000倍	7日	1	/	/	/	/	/
すそ枯病	アフェットフロアブル	2000倍	1日	3	/	/	/	/	/
べと病 灰色かび病 菌核病	アミスター20フロアブル	2000倍	7日	4	/	/	/	/	/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

非結球レタス

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 9 3 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
褐斑細菌病,黒腐病,軟腐病,斑点細菌病	コサイド3000	2000 倍	—		/	/	/	/	/
軟腐病,腐敗病	スターナ水和剤	2000 倍	14日	2	/	/	* / *	* / *	* / *
灰色かび病,菌核病	トップジンM水和剤	1500～2000 倍	21日	2	/	/	* / *	* / *	* / *
すそ枯病,軟腐病,腐敗病	バリダシン液剤5	800 倍	3日	3	/	/	/	* / *	* / *
べと病	ランマンフロアブル	2000 倍	3日	3	/	/	/	* / *	* / *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

野菜類 葉菜類 レタス類 非結球レタス:茎葉を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

月

作業開始

にんじん

生産履歴帳

0100110294-1

生産者(コード/氏名)		品種名(※栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000				a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	播種日	/	管理()	/	/
---------	--------	---	-----	---	-------	---	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病虫害	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ネキリムシ	ダイアジノン粒剤5	6 kg/10 a	播種前	1	/	/	/	/	/
ネコブセンチュウ	ネマトリンエース粒剤	15～20 kg/10a	播種前	1	/	/	/	/	/
マメハモグリバエ	アフーム乳剤	2000 倍	1日	3	/	/	/	/	/
ヨトウムシ	カスケード乳剤	4000 倍	3日	2	/	/	/	/	/
ハスモンヨトウ	プレオフロアブル	1000 倍	1日	2	/	/	/	/	/
アブラムシ類	モスピラン顆粒水溶剤	4000 倍	1日	3	/	/	/	/	/
褐斑細菌病,黒腐病,軟腐病,斑点細菌病	コサイド3000	2000 倍	—		/	/	/	/	/
軟腐病	スターナ水和剤	1000 倍	7日	3	/	/	/	/	/
うどんこ病	トリフミン水和剤	3000 倍	1日	3	/	/	/	/	/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

にんじん

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 9 4 - 1

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

[illegible]

野菜類 根菜類 畑地根菜類:根を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

かぶ

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 9 5 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		播種日		管理()		* * / * *
---------	--------	--	-----	--	-------	--	-----------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
アブラムシ類、キスジノミハムシ	スタークル粒剤	6 kg/10a	播種時	1		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
根こぶ病	フロンサイド粉剤	30～40 kg	播種時	1		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
アブラムシ類	アクタラ顆粒水溶剤	3000 倍	1日	3				* * / * *	* * / * *
コナガ	アフーム乳剤	2000 倍	3日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
コナガ ナモグリハエ ヨトウムシ	コテツフロアブル	2000 倍	1日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
コナガ	ディアナSC	2500～5000 倍	1日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
ハスモンヨトウ	プレオフロアブル	1000 倍	3日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
コナガ	プレバソンフロアブル5	2000 倍	1日	3				* * / * *	* * / * *
白さび病	アミスター20フロアブル	2000 倍	7日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--

2025年

かぶ

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 9 5 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
褐斑細菌病,黒腐病,軟腐病,斑点細菌病	コサイド3000	2000 倍	—		/	/	/	/	/
灰色かび病 うどんこ病	ハーモメイト水溶剤	800 倍	1日		/	/	/	/	/
べと病 白さび病	ランマンフロアブル	2000 倍	3日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

野菜類 根菜類 畑地根菜類:茎葉及び根を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始 はつかだいこん 生産履歴帳 0100110296 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい) ■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	播種日	/	管理()	/	*/	*/
---------	--------	---	-----	---	-------	---	----	----

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病虫害	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
キスジノミハムシ	ダイアジノン粒剤5	6 kg/10a	21日	2	/	/	*/	*/	*/
アオムシコナガ ハイマダラメイガ	カスケード乳剤	4000 倍	7日	1	/	*/	*/	*/	*/
アオムシ	スピノエース顆粒水和剤	5000 倍	14日	2	/	/	*/	*/	*/
コナガ	パダンSG水溶剤	1500 倍	7日	1	/	*/	*/	*/	*/
アオムシ・コナガ・ヨトウムシ	プレバソンフロアブル5	2000 倍	1日	1	/	*/	*/	*/	*/
アブラムシ類	モスピラン顆粒水溶剤	2000～4000 倍	14日	1	/	*/	*/	*/	*/
褐斑細菌病、黒腐病、軟腐病、斑点細菌病	コサイド3000	2000 倍	—		/	/	/	/	/
べと病	ランマンフロアブル	2000 倍	3日	3	/	/	*/	*/	*/
					/	/	/	/	/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

はつかだいこん 生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 9 6 - 1

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

[illegible]

野菜類 根菜類 畑地根菜類: 茎葉及び根を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

ごぼう

生産履歴帳

0100110297-1

生産者(コード/氏名)	品種名(※栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		播種日		管理()		* * / * *
---------	--------	--	-----	--	-------	--	-----------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ネキリムシ類	ダイアジノン粒剤5	4 kg/10a	播種時	1		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
ネキリムシ類	フォース粒剤	4 kg/10a	播種時	1		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
ネグサレセンチュウ	ネマトリンエース粒剤	20 kg/10 a	播種時	1		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
アブラムシ類	アディオン乳剤	2000～3000倍	7日	5					
アブラムシ類 フキノメイガ	スミチオン乳剤	1000～2000倍	14日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
ネキリムシ類	ネキリエースK	3 kg/10a	14日	4					* * / * *
ゾウムシ類	ノーモルト乳剤	1000 倍	7日	4					* * / * *
黒斑病	オーソサイド水和剤80	800 倍	14日	5					
黒斑細菌病	カスミンボルドー	1000 倍	14日	3				* * / * *	* * / * *

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--

2025年

ごぼう

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 9 7 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
褐斑細菌病,黒腐病,軟腐病,斑点細菌病	コサイド3000	2000 倍	—		/	/	/	/	/
うどんこ病	トリフミン水和剤	1000 倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
うどんこ病	ハーモメイト水溶剤	800～1000 倍	1日		/	/	/	/	/
黒条病	フロンサイド水和剤	1000 倍	21日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
菌核病	ロブラール水和剤	1000 倍	3日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

野菜類 根菜類 畑地根菜類:根を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

たまねぎ

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 9 8 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		播種日		定植日		* * / * *
---------	--------	--	-----	--	-----	--	-----------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
タネバエ・ケラ コオロギ	ダイアジノン粒剤5	3～5 kg/10a	植付時	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
一年生雑草(ツクサ科、 カヤツリグサ科、キク科、 アブラナ科を除く)	トレファノサイド乳剤	200～300 ml/10a	75日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
シロイチモンジ・ヨト ウムシ	アグロスリン乳剤	2000 倍	7日	5					
ネギ・アザミウマ	ウララDF	2000 倍	7日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
アザミウマ類	ディアナSC	2500～5000 倍	1日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
ハスモンヨトウ	プレオフロアブル	1000 倍	3日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
アザミウマ類	モスピラン顆粒水溶剤	2000 倍	7日	3				* * / * *	* * / * *
灰色かび病 灰色腐敗病 小菌核病	アフエットフロアブル	2000 倍	1日	4					* * / * *
べと病	アミスター20フロアブル	2000 倍	1日	4					* * / * *

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--

2025年

たまねぎ

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 9 8 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
軟腐病	カスミンボルドー	1000 倍	7日	5					
褐斑細菌病,黒腐病, 軟腐病,斑点細菌病	コサイド3000	2000 倍	—						
白色疫病	ジマンダイセン水和剤	400～500 倍	3日	5					
灰色かび病 灰色腐敗病	スミレックス水和剤	1000 倍	1日	5					
べと病 灰色かび病	ダコニール1000	1000 倍	7日	6					
軟腐病 腐敗病	バリダシン液剤5	500 倍	3日	5					
べと病 灰色腐敗病	フロンサイドSC	1000～2000 倍	3日	5					
べと病	ランマンフロアブル	2000 倍	7日	4					* * / * *
べと病,白色 疫病	リドミルゴールドMZ	500～1000 倍	7日	3				* * / * *	* * / * *

野菜類 鱗茎類 鱗茎類(根物):鱗茎を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------

2025年

月作業開始

ばれいしょ

生産履歴帳

0100110299-1

生産者(コード/氏名)	品種名(※栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月/日

■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	定植日	/	管理()	/	/
---------	--------	---	-----	---	-------	---	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ネキリムシ類 ケラ	ダイアジノン粒剤5	4～6 kg/10 a	植付前	1	/	/	/	/	/
粉状そうか病	オラクル粉剤	20 kg/10a	植付前	1	/	/	/	/	/
アブラムシ類	ウララDF	2000～4000倍	7日	2	/	/	/	/	/
アブラムシ類	コルト顆粒水和剤	4000～8000倍	1日	3	/	/	/	/	/
アブラムシ類 テントウムシダマシ類	スミチオン乳剤	1000 倍	3日	6	/	/	/	/	/
アブラムシ類	トレボン乳剤	1000 倍	7日	3	/	/	/	/	/
ジャガイモガ若 齢幼虫	パダンSG水溶剤	1500 倍	7日	6	/	/	/	/	/
ハスモンヨトウ	フェニックス顆粒水和剤	2000～4000倍	1日	2	/	/	/	/	/
ハスモンヨトウ	プレオフロアブル	1000～2000倍	7日	2	/	/	/	/	/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

ばれいしょ

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 2 9 9 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ハスモンヨトウ	マツチ乳剤	3000 倍	7日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
アブラムシ類 テントウムシダマシ	モスピラン顆粒水溶剤	2000～6000 倍	7日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
疫病 軟腐病	カスミンボルドー	800 倍	7日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
疫病 夏疫病	ジマンダイセン水和剤	400～600 倍	7日	10	/	/	/	/	/
疫病 夏疫病	ダコニール1000	500～1000 倍	7日	5	/	/	/	/	/
菌核病	トップジンM水和剤	1000～1500 倍	7日	5	/	/	/	/	/
青枯病,軟腐病	バリダシン液剤5	500 倍	3日	6	/	/	/	/	/
夏疫病	ベルコート水和剤	500 倍	7日	5	/	/	/	/	/
疫病	ランマンフロアブル	1000～2000 倍	7日	4	/	/	/	/	* * / * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

野菜類 いも類:塊茎を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

月

作業開始

かんしょ

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 0 0 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	播種日	/	定植日	/	/
---------	--------	---	-----	---	-----	---	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病虫害	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
コガネムシ類幼虫 ケラネキムシ類	ダイアジノン粒剤5	4～6kg/10a	30日	3	/	/	/	/	/
基腐病 黒斑病 つる割れ病	ベンレート水和剤	500～1000倍	30分間 苗浸漬	1	/	/	/	/	/
シロイチモジヨトウ ハスモンヨトウ	アフーム乳剤	1000～2000倍	7日	3	/	/	/	/	/
ナガジロシタハ ハスモンヨトウ	カスケード乳剤	4000倍	7日	2	/	/	/	/	/
シロイチモジヨトウ ハスモンヨトウ	コテツフロアブル	2000倍	1日	2	/	/	/	/	/
アブラムシ類,コナジラミ類	コルト顆粒水和剤	4000倍	1日	3	/	/	/	/	/
アブラムシ類	スミチオン乳剤	1000倍	7日	5	/	/	/	/	/
ハスモンヨトウ	ディアナSC	2500～5000倍	1日	2	/	/	/	/	/
アオムシ,クリノメイガ,オオタバコガ,コナガ,シロイチモジヨトウ,ハスモンヨトウ	デルフィン顆粒水和剤	1000倍	1日		/	/	/	/	/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

かんしょ

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 0 0 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ハスモンヨトウムシ	トレボン乳剤	1000 倍	7日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
ハスモンヨトウ	プレオフロアブル	1000～2000 倍	7日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
ハスモンヨトウ	プレバソンフロアブル5	2000～4000 倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
アブラムシ類	モスピラン顆粒水溶剤	4000 倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
基腐病	アミスター20フロアブル	2000 倍	14日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
基腐病,斑点病	Zボルドー	500 倍	—		/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

野菜類 いも類:塊根を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

さといも

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 0 1 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	定植日	/	管理()	/	/
---------	--------	---	-----	---	-------	---	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病虫害	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
アブラムシ類	アドマイヤー1粒剤	4 kg/10a	植付時	1	/	/	/	/	/
アブラムシ類、スズメバチ類	アディオソ乳剤	2000～3000倍	7日	5	/	/	/	/	/
アブラムシ類	ウララDF (ずいき使用不可)	2000 倍	7日	2	/	/	/	/	/
アブラムシ類、うどんこ病、ハダニ類	エコピタ液剤	100 倍	1日		/	/	/	/	/
カンザワハダニ、ハスモンヨトウ	コテツフロアブル	2000 倍	7日	2	/	/	/	/	/
ハダニ類	コロマイト乳剤	1000 倍	1日	2	/	/	/	/	/
アオムシ、コナガ、ヨトウムシ	ゼンターリ顆粒水和剤	1000～2000倍	1日		/	/	/	/	/
ハスモンヨトウ、セスジスズメ	ディアナSC (ずいき使用不可)	2500～5000倍	1日	2	/	/	/	/	/
ハスモンヨトウ、スズメバチ類	プレオフロアブル (ずいき使用不可)	1000～2000倍	7日	2	/	/	/	/	/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

さといも

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 0 1 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ハスモンヨトウ	プレバソンフロアブル5 (ずいき使用不可)	2000 倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
ハダニ類	マイトコーネフロアブル (ずいき使用不可)	1000 倍	3日	1	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
アブラムシ類、ハダニ類	モベントフロアブル (ずいき使用不可)	2000 倍	7日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
疫病	アミスター20フロアブル (ずいき使用不可)	2000 倍	14日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
うどんこ病 疫病	ジーファイン水和剤	750～1000 倍	1日		/	/	/	/	/
べと病、褐斑細菌病、 黒斑細菌病、黒腐病、 斑点細菌病	Zボルドー	500 倍	—		/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

野菜類 いも類:塊茎を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

れんこん

生産履歴帳

0100110302 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		播種日		定植日		* * / * *
---------	--------	--	-----	--	-----	--	-----------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
クワイヒレアブラムシ	アドマイヤー1粒剤	4 kg/10a	14日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
クワイヒレアブラムシ	ダントツ粒剤	土壌混和 3 kg/10a	植付時	1		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
コナジラミ類	エコピタ液剤	100～200 倍	1日						
アオムシ,コナガ	バシレックス水和剤	1000～2000 倍	1日						
ハスモンヨトウ	ロムダンフロアブル	2000 倍	3日	3			* * / * *	* * / * *	
褐斑細菌病,黒腐病,軟腐病,斑点細菌病	コサイド3000	2000 倍	—						
褐斑病	トップジンM水和剤	1500 倍	1日	3			* * / * *	* * / * *	
べと病,褐斑細菌病,黒斑細菌病,黒腐病,斑点細菌病	Zボルドー	500 倍	—						

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--

れんこん

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 0 2 - 1

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

[illegible]

野菜類 根菜類 水系根菜類:根茎を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

月作業開始

アスパラガス

生産履歴帳

0100110303-1

生産者(コード/氏名)	品種名(※栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	播種日	/	定植日	/	/
---------	--------	---	-----	---	-----	---	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
アブラムシ類 ヨトウムシ	アディオン乳剤	2000～3000倍	1日	3	/	/	/	/	/
ハスモンヨトウ オオタバコガ ヨトウムシ	アフーム乳剤	2000倍	1日	2	/	/	/	/	/
アブラムシ類	ウララDF	2000倍	1日	3	/	/	/	/	/
ハスモンヨトウ オオタバコガ	カスケード乳剤	4000倍	1日	2	/	/	/	/	/
オオタバコガ	コテツフロアブル	2000倍	1日	2	/	/	/	/	/
カスミカメシ類、コナジラミ類、ネギアザミウマ	コルト顆粒水和剤	4000倍	1日	3	/	/	/	/	/
ハダニ類	コロマイト乳剤	1000倍	1日	2	/	/	/	/	/
アザミウマ類	ディアナSC	2500～5000倍	1日	2	/	/	/	/	/
オオタバコガ	プレオフロアブル	1000倍	1日	2	/	/	/	/	/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

アスパラガス

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 0 3 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ハスモンヨトウ	プレバソンフロアブル5	2000 倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
アザミウマ類	モスピラン顆粒水溶剤	4000 倍	1日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
褐斑病	アフェットフロアブル	2000 倍	1日	4	/	/	/	/	* * / * *
褐斑病 茎枯病 斑点病	アミスター20フロアブル	2000 倍	1日	4	/	/	/	/	* * / * *
軟腐病	スターナ水和剤	2000 倍	1日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
褐斑病 茎枯病 斑点病	ダコニール1000	1000 倍	1日	4	/	/	/	/	* * / * *
茎枯病	トップジンM水和剤	1000 倍	7日	5	/	/	/	/	/
立枯病	トリフミン水和剤	1000 倍 3% 灌注/1㎡	7日	1	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
褐斑病 茎枯病 斑点病	ベルコート水和剤	1000 倍	7日	5	/	/	/	/	/
茎枯病,株腐病	ベンレート水和剤	2000 倍	1日	4	/	/	/	/	* * / * *
茎枯病,斑点病	ロブラール水和剤	2000 倍	1日	5	/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

野菜類 茎野菜類:新芽を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

にんにく

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 0 4 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		播種日		定植日		* * / * *
---------	--------	--	-----	--	-----	--	-----------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
イモグサレセンチュウ	ネマトリンエース粒剤 (葉にんにく不可)	25 kg/10a	植付前	1		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
イモグサレセンチュウ	ベンレートT水和剤20	種球重量の1 %	植付前	1		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
アブラムシ類	アディオン乳剤 (葉にんにく不可)	2000～3000倍	1日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
アオムシ、ウリノメイガ、オオタバコガ、コナガ、シロイチモンジ、ヨトウ、ハスモンヨトウ	デルフィン顆粒水和剤	1000 倍	1日						
春腐病	カスミンボルドー (葉にんにく不可)	1000 倍	7日	5					
褐斑細菌病、黒腐病、軟腐病、斑点細菌病	コサイド3000	2000 倍	—						
葉枯病	ジマンダイセン水和剤 (葉にんにく不可)	400～500 倍	7日	5					
さび病	ストロビーフロアブル	2000 倍	7日	3				* * / * *	* * / * *
白斑葉枯病	セイビアーフロアブル20 (葉にんにく不可)	2000 倍	7日	3				* * / * *	* * / * *

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--

2025年

にんにく

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 0 4 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
葉枯病,黄斑病	ダコニール1000 (葉にんにく不可)	1000 倍	7日	6	/	/	/	/	/
葉枯病	ベルクト水和剤 (葉にんにく不可)	1000～1500 倍	3日	3	/	/	/	* / *	* / *
さび病	ラリー乳剤 (葉にんにく不可)	4000 倍	3日	3	/	/	/	* / *	* / *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

野菜類 鱗茎類 鱗茎類(根物):鱗茎を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

らっきょう

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 0 5 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		播種日		定植日		
---------	--------	----------------------	-----	----------------------	-----	----------------------	----------------------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病虫害	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ネダニ	ネマトリンエース粒剤	15 kg/10 a	植付時	1					
乾腐病	ベンレート水和剤	500 倍	植付直前	1					
アザミウマ類	スピノエース顆粒水和剤	2500 倍	3日	3					
アザミウマ類	モスピラン顆粒水溶剤	2000 倍	14日	3					
さび病	アミスター20フロアブル	2000 倍	3日	3					
褐斑細菌病,黒腐病,軟腐病,斑点細菌病	コサイド3000	2000 倍	—						
軟腐病	スターナ水和剤	1000 倍	7日	3					
灰色かび病	セイビアーフロアブル20	1000～1500 倍	1日	3					
乾腐病	トップジンM水和剤	1000 倍	7日	3					

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------

2025年

らっきょう

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 0 5 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
白色疫病	プロポーズ顆粒水和剤	1000 倍	14日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
白色疫病	フロンサイド水和剤	1000 倍	14日	5	/	/	/	/	/
さび病	ラリー水和剤	2000 倍	7日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
白色疫病	ランマンフロアブル	2000 倍	3日	4	/	/	/	/	* * / * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

野菜類 鱗茎類 鱗茎類(根物):鱗茎を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

くわい

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 0 6 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい) ■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	/	/	/	/	/
---------	--------	---	---	---	---	---	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病虫害	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ハダニ類	アカリタッチ乳剤	1000～3000倍	1日		/	/	/	/	/
アブラムシ類,うどんこ病,ハダニ類	エコピタ液剤	100倍	1日		/	/	/	/	/
アオムシ,コナガ,ヨトウムシ	ゼンターリ顆粒水和剤	1000～2000倍	1日		/	/	/	/	/
アオムシ,ウリノメイガ,オオタバコガ,コナガ,シロイチモンジヨトウ,ハスモンヨトウ	デルフィン顆粒水和剤	1000倍	1日		/	/	/	/	/
アオムシ,コナガ	バシレックス水和剤	1000～2000倍	1日		/	/	/	/	/
うどんこ病	カリグリーン	800～1000倍	1日		/	/	/	/	/
褐斑細菌病,黒腐病,軟腐病,斑点細菌病	コサイド3000	2000倍	—		/	/	/	/	/
うどんこ病	ジーファイン水和剤	750～1000倍	1日		/	/	/	/	/
うどんこ病	ハーモメイト水溶剤	800～1000倍	1日		/	/	/	/	/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025 年

くわい

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 0 6 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

野菜類 根菜類 水系根菜類:塊茎を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

こんにやく

生産履歴帳

0100110307-1

生産者(コード/氏名)	品種名(※栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		播種日		定植日		* * / * *
---------	--------	--	-----	--	-----	--	-----------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病虫害	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
アブラムシ類	アドマイヤー1粒剤	6kg/10a	21日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
根腐病	ユニフォーム粒剤	9 kg/10a	植付時	1		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
アブラムシ類	コルト顆粒水和剤	4000 倍	1日	3			* * / * *	* * / * *	* * / * *
葉枯病	ジーファイン水和剤	500 倍	1日						
腐敗病	スターナ水和剤	1000 倍	14日	5					
アブラムシ類	スミチオン乳剤	1000 倍	14日	3			* * / * *	* * / * *	* * / * *
乾腐病	ベンレート水和剤	50～100 倍	植付前 種いもの芽基部に散布	1		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
根腐病	ランマンフロアブル	土壌灌注 500～1000 倍	14日	3			* * / * *	* * / * *	* * / * *

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--

こんにゃく

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 0 7 - 1

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

[illegible]

野菜類 いも類:塊茎を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日			/			農薬散布後 収穫予定日			/			農薬散布後 収穫予定日			/			農薬散布後 収穫予定日			/			農薬散布後 収穫予定日			/		
----------------	--	--	---	--	--	----------------	--	--	---	--	--	----------------	--	--	---	--	--	----------------	--	--	---	--	--	----------------	--	--	---	--	--

2025年 月 作業開始

トマト

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 0 8 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		播種日		定植日		* * / * *
---------	--------	--	-----	--	-----	--	-----------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
アブラムシ類 コナジラミ類	アドマイヤー1粒剤	1～2 g/株	定植時	1		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
オオタバコガ トマトサビダニ マメハモグリバエ	アフーム乳剤	2000 倍	1日	5					
アブラムシ類 コナジラミ ミカンキロアザミウマ	ウララDF	2000～4000 倍	1日	3				* * / * *	* * / * *
トマトハモグリバエ オオタバコガ ミカンキロアザミウマ	カスケード乳剤	2000～4000 倍	1日	4					* * / * *
オオタバコガ トマトサビダニ ナミハダニ アザミウマ	コテツフロアブル	2000 倍	1日	3				* * / * *	* * / * *
アブラムシ類,コナ ジラミ類	コルト顆粒水和剤	4000 倍	1日	3				* * / * *	* * / * *
コナジラミ類 トマトサビダニ ハモグリバエ類	コロマイト乳剤	1500 倍	1日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
アザミウマ類,コナジラミ類, オオタバコガ,ハスモンヨトウ, ハモグリバエ類	ディアナSC	2500～5000 倍	1日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
アブラムシ類,コナ ジラミ類	チェス顆粒水和剤	5000 倍	1日	3				* * / * *	* * / * *

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--

2025年

トマト

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 0 8 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ハモグリバエ類	プレバソンフロアブル5	1000～2000倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
うどんこ病・灰色かび病	アフェットフロアブル	2000～4000倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
疫病	コサイド3000	1000 倍	—		/	/	/	/	/
灰色かび病	ゲッター水和剤	1000～1500倍	1日	5	/	/	/	/	/
うどんこ病	サンヨール	500～700 倍	1日	4	/	/	/	/	* * / * *
疫病 輪紋病 葉かび病	ダコニール1000	1000 倍	1日	4	/	/	/	/	* * / * *
すすかび病,灰色かび病,菌核病,斑点病,葉かび病	ファンタジスタ顆粒水和剤	2000～3000倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
灰色かび病	フルピカフロアブル	2000～3000倍	1日	4	/	/	/	/	* * / * *
疫病	ランマンフロアブル	1000～2000倍	1日	4	/	/	/	/	* * / * *
斑点病,輪紋病	ロブラール水和剤	1000 倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

野菜類 なす科果菜類:果実を収穫するもの。直径3cm以下のものは含まれない

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

きゅうり

生産履歴帳

0100110309 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		播種日		定植日		* * / * *
---------	--------	--	-----	--	-----	--	-----------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ケラ	ダイアジノン粒剤5	4～6 kg/10a	定植時	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
ネコブセンチュウ	ネマトリンエース粒剤	15～20kg/10a	定植前	1		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
ウリノメイガ トマトハモグリハエ ミナミキイロアザミウマヨトウ	アフーム乳剤	2000 倍	1日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
アブラムシ類	ウララDF	2000～4000 倍	1日	3				* * / * *	* * / * *
ミナミキイロアザミウマ マトマトハモグリハエ	カスケード乳剤	2000 倍	1日	4					* * / * *
ウリノメイガ ミナミキイロアザミウマ ミナミキイロアザミウマ	コテツフロアブル	2000 倍	1日	3				* * / * *	* * / * *
ハダニ類	コロマイト乳剤	1000～1500 倍	1日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
アブラムシ類 コナジラミ類	チェス顆粒水和剤	5000 倍	1日	3				* * / * *	* * / * *
アザミウマ類	ディアナSC	2500～5000 倍	1日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--

2025年

きゅうり

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 0 9 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ハモグリバエ類	プレバソンフロアブル5	1000～2000倍	1日	3	/	/	/	* */ * *	* */ * *
アザミウマ類	モスピラン顆粒水溶剤	2000～4000倍	1日	3	/	/	/	* */ * *	* */ * *
うどんこ病 灰色かび病 菌核病	アフエットフロアブル	2000 倍	1日	3	/	/	/	* */ * *	* */ * *
うどんこ病、べと病	アミスター20フロアブル	1500～2000倍	1日	4	/	/	/	/	* */ * *
うどんこ病 べと病 斑点細菌病	カスミンボルドー	1000 倍	1日	5	/	/	/	/	/
うどんこ病、べと病、灰色かび病、褐斑病、黒星病、炭疽病	ダコニール1000	1000 倍	1日	12	/	/	/	/	/
うどんこ病 黒星病	トリフミン水和剤	3000～5000倍	1日	5	/	/	/	/	/
うどんこ病 灰色かび病 褐斑病	フルピカフロアブル	2000～3000倍	1日	4	/	/	/	/	* */ * *
べと病	ランマンフロアブル	1000～2000倍	1日	4	/	/	/	/	* */ * *
べと病	リドミルゴールドMZ	1000 倍	1日	3	/	/	/	* */ * *	* */ * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

野菜類 うり類 うり類(未成熟):果実を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

ミニトマト

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 1 0 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		播種日		定植日		
---------	--------	----------------------	-----	----------------------	-----	----------------------	----------------------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
アブラムシ類	アドマイヤー1粒剤	1～2 g/株	定植時	1					
サビダニ オオタバコガ マメハモグリバエ	アフーム乳剤	2000 倍	1日	5					
アブラムシ類	ウララDF	2000～4000 倍	1日	3					
オオタバコガ マメハモグリバエ ミカンキロアザミウマ	カスケード乳剤	2000～4000 倍	1日	2					
アザミウマ ナミハダニ トモサビダニ オオタバコガ	コテツフロアブル	2000 倍	1日	3					
アブラムシ類,コナジラミ類	コルト顆粒水和剤	4000 倍	1日	3					
コナジラミ類	コロマイト乳剤	1500 倍	1日	2					
アザミウマ類	ディアナSC	2500～5000 倍	1日	2					
オオタバコガ コナジラミ ハモグリバエ類	プレバソンフロアブル5	2000 倍	1日	3					

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------

2025年

ミニトマト

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 1 0 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
アザミウマ類	モスピラン顆粒水溶剤	2000 倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
うどんこ病	アフェットフロアブル	2000～4000 倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
灰色かび病, 菌核病, 葉かび病	ゲッター水和剤	1500 倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
褐斑細菌病, 黒腐病, 軟腐病, 斑点細菌病	コサイド3000	2000 倍	—		/	/	/	/	/
うどんこ病	サンヨール	500～700 倍	1日	4	/	/	/	/	* * / * *
うどんこ病	ダコニール1000	1000 倍	1日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
すすかび病, 灰色かび病, 菌核病, 斑点病, 葉かび病	ファンタジスタ顆粒水和剤	2000～3000 倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
灰色かび病	フルピカフロアブル	2000～3000 倍	1日	4	/	/	/	/	* * / * *
疫病	ランマンフロアブル	1000～2000 倍	1日	4	/	/	/	/	* * / * *
斑点病 輪紋病	ロブラール水和剤	1000 倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

野菜類 なす科果菜類: 果実を収穫するもの。直径3cm以下のもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

月

作業開始

ズッキーニ

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 1 1 - 1

生産者(コード/氏名)		品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000				a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	播種日	/	定植日	/	/
---------	--------	---	-----	---	-----	---	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
アブラムシ類,コナジラミ類	スタークル粒剤	2 g/株	定植時	1	/	/	/	/	/
ネコブセンチュウ	ネマトリンエース粒剤	20 kg/10a	定植前	1	/	/	/	/	/
アブラムシ類 フキノメイガ	アディオン乳剤	2000～3000倍	7日	3	/	/	/	/	/
オオタバコガ	アフアーム乳剤	2000 倍	3日	2	/	/	/	/	/
トマトハモグリバエ	カスケード乳剤	2000 倍	1日	4	/	/	/	/	/
アザミウマ類	スピノエース顆粒水和剤	5000～10000倍	1日	3	/	/	/	/	/
アブラムシ類	チェス顆粒水和剤	5000 倍	1日	2	/	/	/	/	/
ハモグリバエ類	プレバソンフロアブル5	1000 倍	1日	3	/	/	/	/	/
うどんこ病	アフエットフロアブル	2000 倍	1日	3	/	/	/	/	/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

ズッキーニ

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 1 1 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
うどんこ病	アミスター20フロアブル	2000 倍	1日	4	/	/	/	/	* * / * *
褐斑細菌病,黒腐病, 軟腐病,斑点細菌病	コサイド3000	2000 倍	—		/	/	/	/	/
うどんこ病	ダコニール1000	1000 倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
べと病	ランマンフロアブル	1000 倍	1日	4	/	/	/	/	* * / * *
灰色かび病	ロブラール水和剤	1000～1500 倍	1日	4	/	/	/	/	* * / * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

野菜類 うり類 うり類(未成熟):果実を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

にがうり

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 1 2 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		播種日		定植日		* * / * *
---------	--------	--	-----	--	-----	--	-----------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ネキリムシ コガネムシ タネハエ	ダイアジノン粒剤5	6 kg/10a	定植時	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
ネコブセンチュウ	ネマトリンエース粒剤	15～20 kg/10a	定植前	1		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
アブラムシ フキノメイガ ヨトウムシ類	アディオン乳剤	2000～3000 倍	1日	3				* * / * *	* * / * *
オオタバコガ	アフアーム乳剤	2000 倍	3日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
アザミウマ マメハモグリバエ ウリノメイガ	カスケード乳剤	2000～4000 倍	1日	4					* * / * *
ミナミキイロアザミ ウマ	コテツフロアブル	2000 倍	1日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
ハダニ類	ダニトロンフロアブル	2000 倍	3日	1		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
ウリノメイガ、ハスモン ヨトウ	フェニックス顆粒水和剤	2000～4000 倍	1日	3				* * / * *	* * / * *
アブラムシ類	モスピラン顆粒水溶剤	4000 倍	1日	3				* * / * *	* * / * *

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--

2025年

にがうり

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 1 2 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
うどんこ病	アミスター20フロアブル	2000 倍	7日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
褐斑細菌病,黒腐病, 軟腐病,斑点細菌病	コサイド3000	2000 倍	—		/	/	/	/	/
うどんこ病	ダコニール1000	1000 倍	1日	4	/	/	/	/	* * / * *
炭疽病 斑点病	トップジンM水和剤	1500～2000 倍	1日	5	/	/	/	/	/
うどんこ病	トリフミン水和剤	3000 倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

野菜類 うり類 うり類(未成熟):果実を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

オクラ

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 1 3 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		播種日		定植日		* * / * *
---------	--------	--	-----	--	-----	--	-----------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病虫害	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ネキリムシ類	ダイアジノン粒剤5	6 kg/10a	30日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
疫病	ユニフォーム粒剤	9 kg	1日	3				* * / * *	* * / * *
オオタバコガ	アフーム乳剤	2000 倍	1日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
オオタバコガ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ	アタブロン乳剤	2000 倍	1日	4					* * / * *
オオタバコガ、ハスモンヨトウ	コテツフロアブル	2000 倍	1日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
アブラムシ類	コルト顆粒水和剤	4000 倍	1日	3				* * / * *	* * / * *
アブラムシ類	チェス顆粒水和剤	6000 倍	1日	3				* * / * *	* * / * *
アブラムシ類 カメムシ類	トレボン乳剤	1000 倍	1日	3				* * / * *	* * / * *
オオタバコガ	プレオフロアブル	1000 倍	1日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--

2025年

オクラ

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 1 3 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
オオタバコガ	プレバソンフロアブル5	2000 倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
アブラムシ類	モスピラン顆粒水溶剤	4000 倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
うどんこ病	アフェットフロアブル	2000 倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
うどんこ病	アミスター20フロアブル	2000 倍	1日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
葉枯細菌病	カスミンボルドー	1000 倍	7日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
褐斑細菌病,黒腐病, 軟腐病,斑点細菌病	コサイド3000	2000 倍	—		/	/	/	/	/
葉すす病	ダコニール1000	1000 倍	1日	5	/	/	/	/	/
葉すす病	トップジンM水和剤	1500 倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
黒斑病 うどんこ病	トリフミン水和剤	5000 倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
灰色かび病 黒斑病	ロブラール水和剤	2000 倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

オクラ「野菜類:果実を収穫するもの」 花okra「野菜類:花を収穫するもの」

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

月

作業開始

甘長とうがらし

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 1 4 - 1

生産者(コード/氏名)		品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000				a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	播種日	/	定植日	/	* * / * *
---------	--------	---	-----	---	-----	---	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
コガネムシ類幼虫	ダイアジノン粒剤5	4～6 kg/10a	14日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
オオタバコガ	アフーム乳剤	2000 倍	7日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
オオタバコガ ハダニ類 ミナキイロアザミウマ	コテツフロアブル	2000 倍	1日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
アブラムシ類	コルト顆粒水和剤	4000 倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
コナジラミ類	スタークル顆粒水溶剤	2000～3000 倍	1日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
タバコガ類 ミナキイロアザミウマ	プレオフロアブル	1000 倍	1日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
オオタバコガ	プレバソンフロアブル5	1000～2000 倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
オオタバコガ	マツチ乳剤	2000 倍	1日	4	/	/	/	/	* * / * *
アザミウマ類、アブラムシ類 コナジラミ類、チャノホコリダニ、ハダニ類	モベントフロアブル	2000 倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

甘長とうがらし 生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 1 4 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
うどんこ病,斑点細菌病,斑点病	カスミンボルドー	1000 倍	1日	5	/	/	/	/	/
褐斑細菌病,黒腐病,軟腐病,斑点細菌病	コサイド3000	2000 倍	—		/	/	/	/	/
うどんこ病	ストロビーフロアブル	4000 倍	1日	2	/	/	* / *	* / *	* / *
うどんこ病	トリフミン水和剤	4000～5000 倍	1日	5	/	/	/	/	/
疫病	ランマンフロアブル	2000 倍	1日	4	/	/	/	/	* / *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

野菜類 なす科果菜類 ピーマン及びとうがらし類:果実を収穫するもの。未成熟の状態で利用する甘味種(伏見とうがらし、万願寺とうがらし、三宝とうがらし、ひもとうがらし)

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

月

作業開始

かぼちゃ

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 1 5 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	播種日	/	定植日	/	* / *
---------	--------	---	-----	---	-----	---	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
コガネムシ類幼虫	ダイアジノン粒剤5	4～6 kg/10a	21日	4	/	/	/	/	* / *
アザミウマ類	アファーム乳剤	2000 倍	1日	2	/	/	* / *	* / *	* / *
トマトハモグリバエ	カスケード乳剤	2000 倍	1日	3	/	/	/	* / *	* / *
ウリハムシ、アブラムシ類	ダントツ水溶剤	2000～4000 倍	3日	3	/	/	/	* / *	* / *
ハスモンヨトウ	ディアナSC	2500～5000 倍	1日	2	/	/	* / *	* / *	* / *
コナジラミ類	トレボン乳剤	1000 倍	1日	3	/	/	/	* / *	* / *
ハスモンヨトウ	フェニックス顆粒水和剤	2000～4000 倍	1日	2	/	/	* / *	* / *	* / *
アブラムシ・ウリハムシ	モスピラン顆粒水溶剤	2000～4000 倍	1日	2	/	/	* / *	* / *	* / *
うどんこ病	アフェットフロアブル	2000 倍	1日	3	/	/	/	* / *	* / *

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

かぼちゃ

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 1 5 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
褐斑細菌病,黒腐病,軟腐病,斑点細菌病	コサイド3000	2000 倍	—		/	/	/	/	/
つる枯病 疫病	ジマンダイセン水和剤	600 倍	21日	2	/	/	* / *	* / *	* / *
うどんこ病	スコア顆粒水和剤	2000 倍	3日	3	/	/	/	* / *	* / *
うどんこ病	ストロビーフロアブル	3000 倍	1日	3	/	/	/	* / *	* / *
べと病 うどんこ病 白斑病	ダコニール1000	1000 倍	7日	3	/	/	/	* / *	* / *
白斑病	トップジンM水和剤	1000 倍	1日	5	/	/	/	/	/
うどんこ病	トリフミン水和剤	3000～5000 倍	1日	5	/	/	/	/	/
うどんこ病	フルピカフロアブル	2000～3000 倍	1日	4	/	/	/	/	* / *
うどんこ病	ベルクート水和剤	1000～2000 倍	7日	4	/	/	/	/	* / *
べと病	ランマンフロアブル	2000 倍	1日	3	/	/	/	* / *	* / *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

野菜類 うり類 うり類(成熟):果実を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

月

作業開始

いんげんまめ

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 1 6 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	播種日	/	定植日	/	/
---------	--------	---	-----	---	-----	---	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
カラス、キジバト、タネバエ、ハト、炭疽病、苗立枯病	キヒゲンR-2フロアブル	20 ml/kg		1	/	/	/	/	/
コガネムシ類幼虫	ダイアジノン粒剤5	4～6 kg/10a	60日	2	/	/	/	/	/
コナジラミ類	エコピタ液剤	100～200 倍	1日		/	/	/	/	/
アオムシ、ウリノメイガ、オオタバコガ、コナガ、シロイチモンジトウ、ハスモンヨトウ	デルフィン顆粒水和剤	1000 倍	1日		/	/	/	/	/
アブラムシ類、カメムシ類、アス、キノメイガ	トレボン乳剤	1000 倍	14日	2	/	/	/	/	/
アザミウマ類、アブラムシ類、カメムシ類、コナジラミ類	モスピラン顆粒水溶剤	2000～4000 倍	14日	3	/	/	/	/	/
さび病、灰色かび病、角斑病、菌核病	アフエットフロアブル	2000 倍	1日	3	/	/	/	/	/
うどんこ病	ジーファイン水和剤	750～1000 倍	1日		/	/	/	/	/
うどんこ病、褐斑病、炭そ病	ベルコート水和剤	1000 倍	7日	3	/	/	/	/	/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

いんげんまめ 生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 1 6 - 1

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

[illegible]

いんげんまめ「野菜類 豆類(種実):成熟した種子を収穫するもの」 さやいんげん「豆類(未成熟):未成熟なさや付き豆を収穫するもの」

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

えだまめ

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 1 7 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		播種日		定植日		* * / * *
---------	--------	--	-----	--	-----	--	-----------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
コガネムシ類幼虫,タネハエ	ダイアジノン粒剤5	4～6 kg/10a	30日	5					
ハスモンヨトウ	アフーム乳剤	1000～2000倍	3日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
アブラムシ類	ウララDF	2000～4000倍	7日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
ウコンメイガ	カスケード乳剤	4000倍	1日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
コフキゾウムシ,ハタニ類	コテツフロアブル	2000倍	1日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
ハタニ類	コロマイト乳剤	1500倍	1日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
アザミウマ類,ハスモンヨトウ,ハモグリバエ類	ディアナSC	2500～5000倍	1日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
カメムシ類	トレボン乳剤	1000倍	14日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
ウコンメイガ	プレバソンフロアブル5	4000倍	3日	3				* * / * *	* * / * *

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--

2025年

えだまめ

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 1 7 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
アザミウマ類・アブラムシ	モスピラン顆粒水溶剤	4000 倍	7日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
うどんこ病,さび病,灰色かび病,菌核病	アフエットフロアブル	2000 倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
べと病	アミスター20フロアブル	2000 倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
褐斑細菌病,黒腐病,軟腐病,斑点細菌病	コサイド3000	2000 倍	—		/	/	/	/	/
灰色かび病,菌核病	ファンタジスタ顆粒水和剤	2000 倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
べと病	ランマンフロアブル	1000～2000 倍	3日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

野菜類 豆類(未成熟)えだまめ:未成熟なさや付き豆を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

月

作業開始

うり類(漬物用)

生産履歴帳

0100110318-1

生産者(コード/氏名)	品種名(※栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	播種日	/	定植日	/	/
---------	--------	---	-----	---	-----	---	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病虫害	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
アザミウマ類	スタークル粒剤	2 g/株	定植時	1	/	/	/	/	/
アザミウマ類 オオタバコガ ハスモンヨトウ ハマグリバエ類	アフーム乳剤	2000 倍	1日	2	/	/	/	/	/
ミナミキイロアザミウマ	カスケード乳剤	2000 倍	3日	1	/	/	/	/	/
ハダニ類	カネマイトフロアブル	1000～1500 倍	1日	1	/	/	/	/	/
ハダニ類 ミナミキイロアザミウマ	コテツフロアブル	2000 倍	1日	2	/	/	/	/	/
アブラムシ類	チェス顆粒水和剤	5000 倍	1日	2	/	/	/	/	/
ウリハムシ	マラソン乳剤	1000 倍	1日	3	/	/	/	/	/
アザミウマ類	モスピラン顆粒水溶剤	2000～4000 倍	1日	3	/	/	/	/	/
うどんこ病、つる枯病、炭そ病、べと病	アミスター20フロアブル	1500～2000 倍	7日	4	/	/	/	/	/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

うり類(漬物用) 生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 1 8 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
うどんこ病	ダコニール1000	1000 倍	1日	4	/	/	/	/	* * / * *
うどんこ病 つる枯病 炭そ病 灰色かび病	トップジンM水和剤	1500～2000 倍	1日	5	/	/	/	/	/
うどんこ病 つる枯病 炭そ病	トリフミン水和剤	3000～5000 倍	1日	5	/	/	/	/	/
うどんこ病 つる枯病 炭そ病	ベルコート水和剤	2000～4000 倍	3日	5	/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

廃止

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 日 作業開始 未成熟とうもろこし 生産履歴帳 0100110319 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい) ■収穫開始予定月 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		播種日		定植日		
---------	--------	----------------------	-----	----------------------	-----	----------------------	----------------------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病虫害	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
アワノメイガ	ダイアジノン粒剤5	4～6 kg/10a	14日	2					
オオタバコガ ヨトウムシ	アフーム乳剤	1000～2000倍	3日	2					
オオタバコガ アワノメイガ	カスケード乳剤	4000倍	7日	2					
オオタバコガ	コテツフロアブル	2000倍	1日	2					
アブラムシ類	コルト顆粒水和剤	4000倍	1日	3					
アワノメイガ	トレボン乳剤	1000倍	7日	4					
アワノメイガ、オオタバコガ、ツマジロクサヨトウ	フェニックス顆粒水和剤	2000～4000倍	1日	2					
オオタバコガ	プレオフロアブル	1000倍	1日	2					
アブラムシ類	モスピラン顆粒水溶剤	2000～4000倍	1日	3					

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------

2025年

未成熟とうもろこし 生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 1 9 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
褐色腐敗病	スターナ水和剤	1000 倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
すす紋病	トリフミン水和剤	2000～4000 倍	7日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

雑穀類 未成熟とうもろこし:種子(ある程度成熟した雌穂)を収穫するもの(スイートコーン) 野菜類 ヤングコーン:トウモロコシの幼果(雌穂)を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

畑わさび

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 2 0 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		播種日		定植日		* * / * *
---------	--------	--	-----	--	-----	--	-----------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ナトビハムシ	トレボン粒剤	3 kg/10a	14日	1		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
アルタリア菌による病害	ロブラール水和剤	0.5 %/種子重量	は種前	1		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
アブラムシ類	アドマイヤーフロアブル	4000 倍	7日	3				* * / * *	* * / * *
アブラムシ類	ウララDF	4000 倍	1日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
アオムシ、ウリノメイガ、オオタバコガ、コナガ、シロイチモンジヨトウ、ハスモンヨトウ	デルフィン顆粒水和剤	1000 倍	1日						
白さび病	アミスター20フロアブル	2000 倍	7日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
褐斑細菌病、黒腐病、軟腐病、斑点細菌病	コサイド3000	2000 倍	—						
白さび病	ランマンフロアブル	2000 倍	7日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--

0 1 0 0 1 1 0 3 2 0 - 1

2025年 月 作業開始

稲

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 2 1 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		播種日		田植え		中干し	
---------	--------	--	-----	--	-----	--	-----	--

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
いもち病	テクリードCフロアブル	200倍/24時間浸漬	浸種前	1					
イネシガレセンチュウ	スミチオン乳剤	1000倍	浸種前	1					
苗立枯病(ビシウム菌) 苗立枯病(フザリウム菌)	タチガレン液剤	500～1000倍		2					
いもち病 紋枯病 もみ枯細菌病 ヨコバイ	フルターボ箱粒剤	50 g/箱	移植当日まで	1					
イネトロオイムシ、イネミスズウムシ、いもち病、ツマグロヨコバイ	Dr. オリゼパディート粒剤	50 g/箱	移植3日前～移植当日まで	1					
イネトロオイムシ、イネミスズウムシ、いもち病	ツインターボ箱粒剤08	1 kg/10a	は種時～移植当日まで	1					
スクミリンゴガイ	スクミノン	1～4 kg/10a移植後施用	60日	2					
いもち病 穂枯れ(ごま葉枯病菌)	ダブルカットフロアブル	1000倍	穂揃期	2					
疑似紋枯症(褐色菌核病菌)、疑似紋枯症(褐色紋枯病菌)	モンカットフロアブル	1000倍	14日	4					

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--

2025年

稲

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 2 1 - 1

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ウンカ類 コブノメイガ イナゴ類	トレボン乳剤	1000～2000倍	14日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
いもち病 内穎褐変病 ごま葉枯病	ブラシンフロアブル	1000 倍	7日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
イナゴ類、ウンカ類、カメムシ類、ツマゲロヨコバイ	エクシードフロアブル	2000 倍	7日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
カメムシ類	スタークル顆粒水溶剤	2000 倍	7日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
イネツトムシコブノメイガ ニカメイチュウ	ロムダンゾル	1000 倍	21日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
いもち病、ごま葉枯病、 黒しゅ病、白葉枯病、 穂枯れ	オリブライト1キロ粒剤	1 kg/10a	45日	1	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
ウンカ類 コブノメイガ ニカメイチュウ	パダントレボン粒剤L	3 kg	30日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
カメムシ、ウンカ類、 ニカメイ虫	スタークル粒剤	3 kg	7日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
いもち病、ウンカ類、 カメムシ類、紋枯病	ワイドパンチ豆つぶ	250 g/10a	35日	1	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
ウンカ類、ツマゲロ ヨコバイ	スタークル豆つぶ	250～500 g/10a	7日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

穀類 稲

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

もも

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 2 2 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		定植日		管理()		管理()
---------	--------	--	-----	--	-------	--	-------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病虫害	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
アブラムシ類、カメムシ類、モモハモグリガ	アドマイヤー顆粒水和剤	5000～10000倍	3日	2			* *	* *	* *
カイガラムシ類、幼虫	アプロードフロアブル	1000倍	14日	3			* *	* *	* *
ウメシロカイガラムシ	コルト顆粒水和剤	2000～3000倍	1日	3			* *	* *	* *
アブラムシ類、カイガラムシ類、シンクイムシ類、ハマキムシ類、モモハモグリガ	サイアノックス水和剤	1000倍	21日	3			* *	* *	* *
アブラムシ類、カメムシ類、シンクイムシ類、モモハモグリガ	スタークル顆粒水溶剤	2000倍	1日	3			* *	* *	* *
カイガラムシ類	マシン油乳剤	25～50倍	発芽前						
カイガラムシ類	モスピラン顆粒水溶剤	2000倍	1日	3			* *	* *	* *
モモハモグリガ	ロディー水和剤	1000～2000倍	1日	5					
せん孔細菌病	ICボルドー412	30～50倍	—						

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--

2025年

もも

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 2 2 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
灰星病 黒星病	インダーフロアブル	5000 倍	1日	4	/	/	/	/	* * / * *
せん孔細菌 病 縮葉病	カスミンボルドー	500 倍	開花前	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
うどんこ病 灰星病 黒星病	ストロビードライフフロアブル	2000 倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
ホモフシス腐敗 病,灰星病	デランフロアブル	600 倍	7日	4	/	/	/	/	* * / * *
枝折病	トップジンM水和剤	1000 倍	1日	6	/	/	/	/	/
せん孔細菌病 灰星病 黒星病 縮葉病	トレノックスフロアブル	500 倍	7日	5	/	/	/	/	/
うどんこ病,すすかび病,ホ モフシス腐敗病,果実赤点 病,灰星病,黒星病,炭疽病	ナリアWDG	2000 倍	1日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
せん孔細菌 病	バリダシン液剤5	500 倍	7日	4	/	/	/	/	* * / * *
ホモフシス腐敗病,灰 星病,黒星病,炭疽病	フリントフロアブル25	2000 倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
うどんこ病 灰星病 ホモフシス腐敗病	ベルコート水和剤	1000～2000 倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

果樹類 核果類 もも類:果実を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始 キウイフルーツ 生産履歴帳 0 1 0 0 1 1 0 3 2 3 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		定植日		管理()		管理()	
---------	--------	----------------------	-----	----------------------	-------	----------------------	-------	----------------------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
カメムシ類、キイロマイカ、キウイヒメヨコバイ、キレビスカシハ	アグロスリン乳剤	1000～2000倍	7日	3				* * / * *	* * / * *
キイロマイカ、カメムシ	アディオソ乳剤	2000倍	7日	5					
クワシロカイガラムシ	アプロード水和剤	1000倍	1日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
キウイヒメヨコバイ	コテツフロアブル	2000倍	1日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
カメムシ類	スタークル顆粒水溶剤	1000～2000倍	1日	3				* * / * *	* * / * *
ヨコバイ、キイロマイカ	パダンSG水溶剤	1500倍	30日	3				* * / * *	* * / * *
ハマキムシ類	フェニックス顆粒水和剤	4000倍	7日	3				* * / * *	* * / * *
キウイヒメヨコバイ	モスピラン顆粒水溶剤	2000～4000倍	7日	3				* * / * *	* * / * *
果実軟腐病	アリエッティ水和剤	600倍	120日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------

2025年

キウイフルーツ 生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 2 3 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
かいよう病,花腐細菌病	カスミンボルドー	1000 倍		4	/	/	/	/	* * / * *
貯蔵病害(灰色かび病)	ストロビードライフロアブル	2000 倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
貯蔵病害(灰色かび病)	スミブレンド水和剤	2000 倍	1日	4	/	/	/	/	* * / * *
果実軟腐病	ダコニール1000	500～1000 倍	60日	7	/	/	/	/	/
果実軟腐病	トップジンM水和剤	1000 倍	1日	5	/	/	/	/	/
果実軟腐病 灰色かび病	ベルコート水和剤	1000 倍	1日	5	/	/	/	/	/
貯蔵病害(灰色かび病)	ロブラール水和剤	1500～2000 倍	1日	4	/	/	/	/	* * / * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

果樹類:果実を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

りんご

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 2 4 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		定植日		管理()		管理()
---------	--------	--	-----	--	-------	--	-------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
アブラムシ類、キンモンホリガ、シンクイムシ類、ハダニ類	アーデント水和剤	1000 倍	1日	3				* * / * *	* * / * *
ハダニ類	クミアイアタックオイル	100 倍							
アブラムシ類、キンモンハモグリガ、キンモンホリガ	アドマイヤー水和剤	1000～2000 倍	3日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
ホリガ、ハモグリガ	カスケード乳剤	2000～4000 倍	14日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
ホリガ、ハマキムシ、ハダニ	コテツフロアブル	2000 倍	1日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
ハダニ、サビダニ	コロマイト乳剤	1000 倍	1日	1		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
アブラムシ	スミチオン乳剤	1000～2000 倍	30日	3			* * / * *	* * / * *	* * / * *
ハマキムシ	トレボン水和剤	2000 倍	14日	3			* * / * *	* * / * *	* * / * *
アブラムシ類	モスピラン顆粒水溶剤	2000～4000 倍	1日	3			* * / * *	* * / * *	* * / * *

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--

2025年

りんご

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 2 4 - 1

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病虫害	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
黒点病	エムダイファー水和剤	400～650 倍	30日	1	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
斑点落葉病	コサイド3000	2000 倍	—		/	/	/	/	/
うどんこ病 黒星病 黒点病 モニア病	ストロビードライフフロアブル	3000 倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
すす点病,すす斑病	Zボルドー	500 倍	—		/	/	/	/	/
黒星病	ダコニール1000	1000 倍	45日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
黒星病 落葉病	デランフロアブル	1000～2000 倍	60日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
うどんこ病,モニア病 黒星病,腐らん病	ベフラン液剤25	1000 倍		6	/	/	/	/	/
黒星病,斑点 落葉病	ベルクート水和剤	1000～2000 倍	1日	6	/	/	/	/	/
すす点病 落葉病	マネージ水和剤	2000 倍	21日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

果樹類 仁果類:果実を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

くり

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 2 5 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		定植日		管理()		管理()
---------	--------	--	-----	--	-------	--	-------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
クリシキゾウムシ	アグロスリン水和剤	1000～3000倍	7日	5					
クリタマバチ	アディオン乳剤	1000～2000倍	14日	5					
アブラムシ類	アドマイヤー水和剤	1000倍	7日	3				*/*	*/*
カイガラムシ	アプロード水和剤	1000倍	7日	2			*/*	*/*	*/*
カイガラムシ アブラムシ	エルサン乳剤	1000倍	14日	4					*/*
キクイムシ類 コウモリガ	サッチューコートSセット	15倍	90日	1		*/*	*/*	*/*	*/*
ネスジキノカワガ、モ モノゴマダラノメイガ	トクチオン乳剤	1000倍	7日	5					
カミキリムシ類	トラサイドA乳剤	100～200倍	14日	1		*/*	*/*	*/*	*/*
クリシキゾウムシ	トレボン水和剤	2000倍	14日	3				*/*	*/*

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--

2025年

くり

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 2 5 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ネズミ・キナワガ モモノゴマダラノメイガ	パダンSG水溶剤	1500 倍	裂果前	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
胴枯病	トップジンMペースト	1 倍	削取り直後	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
実炭疽病	ベンレート水和剤	2000～3000 倍	14日	4	/	/	/	/	* * / * *
クリイガ・アブラムシ	マブリック水和剤20	2000 倍	7日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

果樹類:種子を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

日本なし

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 2 6 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		定植日		管理()		管理()
---------	--------	--	-----	--	-------	--	-------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
アブラムシ類 カメムシ類 シツカイトムシ類 ハマキムシ類	アグロスリン水和剤	1000～2000倍	1日	3				* * / * *	* * / * *
アブラムシ類	ウララDF	2000～4000倍	14日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
アブラムシ	オリオン水和剤40	1000倍	3日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
チャノキイロアザミ ウマ アブラムシ類	コルト顆粒水和剤	3000～4000倍	1日	3				* * / * *	* * / * *
アブラムシ類 カメムシ類 ケムシ類 シツカイトムシ類	スタークル顆粒水溶剤	2000倍	1日	3				* * / * *	* * / * *
カメムシ類	テルスター水和剤	1000～2000倍	1日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
サンホーゼカイガラムシ	トモノールS	25～50倍	発芽前						
クワコナカイガラムシ	バリアード顆粒水和剤	4000倍	1日	3				* * / * *	* * / * *
ケムシ類	フェニックス顆粒水和剤	4000倍	1日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--

2025年

日本なし

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 2 6 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
アブラムシ類	モスピラン顆粒水溶剤	2000～4000倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
褐色斑点病 黒星病 黒斑病 輪紋病	キノンドーフロアブル	1000倍	3日	9	/	/	/	/	/
黒斑病	スコア顆粒水和剤	2000倍	14日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
うどんこ病 黒斑病 輪紋病	ストロビードライフロアブル	2000～3000倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
黒星病 赤星病 うどんこ病	トリフミン水和剤	2000～3000倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
黒星病 黒斑病 炭疽病 輪紋病	ナリアWDG	2000倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
胴枯病	バッチレート	1倍	剪定時	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
うどんこ病 黒星病 黒斑病 輪紋病	ベルクート水和剤	1000～1500倍	14日	5	/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

果樹類 仁果類:果実を収穫するもの(日本なし、西洋なし、中国なし)

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

びわ

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 2 7 - 1

生産者(コード/氏名)		品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000				a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	定植日	/	管理()	/	管理()	/
---------	--------	---	-----	---	-------	---	-------	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病虫害	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
アブラムシ	アディオン水和剤	2000 倍	7日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
アブラムシ類、カメムシ類	アドマイヤーフロアブル	2000 倍	7日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
ハダニ	ハーベストオイル	100 倍	10-3月		/	/	/	/	/
ナシヒメシクイ	パダンSG水溶剤	1500 倍	90日	4	/	/	/	/	* * / * *
アブラムシ類 カミキリムシ類	モスピラン顆粒水溶剤	2000～4000 倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
アブラムシ カメムシ	ロディー水和剤	2000 倍	1日	4	/	/	/	/	* * / * *
炭疽病	アミスター10フロアブル	1000 倍	7日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
がんしゅ病	ICボルドー66D	50 倍	—		/	/	/	/	/
がんしゅ病	コサイド3000	1000 倍	—		/	/	/	/	/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

びわ

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 2 7 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
たてぼや病	ジマンダイセン水和剤	600 倍	落弁期まで	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
がんしゅ病	Zボルドー	500 倍	—		/	/	/	/	/
ごま色斑点病	トップジンM水和剤	800 倍	14日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
白紋羽病	フロンサイドSC	500～1000 倍	収穫後開花前	1	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
ごま色斑点病	ベンレート水和剤	2000 倍	14日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

果樹類 仁果類:果実を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

月作業開始

大粒種ぶどう

生産履歴帳

0100110328-1

生産者(コード/氏名)	品種名(※栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	定植日	/	管理()	/	管理()	/
---------	--------	---	-----	---	-------	---	-------	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
チャノキイロアサミウマ、コナカイガラムシ	アクタラ顆粒水溶剤	2000 倍	7日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
ハダニ	カネマイトフロアブル	1000～1500 倍	14日	1	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
ハダニ	コロマイト水和剤	2000 倍	7日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
コナカイガラムシ類	スタークル顆粒水溶剤	1000～2000 倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
アブラムシ類、フタテンヒメコバエ、ブドウウスカシバ、ブドウトリハ	スミチオン乳剤	1000～2000 倍	21日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
サビダニ類、ハダニ類	石灰硫黄合剤	20～40 倍	冬季		/	/	/	/	/
チャノキイロアサミウマ	ダントツ水溶剤	2000～4000 倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
ブドウトラカミキリ	トラサイドA乳剤	200～300 倍	発芽前	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
アザミウマ類、カイガラムシ類、コナメシ類成虫、フタテンヒメコバエ	モスピラン顆粒水溶剤	2000～4000 倍	14日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

大粒種ぶどう

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 2 8 - 1

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病虫害	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
べと病	ICボルドー66D	25～200 倍	—		/	/	/	/	/
うどんこ病 灰色かび病 黒とう病	インダーフロアブル	8000 倍	30日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
べと病,黒とう病, 枝膨病	キノンドーフロアブル	600 倍	45日	4	/	/	/	/	* * / * *
さび病	ジマンダイセン水和剤	1000 倍	45日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
べと病 灰色かび病 褐斑病 黒とう病	ストロビードライフロアブル	2000～3000 倍	14日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
さび病,べと病, 褐斑病	Zボルドー	500～800 倍	—		/	/	/	/	/
黒とう病,枝膨病	ベフラン液剤25	1000 倍	60日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
灰色かび病, 白腐病	ロブラール水和剤	1000～1500 倍	60日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

果樹類 ベリー類 等の小粒果実類:果実を収穫するもの(小粒種ぶどう、大粒種ぶどう) ※ スミチオン乳剤のみ使用時期が異なる 大粒:21日 小粒:90日

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

ピーマン

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 2 9 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		播種日		定植日		
---------	--------	----------------------	-----	----------------------	-----	----------------------	----------------------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
コガネムシ類幼虫	ダイアジノン粒剤5	4～6 kg/10a	10日	3					
オオタバコガ、コナジラミ類	アフーム乳剤	2000 倍	1日	2					
アブラムシ類	ウララDF	2000～4000 倍	1日	2					
オオタバコガ	カスケード乳剤	2000 倍	1日	3					
オオタバコガ、ハダニ類、ミナミキイロアザミウマ、ミナミキイロアザミウマ	コテツフロアブル	2000 倍	1日	2					
アブラムシ類、コナジラミ類	コルト顆粒水和剤	4000 倍	1日	2					
コナジラミ類、ハダニ類	コロマイト乳剤	1000 倍	1日	2					
アブラムシ類	チェス顆粒水和剤	5000 倍	1日	3					
アザミウマ類、オオタバコガ、ハスモンヨトウ	ディアナSC	2500～5000 倍	1日	2					

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------

2025年

ピーマン

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 2 9 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
アブラムシ類	トレボン乳剤	1000 倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
タバコガ類	プレオフロアブル	1000 倍	1日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
オオタバコガ、ハスモンヨトウ	プレバソンフロアブル5	1000～2000 倍	1日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
アザミウマ類	モスピラン顆粒水溶剤	4000 倍	1日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
うどんこ病	アフェットフロアブル	2000～4000 倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
灰色かび病	アミスター20フロアブル	2000 倍	1日	4	/	/	/	/	* * / * *
うどんこ病	カスミンボルドー	1000 倍	1日	5	/	/	/	/	/
褐斑細菌病、黒腐病、軟腐病、斑点細菌病	コサイド3000	2000 倍	—		/	/	/	/	/
うどんこ病 黒枯病 斑点病	ダコニール1000	1000 倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
うどんこ病	トリフミン水和剤	3000～5000 倍	1日	5	/	/	/	/	/
疫病	ランマンフロアブル	2000 倍	1日	4	/	/	/	/	* * / * *
灰色かび病 菌核病	ロブラール水和剤	1000～1500 倍	1日	4	/	/	/	/	* * / * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

野菜類 なす科果菜類 ピーマン及びとうがらし類: 果実を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

しょうが

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 3 0 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		播種日		定植日		* * / * *
---------	--------	----------------------	-----	----------------------	-----	----------------------	-----------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病虫害	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
一年生雑草	ガスタード微粒剤	20～30 kg/10a	定植21日前まで	1		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
ネコブセンチュウ	ネマトリンエース粒剤	20kg/10a	植付前	1		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
根茎腐敗病	ユニフォーム粒剤	18 kg/10a	30日	3				* * / * *	* * / * *
ハスモンヨトウ	トレボン乳剤	1000 倍	7日	3				* * / * *	* * / * *
ハスモンヨトウ	ノーモルト乳剤	2000 倍	7日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
アワノメイガ フキノメイガ	パダンSG水溶剤	1500 倍	7日	5					
ハスモンヨトウ	プレバソンフロアブル5	2000 倍	1日	3				* * / * *	* * / * *
根茎腐敗病	オラクル顆粒水和剤	2000 倍	3日	3				* * / * *	* * / * *
白星病	サンリット水和剤	1000 倍	7日	5					

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------

2025年

しょうが

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 3 0 - 1

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病虫害	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
白星病 紋枯病	ダコニール1000	1000 倍	14日	5	/	/	/	/	/
白星病	トリフミン水和剤	1000 倍	1日	5	/	/	/	/	/
紋枯病	バリダシン液剤5	800 倍	14日	4	/	/	/	/	* * / * *
いもち病	ベンレート水和剤	1000 倍	21日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
紋枯病	モンカットフロアブル40	2000 倍	3日	6	/	/	/	/	/
根茎腐敗病	ランマンフロアブル	500～1000 倍	30日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

野菜類 根菜類 畑地根菜類:根茎を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

なばな類

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 3 1 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		播種日		定植日		
---------	--------	----------------------	-----	----------------------	-----	----------------------	----------------------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ケラ、コガネムシ類 幼虫、ネキリムシ類	ダイアジノン粒剤5	6 kg/10a	は種時	1					
アオムシ、コナガ、ハイマダラノ メイガ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ	アフーム乳剤	1000～2000倍	7日	2					
コナガ、ハスモンヨトウ	ディアナSC	2500～5000倍	1日	2					
アオムシ、ウリノメイガ、オオタバコガ、コナガ、シロイチモンジヨトウ、ハスモンヨトウ	デルフィン顆粒水和剤	1000倍	1日						
コナガ	フェニックス顆粒水和剤	2000～4000倍	1日	2					
アオムシ、コナガ、ハスモンヨトウ	プレバソンフロアブル5	2000倍	1日	3					
アブラムシ類、カブラハバチ、キスジノミハムシ	モスピラン顆粒水溶剤	4000倍	14日	1					
褐斑細菌病、黒腐病、軟腐病、斑点細菌病	コサイド3000	2000倍	—						
うどんこ病	ハーモメイト水溶剤	800～1000倍	1日						

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------

2025年

なばな類

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 3 1 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
白さび病	ランマンフロアブル	2000 倍	3日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

野菜類 葉菜類 非結球あぶらな科葉菜類 なばな類:茎葉及び花蕾を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

野菜類

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 3 2 - 1

生産者(コード/氏名)		品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000				a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	播種日	/	定植日	/	/
---------	--------	---	-----	---	-----	---	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ハダニ類 うどんこ病	アカリタッチ乳剤	1000～3000倍	1日		/	/	/	/	/
アブラムシ類、うどんこ病、ハダニ類	エコピタ液剤	100倍	1日		/	/	/	/	/
アオムシ、コナガ、ヨトウムシ	ゼンターリ顆粒水和剤	1000～2000倍	1日		/	/	/	/	/
アオムシ、ウリノメイガ、オオタバコガ、コナガ、シロイチモンジヨトウ、ハスモンヨトウ	デルフィン顆粒水和剤	1000倍	1日		/	/	/	/	/
アオムシ、コナガ	バシレックス水和剤	1000～2000倍	1日		/	/	/	/	/
うどんこ病、さび病	カリグリーン	800～1000倍	1日		/	/	/	/	/
褐斑細菌病	コサイド3000	2000倍	—		/	/	/	/	/
うどんこ病 軟腐病 白さび病	ジーファイン水和剤	750～1000倍	1日		/	/	/	/	/
うどんこ病 灰色かび病	ハーモメイト水溶剤	800～1000倍	1日		/	/	/	/	/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

0 1 0 0 1 1 0 3 3 2 - 1

2025年 月 作業開始

つぼみな

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 3 3 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		播種日		定植日		
---------	--------	----------------------	-----	----------------------	-----	----------------------	----------------------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ケラ,コガネムシ類 幼虫,ネキリムシ類	ダイアジノン粒剤5	6 kg/10a	は種時	1					
アオムシ,コナガ,ハイマダラノ メイガ,ハスモンヨトウ,ヨトウム シ	アフーム乳剤	1000～2000 倍	7日	2					
コナガ,ハスモンヨ トウ	ディアナSC	2500～5000 倍	1日	2					
アオムシ,ウリノメイガ,オオタ バ,コガ,コナガ,シロイチモン シ,ハスモンヨトウ	デルフィン顆粒水和剤	1000 倍	1日						
コナガ	フェニックス顆粒水和剤	2000～4000 倍	1日	2					
アオムシ,コナガ,ハ スモンヨトウ	プレバソンフロアブル5	2000 倍	1日	3					
アブラムシ類,カブラハ バチ,キスジノミハムシ	モスピラン顆粒水溶剤	4000 倍	14日	1					
白さび病	アミスター20フロアブル	2000 倍	7日	2					
褐斑細菌病,黒腐病, 軟腐病,斑点細菌病	コサイド3000	2000 倍	—						

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------

2025年

つぼみな

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 3 3 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
うどんこ病	ハーモメイト水溶剤	800～1000倍	1日		/	/	/	/	/
白さび病	ランマンフロアブル	2000倍	3日	3	/	/	/	* / *	* / *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

野菜類 葉菜類 非結球あぶらな科葉菜類 なばな類:茎葉及び花蕾を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

月

作業開始

はなっこりー

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 3 4 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	播種日	/	定植日	/	/
---------	--------	---	-----	---	-----	---	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ケラ,コガネムシ類 幼虫,ネキリムシ類	ダイアジノン粒剤5	6 kg/10a	は種時	1	/	/	/	/	/
アオムシ,コナガ,ハイマダラメイガ,ハスモンヨトウ,ヨトウムシ	アフーム乳剤	1000～2000倍	7日	2	/	/	/	/	/
コナガ,ハスモンヨトウ	ディアナSC	2500～5000倍	1日	2	/	/	/	/	/
アオムシ,ウリノメイガ,オオタバコガ,コナガ,シロイチモンジヨトウ,ハスモンヨトウ	デルフィン顆粒水和剤	1000倍	1日		/	/	/	/	/
コナガ	フェニックス顆粒水和剤	2000～4000倍	1日	2	/	/	/	/	/
アオムシ,コナガ,ハスモンヨトウ	プレバソンフロアブル5	2000倍	1日	3	/	/	/	/	/
アブラムシ類,カブラハバチ,キスジノミハムシ	モスピラン顆粒水溶剤	4000倍	14日	1	/	/	/	/	/
褐斑細菌病,黒腐病,軟腐病,斑点細菌病	コサイド3000	2000倍	—		/	/	/	/	/
うどんこ病	ハーモメイト水溶剤	800～1000倍	1日		/	/	/	/	/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

はなっこりー

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 3 4 - 1

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病虫害	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
白さび病	ランマンフロアブル	2000 倍	3日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

野菜類 葉菜類 非結球あぶらな科葉菜類 なばな類:茎葉及び花蕾を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

月

作業開始

みずかけな

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 3 5 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	播種日	/	定植日	/	/
---------	--------	---	-----	---	-----	---	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ケラ,コガネムシ類 幼虫,ネキリムシ類	ダイアジノン粒剤5	6 kg/10a	は種時	1	/	/	/	/	/
アオムシ,コナガ,ハイマダラメイガ,ハスモンヨトウ,ヨトウムシ	アフーム乳剤	1000～2000倍	7日	2	/	/	/	/	/
コナガ,ハスモンヨトウ	ディアナSC	2500～5000倍	1日	2	/	/	/	/	/
アオムシ,ウリノメイガ,オオタバコガ,コナガ,シロイチモンジヨトウ,ハスモンヨトウ	デルフィン顆粒水和剤	1000倍	1日		/	/	/	/	/
コナガ	フェニックス顆粒水和剤	2000～4000倍	1日	2	/	/	/	/	/
アオムシ,コナガ,ハスモンヨトウ	プレバソンフロアブル5	2000倍	1日	3	/	/	/	/	/
アブラムシ類,カブラハバチ,キスジノミハムシ	モスピラン顆粒水溶剤	4000倍	14日	1	/	/	/	/	/
褐斑細菌病,黒腐病,軟腐病,斑点細菌病	コサイド3000	2000倍	—		/	/	/	/	/
うどんこ病	ハーモメイト水溶剤	800～1000倍	1日		/	/	/	/	/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

みずかけな

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 3 5 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
白さび病	ランマンフロアブル	2000 倍	3日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

野菜類 葉菜類 非結球あぶらな科葉菜類 なばな類:茎葉及び花蕾を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

よもぎ

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 3 6 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい) ■収穫開始予定月 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	播種日	/	定植日	/	*/	*/
---------	--------	---	-----	---	-----	---	----	----

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病虫害	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
アブラムシ類,うどんこ病,ハダニ類	エコピタ液剤	100 倍	1日		/	/	/	/	/
ミナキイロアザミウマ	コテツフロアブル	2000 倍	3日	1	/	*/	*/	*/	*/
アザミウマ類	スピノエース顆粒水和剤	5000 倍	3日	1	/	*/	*/	*/	*/
アブラムシ類	マラソン乳剤	2000 倍	7日	1	/	*/	*/	*/	*/
褐斑細菌病,黒腐病,軟腐病,斑点細菌病	コサイド3000	2000 倍			/	/	/	/	/
うどんこ病	ハーモメイト水溶剤	800～1000 倍	1日		/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

0 1 0 0 1 1 0 3 3 6 - 1

2025年 月 作業開始

せり

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 3 7 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		播種日		定植日		* * / * *
---------	--------	--	-----	--	-----	--	-----------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病虫害	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
アブラムシ類	アクタラ粒剤5	3 kg/10a 湛水散布	100日	1		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
葉腐病	ユニフォーム粒剤	3 kg/10a 湛水散布	21日	1		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
ハスモンヨトウ	カスケード乳剤	4000 倍	7日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
ハダニ類	コロマイト乳剤	2000 倍	1日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
アブラムシ類	スタークル顆粒水溶剤	2000 倍	7日	3				* * / * *	* * / * *
アザミウマ類	スピノエース顆粒水和剤	5000 倍	1日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
ヨトウムシ	プレバソンフロアブル5	2000 倍	7日	1		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
葉枯病	アミスター20フロアブル	2000 倍	7日	4					* * / * *
葉枯病	トップジンM水和剤	1500 倍	14日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--

2025年

せり

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 3 7 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
軟腐病	Zボルドー	500～1000倍	—		/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

野菜類 葉菜類 せり科葉菜類:茎葉を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

エンサイ

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 3 8 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	播種日	/	定植日	/	/
---------	--------	---	-----	---	-----	---	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病虫害	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ハスモンヨトウ	アタブロン乳剤	2000 倍	14日	2	/	/	/	/	/
ハスモンヨトウ	アフーム乳剤	2000 倍	7日	2	/	/	/	/	/
ハスモンヨトウ	コテツフロアブル	2000 倍	3日	2	/	/	/	/	/
ハダニ類	コロマイト乳剤	2000 倍	1日	1	/	/	/	/	/
アザミウマ類	スピノエース顆粒水和剤	5000 倍	1日	2	/	/	/	/	/
ハスモンヨトウ	プレバソンフロアブル5	2000 倍	1日	2	/	/	/	/	/
アブラムシ類	モスピラン顆粒水溶剤	4000 倍	7日	2	/	/	/	/	/
白さび症	アリエッティ水和剤	1000 倍	7日	2	/	/	/	/	/
褐斑細菌病,黒腐病,軟腐病,斑点細菌病	コサイド3000	2000 倍	—		/	/	/	/	/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

エンサイ

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 3 8 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
うどんこ病	ハーモメイト水溶剤	800～1000倍	1日		/	/	/	/	/
白さび病	ランマンフロアブル	2000倍	3日	3	/	/	/	* / *	* / *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

野菜類 葉菜類:茎葉を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

月

作業開始

つるむらさき

生産履歴帳

0100110339-1

生産者(コード/氏名)	品種名(※栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	播種日	/	定植日	/	/
---------	--------	---	-----	---	-----	---	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ヨトウムシ	アディオン乳剤	2000 倍	7日	2	/	/	/	/	/
ハスモンヨトウ	カスケード乳剤	4000 倍	1日	2	/	/	/	/	/
アオムシ、ウリナメダ、オオタハコガ、コナガ、シロイチモン、ヨトウ、ハスモンヨトウ	デルフィン顆粒水和剤	1000 倍	1日		/	/	/	/	/
ハスモンヨトウ	プレバソンフロアブル5	2000 倍	1日	3	/	/	/	/	/
褐斑細菌病、黒腐病、軟腐病、斑点細菌病	コサイド3000	2000 倍	—		/	/	/	/	/
さび病 灰色かび病 うどんこ病	ハーモメイト水溶剤	800 倍	1日		/	/	/	/	/
紫斑病	ベンレート水和剤	2000 倍	14日	2	/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

クレソン

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 4 0 - 1

生産者(コード/氏名)		品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000				a

■農薬使用について(○で囲んで下さい) ■収穫開始予定月 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	播種日	/	定植日	/	/
---------	--------	---	-----	---	-----	---	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ハダニ類	アカリタッチ乳剤	1000～3000倍	1日		/	/	/	/	/
アブラムシ類,うどんこ病,ハダニ類	エコピタ液剤	100倍	1日		/	/	/	/	/
アオムシ,コナガ,ヨトウムシ	ゼンターリ顆粒水和剤	1000～2000倍	1日		/	/	/	/	/
アオムシ,ウリノメイガ,オオタバコガ,コナガ,シロイチモンジヨトウ,ハスモンヨトウ	デルフィン顆粒水和剤	1000倍	1日		/	/	/	/	/
アオムシ,コナガ	バシレックス水和剤	1000～2000倍	1日		/	/	/	/	/
うどんこ病	カリグリーン	800～1000倍	1日		/	/	/	/	/
褐斑細菌病,黒腐病,軟腐病,斑点細菌病	コサイド3000	2000倍	—		/	/	/	/	/
うどんこ病	ジーファイン水和剤	750～1000倍	1日		/	/	/	/	/
うどんこ病	ハーモメイト水溶剤	800～1000倍	1日		/	/	/	/	/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

クレソン

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 4 0 - 1

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

[illegible]

野菜類: 茎葉を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

月

作業開始

ふだんそう

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 4 1 - 1

生産者(コード/氏名)		品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000				a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	播種日	/	定植日	/	/
---------	--------	---	-----	---	-----	---	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
アブラムシ類,うどんこ病,ハダニ類	エコピタ液剤	100 倍	1日		/	/	/	/	/
ハスモンヨトウ	カスケード乳剤	4000 倍	7日	2	/	/	/	/	/
ハダニ類	コロマイト乳剤	1500 倍	1日	2	/	/	/	/	/
ハスモンヨトウ	スピノエース顆粒水和剤	4000 倍	3日	2	/	/	/	/	/
アブラムシ類	モスピラン顆粒水溶剤	4000 倍	7日	2	/	/	/	/	/
褐斑細菌病,黒腐病,軟腐病,斑点細菌病	コサイド3000	2000 倍	—		/	/	/	/	/
うどんこ病	ハーモメイト水溶剤	800～1000 倍	1日		/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

ふだんそう

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 4 1 - 1

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

[illegible]

野菜類 葉菜類 ヒユ科葉菜類:葉を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始 非結球アブラナ科葉菜類 生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 4 2 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい) ■収穫開始予定月 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	播種日	/	定植日	/	*/	*/
---------	--------	---	-----	---	-----	---	----	----

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
キスジノミハムシ、ケラ	ダイアジノン粒剤5	全面土壌混和 6 kg/10a	は種時又は定植時	1	/	*/	*/	*/	*/
根こぶ病	オラクル粉剤	20～30 kg/10a	は種前又は定植時	2	/	/	*/	*/	*/
アオムシ	アディオン乳剤	2000 倍	1日	3	/	/	/	*/	*/
アオムシ、アザミウマ類、コナガ、ハスモンヨトウ、ハモグリハエ類、ヨトウムシ	アフーム乳剤	1000～2000 倍	7日	3	/	/	/	*/	*/
アブラムシ類	ウララDF	4000 倍	1日	2	/	/	*/	*/	*/
コナガ、ハスモンヨトウ	ディアナSC	2500～5000 倍	1日	2	/	/	*/	*/	*/
コナガ	フェニックス顆粒水和剤	2000～4000 倍	1日	2	/	/	*/	*/	*/
コナガ、ハスモンヨトウ	プレオフロアブル	1000 倍	7日	2	/	/	*/	*/	*/
アオムシ、コナガ	マツチ乳剤	2000 倍	3日	3	/	/	/	*/	*/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

非結球アブラナ科葉菜類 生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 4 2 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
アブラムシ類、カブラハバチ、キスジノミハムシ	モスピラン顆粒水溶剤	4000 倍	7日	1	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
白さび病	アミスター20フロアブル	2000 倍	7日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
うどんこ病	ジーファイン水和剤	750～1000 倍	1日		/	/	/	/	/
白さび病	ランマンフロアブル	2000 倍	3日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

野菜類 葉菜類: 茎葉(花茎がのびだす前のもの)を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

たかな

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 4 3 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		播種日		定植日		
---------	--------	----------------------	-----	----------------------	-----	----------------------	----------------------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ネキリムシ類	ダイアジノン粒剤5	6 kg/10a	は種時又は定植時	1					
根こぶ病	オラクル粉剤	20～30 kg/10a	は種前又は定植前	2					
アオムシ	アディオン乳剤	2000 倍	1日	3					
アオムシ、アザミウマ類、コナガ、ハスモンヨトウ、ハモグリバエ類、ヨトウムシ	アフーム乳剤	1000～2000 倍	7日	3					
アブラムシ類	ウララDF	4000 倍	1日	2					
コナガ、ハスモンヨトウ	ディアナSC	2500～5000 倍	1日	2					
コナガ	フェニックス顆粒水和剤	2000～4000 倍	1日	2					
コナガ、ハスモンヨトウ	プレオフロアブル	1000 倍	7日	2					
アオムシ、コナガ	マツチ乳剤	2000 倍	3日	3					

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------

2025年

たかな

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 4 3 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
アブラムシ類、カブラハバチ、キスジノミハムシ	モスピラン顆粒水溶剤	4000 倍	7日	1	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
白さび病	アミスター20フロアブル	2000 倍	7日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
うどんこ病	ジーファイン水和剤	750～1000 倍	1日		/	/	/	/	/
白さび病	ランマンフロアブル	2000 倍	3日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

野菜類 葉菜類:茎葉(花茎がのびだす前のもの)を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

しろな

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 4 4 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		播種日		定植日		
---------	--------	----------------------	-----	----------------------	-----	----------------------	----------------------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ネキリムシ類	ダイアジノン粒剤5	6 kg/10a	は種時又は定植時	1					
根こぶ病	オラクル粉剤	20～30 kg/10a	は種前又は定植前	2					
アオムシ	アディオン乳剤	2000～4000 倍	1日	3					
アオムシ、アザミウマ類、コナガ、ハスモンヨトウ、ハモグリハエ類、ヨトウムシ	アフーム乳剤	1000～2000 倍	7日	3					
アブラムシ類	ウララDF	4000 倍	1日	2					
コナガ、ハスモンヨトウ	ディアナSC	2500～5000 倍	1日	2					
コナガ	フェニックス顆粒水和剤	2000～4000 倍	1日	2					
コナガ、ハスモンヨトウ	プレオフロアブル	1000 倍	7日	2					
アオムシ、コナガ	マツチ乳剤	2000 倍	3日	3					

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------

2025年

しろな

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 4 4 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
アブラムシ類、カブラハバチ、キスジノミハムシ	モスピラン顆粒水溶剤	4000 倍	7日	1	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
白さび病	アミスター20フロアブル	2000 倍	7日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
うどんこ病	ジーファイン水和剤	750～1000 倍	1日		/	/	/	/	/
白さび病	ランマンフロアブル	2000 倍	3日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

野菜類 葉菜類:茎葉(花茎がのびだす前のもの)を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

月

作業開始

たいさい

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 4 5 - 1

生産者(コード/氏名)		品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000				a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	播種日	/	定植日	/	/
---------	--------	---	-----	---	-----	---	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病虫害	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ネキリムシ類	ダイアジノン粒剤5	6 kg/10a	は種時又は定植時	1	/	/	/	/	/
根こぶ病	オラクル粉剤	20～30 kg/10a	は種前又は定植前	2	/	/	/	/	/
アオムシ	アディオン乳剤	2000～4000 倍	1日	3	/	/	/	/	/
アオムシ、アザミウマ類、コナガ、ハスモンヨトウ、ハモグリハエ類、ヨトウムシ	アフーム乳剤	1000～2000 倍	7日	3	/	/	/	/	/
アブラムシ類	ウララDF	4000 倍	1日	2	/	/	/	/	/
コナガ、ハスモンヨトウ	ディアナSC	2500～5000 倍	1日	2	/	/	/	/	/
コナガ	フェニックス顆粒水和剤	2000～4000 倍	1日	2	/	/	/	/	/
コナガ、ハスモンヨトウ	プレオフロアブル	1000 倍	7日	2	/	/	/	/	/
アオムシ、コナガ	マツチ乳剤	2000 倍	3日	3	/	/	/	/	/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

たいさい

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 4 5 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
アブラムシ類、カブラハバチ、キスジノミハムシ	モスピラン顆粒水溶剤	4000 倍	7日	1	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
白さび病	アミスター20フロアブル	2000 倍	7日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
うどんこ病	ジーファイン水和剤	750～1000 倍	1日		/	/	/	/	/
白さび病	ランマンフロアブル	2000 倍	3日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

野菜類 葉菜類:茎葉(花茎がのびだす前のもの)を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

のざわな

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 4 6 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	播種日	/	定植日	/	/
---------	--------	---	-----	---	-----	---	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ネキリムシ類	ダイアジノン粒剤5	6 kg/10a	は種時又は定植時	1	/	/	/	/	/
根こぶ病	オラクル粉剤	20～30 kg/10a	は種前又は定植前	2	/	/	/	/	/
アオムシ	アディオン乳剤	2000 倍	1日	3	/	/	/	/	/
アオムシ、コナガ	アフーム乳剤	1000～2000 倍	3日	3	/	/	/	/	/
アブラムシ類	ウララDF	4000 倍	1日	2	/	/	/	/	/
コナガ、ハスモンヨウ	ディアナSC	2500～5000 倍	1日	2	/	/	/	/	/
コナガ	フェニックス顆粒水和剤	2000～4000 倍	1日	2	/	/	/	/	/
コナガ、ハスモンヨウ	プレオフロアブル	1000 倍	7日	2	/	/	/	/	/
アオムシ、コナガ	マツチ乳剤	2000 倍	3日	3	/	/	/	/	/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

のざわな

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 4 6 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
アブラムシ類、カブラハバチ、キスジノミハムシ	モスピラン顆粒水溶剤	4000 倍	7日	1	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
白さび病	アミスター20フロアブル	2000 倍	7日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
うどんこ病	ジーファイン水和剤	750～1000 倍	1日		/	/	/	/	/
白さび病	ランマンフロアブル	2000 倍	3日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

野菜類 葉菜類 非結球あぶらな科葉菜類: 茎葉(花茎がのびだす前のもの)を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

ケール

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 4 7 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		播種日		定植日		
---------	--------	----------------------	-----	----------------------	-----	----------------------	----------------------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
アブラムシ類,コナガ	モスピラン粒剤	3 kg/10a	は種時	1					
根こぶ病	オラクル粉剤	20～30 kg/10a	は種前又は定植前	2					
アオムシ	アディオン乳剤	2000 倍	1日	3					
アオムシ,アザミウマ類,コナガ,ハスモンヨトウ,ハモグリバエ類,ヨトウムシ	アフーム乳剤	1000～2000 倍	7日	3					
アブラムシ類	ウララDF	4000 倍	1日	2					
コナガ,ハスモンヨトウ	ディアナSC	2500～5000 倍	1日	2					
コナガ	フェニックス顆粒水和剤	2000～4000 倍	1日	2					
コナガ,ハスモンヨトウ	プレオフロアブル	1000 倍	7日	2					
アオムシ,コナガ	マツチ乳剤	2000 倍	3日	3					

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------

2025年

ケール

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 4 7 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
アブラムシ類、カブラハバチ、キスジノミハムシ	モスピラン顆粒水溶剤	4000 倍	7日	1	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
白さび病	アミスター20フロアブル	2000 倍	7日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
うどんこ病	ジーファイン水和剤	750～1000 倍	1日		/	/	/	/	/
白さび病	ランマンフロアブル	2000 倍	3日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

野菜類 葉菜類:茎葉(花茎がのびだす前のもの)を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

ハーブ類

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 4 8 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい) ■収穫開始予定月 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用																		
---------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
フザリウム菌による病害	ベンレート水和剤	0.2 %	播種前	1					
アオムシ、コナガ、ヨトウムシ	ゼンターリ顆粒水和剤	1000～2000倍	1日						
アオムシ、ウリノメイガ、オオタバコガ、コナガ、シロイチモンジヨトウ、ハスモンヨトウ	デルフィン顆粒水和剤	1000倍	1日						
アオムシ、コナガ	バシレックス水和剤	1000～2000倍	1日						
褐斑細菌病、黒腐病、軟腐病、斑点細菌病	コサイド3000	2000倍	—						

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--

2025年

月

作業開始

えごま(葉)

生産履歴帳

0100110349-1

生産者(コード/氏名)	品種名(※栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	播種日	/	定植日	/	/
---------	--------	---	-----	---	-----	---	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
アブラムシ類	アグロスリン乳剤	2000 倍	7日	1	/	/	/	/	/
ハスモンヨトウ	カスケード乳剤	4000 倍	3日	2	/	/	/	/	/
ハダニ類	コロマイト乳剤	2000 倍	1日	2	/	/	/	/	/
アブラムシ類	スタークル顆粒水溶剤	3000 倍	3日	2	/	/	/	/	/
アザミウマ類	スピノエース顆粒水和剤	10000 倍	3日	3	/	/	/	/	/
ハダニ類	ダニサラバフロアブル	2000 倍	1日	2	/	/	/	/	/
ハスモンヨトウ	プレバソンフロアブル5	2000 倍	3日	3	/	/	/	/	/
褐斑細菌病,黒腐病, 軟腐病,斑点細菌病	コサイド3000	2000 倍	—		/	/	/	/	/
灰色かび病	ストロビーフロアブル	3000 倍	7日	2	/	/	/	/	/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

えごま(葉)

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 4 9 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
さび病 灰色かび病 うどんこ病	ハーモメイト水溶剤	800 倍	1日		/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

野菜類 葉菜類 しそ科葉菜類:茎葉を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

月

作業開始

レモングラス

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 5 0 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月/日

■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	/	/	/	/	/
---------	--------	---	---	---	---	---	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病虫害	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
フザリウム菌による病害	ベンレート水和剤	0.16 %/乾燥種子重量	は種前	1	/	/	/	/	/
ハダニ類	アカリタッチ乳剤	1000～3000 倍	1日		/	/	/	/	/
コナジラミ類	エコピタ液剤	100～200 倍	1日		/	/	/	/	/
アオムシ、コナガ、ヨトウムシ	ゼンターリ顆粒水和剤	1000～2000 倍	1日		/	/	/	/	/
うどんこ病	カリグリーン	800～1000 倍	1日		/	/	/	/	/
褐斑細菌病、黒腐病、軟腐病、斑点細菌病	コサイド3000	2000 倍	—		/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

0 1 0 0 1 1 0 3 5 0 - 1

2025年 月 日 作業開始 コリアンダー(葉) 生産履歴帳 0100110351 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい) ■収穫開始予定月 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		播種日		定植日		
---------	--------	----------------------	-----	----------------------	-----	----------------------	----------------------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病虫害	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
アブラムシ類	アドマイヤーフロアブル	4000 倍	3日	2					
ハスモンヨトウ	カスケード乳剤	4000 倍	7日	2					
ハスモンヨトウ	コテツフロアブル	2000 倍	7日	2					
ハダニ類	コロマイト乳剤	2000 倍	1日	1					
ヨトウムシ	プレバソンフロアブル5	2000 倍	7日	1					
軟腐病	Zボルドー	500～1000 倍	—						

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------

コリアンダー(葉) 生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 5 1 - 1

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

[illegible]

野菜類 葉菜類 せり科葉菜類: 茎葉を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

月

作業開始

レモンバーム

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 5 2 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月/日

■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	/	/	/	/	/
---------	--------	---	---	---	---	---	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病虫害	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ハスモンヨトウ	カスケード乳剤	4000 倍	3日	2	/	/	/	/	/
アブラムシ類	スタークル顆粒水溶剤	3000 倍	3日	2	/	/	/	/	/
アオムシ、コナガ、ヨトウムシ	ゼンターリ顆粒水和剤	1000～2000 倍	1日		/	/	/	/	/
アオムシ、コナガ	バシレックス水和剤	1000～2000 倍	1日		/	/	/	/	/
褐斑細菌病、黒腐病、軟腐病、斑点細菌病	コサイド3000	2000 倍	—		/	/	/	/	/
うどんこ病 灰色かび病	ハーモメイト水溶剤	800～1000 倍	1日		/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始 フェンネル(葉) 生産履歴帳 0100110353 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい) ■収穫開始予定月 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	播種月/日	/	定植月/日	/	*/	*/
---------	--------	---	-------	---	-------	---	----	----

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後に単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
アブラムシ類	アドマイヤーフロアブル	4000 倍	14日	1	/	*/	*/	*/	*/
ハスモンヨトウ	カスケード乳剤	4000 倍	7日	2	/	/	*/	*/	*/
ハダニ類	コロマイト乳剤	2000 倍	3日	1	/	*/	*/	*/	*/
ヨトウムシ	プレバソンフロアブル5	2000 倍	7日	1	/	*/	*/	*/	*/
軟腐病	Zボルドー	500～1000 倍	—		/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

フェンネル(葉) 生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 5 3 - 1

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

[illegible]

野菜類 葉菜類 せり科葉菜類: 茎葉を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

なす

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 5 4 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	播種日	/	定植日	/	/
---------	--------	---	-----	---	-----	---	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
コガネムシ類幼虫	ダイアジノン粒剤5	4～6 kg/10a	3日	3	/	/	/	/	/
オオタバコカアザミウマ類 ハダニ類 マメハモグリハエ	アフーム乳剤	2000 倍	1日	2	/	/	/	/	/
コナジラミ類 ミカンキロアザミウマ アブラムシ類	ウララDF	2000 倍	1日	3	/	/	/	/	/
ミナキロアザミウマ マメハモグリハエ	カスケード乳剤	2000～4000 倍	1日	4	/	/	/	/	/
ミカンキロアザミウマ ヨトウムシ チャノホコリダニ ハダニ類	コテツフロアブル	2000 倍	1日	4	/	/	/	/	/
ハダニ類	コロマイト水和剤	2000 倍	1日	2	/	/	/	/	/
アザミウマ類	ディアナSC	2500～5000 倍	1日	2	/	/	/	/	/
アブラムシ類	トレボン乳剤	1000～2000 倍	1日	3	/	/	/	/	/
ハモグリハエ類	プレバソンフロアブル5	1000～2000 倍	1日	2	/	/	/	/	/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

なす

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 5 4 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
アザミウマ類	モスピラン顆粒水溶剤	2000～4000倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
うどんこ病 すすかび病	アミスター20フロアブル	2000 倍	1日	4	/	/	/	/	* * / * *
灰色かび病 菌核病	ゲッター水和剤	1000～1500倍	1日	5	/	/	/	/	/
褐斑細菌病,黒腐病, 軟腐病,斑点細菌病	コサイド3000	2000 倍	—		/	/	/	/	/
うどんこ病 すすかび病	サンヨール	700 倍	1日	4	/	/	/	/	* * / * *
うどんこ病 黒枯病	ダコニール1000	1000 倍	1日	4	/	/	/	/	* * / * *
うどんこ病 すすかび病	トリフミン水和剤	3000～5000倍	1日	5	/	/	/	/	/
灰色かび病 うどんこ病	フルピカフロアブル	2000～3000倍	1日	4	/	/	/	/	* * / * *
半身萎凋病	ベンレート水和剤	500倍(土壌灌注)	14日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
褐色腐敗病	ランマンフロアブル	2000 倍	1日	4	/	/	/	/	* * / * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

野菜類 なす科果菜類:果実を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

セミノール

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 5 5 - 1

生産者(コード/氏名)		品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000				a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	定植日	/	管理()	/	管理()	/
---------	--------	---	-----	---	-------	---	-------	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ケシスイ類,コナカイガラムシ類,ミカンハモグリガ	アクタラ顆粒水溶剤	2000～3000倍	14日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
カイガラムシ類幼虫,ミカンゲコナジラミ若齢幼虫	アプロードフロアブル	1000倍	45日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
ハダニ,サビダニ	カネマイトフロアブル	1000～1500倍	7日	1	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
アブラムシ類,チャノキイロアザミウマ	キラップフロアブル	1000～2000倍	21日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
カネタキ,スグリゾウムシ,ハスモンヨトウ,ヨモギエダシヤク	コテツフロアブル	2000～4000倍	1日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
コナカイガラムシ類,チャノキイロアザミウマ	スタークル顆粒水溶剤	1000～2000倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
ハダニ	ダニエモンフロアブル	4000～6000倍	7日	1	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
アゲハ類,チャノキイロアザミウマ,ミカンサビダニ	マツチ乳剤	2000～3000倍	21日	1	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
ミドリヒメヨコバイ	ロディー乳剤	2000倍	7日	4	/	/	/	/	* * / * *

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

セミノール

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 5 5 - 1

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病虫害	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
かいよう病,黒点病	ICボルドー412	50 倍	—		/	/	/	/	/
かいよう病	ICボルドー66D	25～200 倍	—		/	/	/	/	/
黒点病	エムダイファー水和剤	600～800 倍	90日	2	/	/	* */ * *	* */ * *	* */ * *
かいよう病	コサイド3000 +クレフノン200倍	1000 倍～2000倍	—		/	/	/	/	/
灰色かび病	スイッチ顆粒水和剤	2000～3000 倍	45日	2	/	/	* */ * *	* */ * *	* */ * *
灰色かび病 そうか病	ストロビードライフロアブル	2000～3000 倍	14日	3	/	/	/	* */ * *	* */ * *
貯蔵病害	ベフラン液剤25	2000 倍	1日	2	/	/	* */ * *	* */ * *	* */ * *
黒点病	ペンコゼブ水和剤	600～800 倍	90日	4	/	/	/	/	* */ * *
設定なし	マデックEW	2000～3000 倍	10日	1	/	* */ * *	* */ * *	* */ * *	* */ * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

果樹類 かんきつ:果実を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

ライム

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 5 6 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		定植日		管理()		管理()
---------	--------	--	-----	--	-------	--	-------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ケシスイ類,コナカイラムシ類,ミカンハモグリガ	アクタラ顆粒水溶剤	2000～3000倍	14日	3				* * / * *	* * / * *
カイガラムシ類幼虫,ミカンゲコナジラミ若齢幼虫	アプロードフロアブル	1000倍	45日	3				* * / * *	* * / * *
ハダニ,サビダニ	カネマイトフロアブル	1000～1500倍	7日	1		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
アブラムシ類,チャノキイロアザミウマ	キラップフロアブル	1000～2000倍	21日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
アザミウマ類(ネキアザミウマを除く),チャノホコリダニ,ミカンサビダニ	コテツフロアブル	2000～6000倍	1日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
コナカイラムシ類,チャノキイロアザミウマ	スタークル顆粒水溶剤	1000～2000倍	1日	3				* * / * *	* * / * *
ハダニ	ダニエモンフロアブル	4000～6000倍	7日	1		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
アゲハ類,チャノキイロアザミウマ,ミカンサビダニ	マツチ乳剤	2000～3000倍	21日	1		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
ミドリヒメコバイ	ロディー乳剤	2000倍	7日	4					* * / * *

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--

2025年

ライム

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 5 6 - 1

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病虫害	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
かいよう病,黒点病	ICボルドー412	50 倍	—		/	/	/	/	/
かいよう病	ICボルドー66D	25～200 倍	—		/	/	/	/	/
黒点病	エムダイファー水和剤	600～800 倍	90日	2	/	/	* */ * *	* */ * *	* */ * *
かいよう病	コサイド3000 +クレフノン200倍	1000 倍	—		/	/	/	/	/
灰色かび病	スイッチ顆粒水和剤	2000～3000 倍	45日	2	/	/	* */ * *	* */ * *	* */ * *
灰色かび病 そうか病	ストロビードライフロアブル	2000～3000 倍	14日	3	/	/	/	* */ * *	* */ * *
貯蔵病害	ベフラン液剤25	2000倍～3000倍	1日	2	/	/	* */ * *	* */ * *	* */ * *
黒点病	ペンコゼブ水和剤	600～800 倍	90日	4	/	/	/	/	* */ * *
設定なし	マデックEW	2000～3000 倍	10日	1	/	* */ * *	* */ * *	* */ * *	* */ * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

果樹類 かんきつ:果実を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

すいか

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 5 7 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		播種日		定植日		* * / * *
---------	--------	--	-----	--	-----	--	-----------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
コナメシ類幼虫	ダイアジノン粒剤5	4～6 kg/10a	14日	4					* * / * *
ミナキイロアザミウマ	アフーム乳剤	1000～2000倍	1日	3				* * / * *	* * / * *
オオタバコガ	カスケード乳剤	2000～4000倍	7日	4					* * / * *
ハダニ類	コロマイト乳剤	1000倍	7日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
アザミウマ類	スピノエース顆粒水和剤	5000倍	1日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
アブラムシ類	チェス顆粒水和剤	5000倍	3日	4					* * / * *
アブラムシ類 コナジラミ類 ハスモンヨトウ ヨトウムシ	トレボン乳剤	1000倍	3日	3				* * / * *	* * / * *
オオタバコガ ハモグリバエ類	プレバソンフロアブル5	2000倍	1日	3				* * / * *	* * / * *
アザミウマ類 アブラムシ類	モスピラン顆粒水溶剤	2000～4000倍	3日	3				* * / * *	* * / * *

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--

2025年

すいか

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 5 7 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
うどんこ病	アフエットフロアブル	2000 倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
炭そ病 つる枯病	アミスター20フロアブル	2000 倍	1日	4	/	/	/	/	* * / * *
褐斑細菌病,黒腐病, 軟腐病,斑点細菌病	コサイド3000	2000 倍	—		/	/	/	/	/
つる枯病	ジマンダイセン水和剤	400～600 倍	7日	7	/	/	/	/	/
炭疽病 つる枯病	ダコニール1000	700 倍	3日	5	/	/	/	/	/
うどんこ病	トリフミン水和剤	3000～5000 倍	1日	5	/	/	/	/	/
うどんこ病	ベルクート水和剤	1000 倍	1日	4	/	/	/	/	* * / * *
つる枯病 炭疽病	ベンレート水和剤	2000～3000 倍	1日	5	/	/	/	/	/
つる枯病 菌核病	ロブラール水和剤	1000 倍	1日	4	/	/	/	/	* * / * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

野菜類 うり類 うり類(成熟):成熟した果実を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

すもも

生産履歴帳

0100110358-1

生産者(コード/氏名)	品種名(※栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		定植日		管理()		管理()
---------	--------	--	-----	--	-------	--	-------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
アブラムシ類, シンクイムシ類	アディオフロアブル	1500 倍	1日	2			*/*/*/*	*/*/*/*	*/*/*/*
アブラムシ類	アドマイヤー水和剤	2000 倍	21日	2			*/*/*/*	*/*/*/*	*/*/*/*
カイガラムシ類幼虫	アプロードフロアブル	1000 倍	14日	2			*/*/*/*	*/*/*/*	*/*/*/*
アブラムシ	オリオン水和剤40	1000 倍	7日	3			*/*/*/*	*/*/*/*	*/*/*/*
アブラムシ類	サイアノックス水和剤	1000 倍	21日	2			*/*/*/*	*/*/*/*	*/*/*/*
アブラムシ類, カメムシ類	ダントツ水溶剤	2000～4000 倍	3日	3			*/*/*/*	*/*/*/*	*/*/*/*
ケムシ類	デルフィン顆粒水和剤	1000 倍	1日						
カイガラムシ類	トモノールS	20～50 倍	発芽前						
アブラムシ類	モスピラン水溶剤	2000～4000 倍	1日	3			*/*/*/*	*/*/*/*	*/*/*/*

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--

2025年

すもも

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 5 8 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
灰星病 すす点病	アミスター10フロアブル	1000 倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
黒斑病 かいよう病	ICボルドー412	30 倍	—		/	/	/	/	/
灰色かび病 灰星病 黒星病	オーシャイン水和剤	3000 倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
黒星病	オーソサイド水和剤80	800～1000 倍	21日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
灰星病	スコア顆粒水和剤	2000～3000 倍	1日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
環紋葉枯病 炭疽病	ストロビードライフロアブル	2000 倍	7日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
サビダニ類,ハダニ類	石灰硫黄合剤	80～200 倍	夏期		/	/	/	/	/
黒星病 黒粒枝枯病	トップジンM水和剤	1000～1500 倍	21日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
灰星病	トリフミン水和剤	1000 倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

果樹類 核果類 小粒核果類:果実を収穫するもの(プラム、プルーン)

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

メロン

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 5 9 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	播種日	/	定植日	/	/
---------	--------	---	-----	---	-----	---	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
コガネムシ類幼虫	ダイアジノン粒剤5	4～6 kg	14日	4	/	/	/	/	/
ネコブセンチュウ	ネマトリンエース粒剤	15～20 kg	定植前	1	/	/	/	/	/
アザミウマ類,コナジラミ類,ハダニ類	アグリメック	500～1000倍	1日	3	/	/	/	/	/
ウリメカイハモグリハエ類アザミウマ類	アフーム乳剤	2000倍	1日	2	/	/	/	/	/
アブラムシ類コナジラミ類	ウララDF	2000～4000倍	1日	2	/	/	/	/	/
タバココナジラミ類ミナミキイロアザミウマ	カスケード乳剤	2000倍	7日	3	/	/	/	/	/
コナジラミ類トマトハモグリハエハダニ類	コロマイト乳剤	1000倍	1日	2	/	/	/	/	/
アブラムシ類	チェス顆粒水和剤	5000倍	3日	4	/	/	/	/	/
アザミウマ類	ディアナSC	2500～5000倍	1日	2	/	/	/	/	/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

メロン

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 5 9 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ハモグリバエ・オオタバコガ	プレバソンフロアブル5	2000 倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
アブラムシ類	モスピラン顆粒水溶剤	8000 倍	3日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
うどんこ病	アフェットフロアブル	2000～4000 倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
べと病 つる枯病	アミスター20フロアブル	2000 倍	1日	4	/	/	/	/	* * / * *
斑点細菌病	カスミンボルドー	1000 倍	3日	5	/	/	/	/	/
褐斑細菌病,黒腐病, 軟腐病,斑点細菌病	コサイド3000	2000 倍	—		/	/	/	/	/
疫病 つる枯病	ジマンダイセン水和剤	400～600 倍	7日	5	/	/	/	/	/
べと病 つる枯病	ダコニール1000	1000 倍	3日	5	/	/	/	/	/
つる枯病 陥没病	トップジンM水和剤	1500～2000 倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
うどんこ病 つる枯病	ベルコート水和剤	1000 倍	1日	5	/	/	/	/	/
べと病	ランマンフロアブル	1000～2000 倍	1日	4	/	/	/	/	* * / * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

野菜類 うり類 うり類(成熟):成熟した果実を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

月

作業開始

ブルーベリー

生産履歴帳

0100110360-1

生産者(コード/氏名)	品種名(※栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	定植日	/	管理()	/	管理()	/
---------	--------	---	-----	---	-------	---	-------	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
オウトウショウジョウバエ	アディオフロアブル	2000 倍	1日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
イラガ類	コテツフロアブル	2000 倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
トクガ・マイマイガ	サイアノックス水和剤	1000 倍	30日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
コガネムシ類	ダイアジノン粒剤5	6 kg/10a	14日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
アブラムシ類 ケムシ類	ダントツ水溶剤	2000～4000 倍	45日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
ケムシ類	デルフィン顆粒水和剤	1000 倍	1日		/	/	/	/	/
オウトウショウジョウバエ	モスピラン顆粒水溶剤	4000 倍	1日	1	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
斑点病	オキシラン水和剤	600 倍	収穫後 落葉前	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
灰色かび病	カリグリーン	800 倍	1日		/	/	/	/	/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

ブルーベリー

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 6 0 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
灰色かび病 斑点病	ストロビードライフフロアブル	3000 倍	14日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
斑点病	ベンレート水和剤	3000 倍	7日	1	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

果樹類 ベリー類等の小粒果実類 ベリー類:果実を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

いちじく

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 6 1 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		定植日		管理()		管理()	
---------	--------	----------------------	-----	----------------------	-------	----------------------	-------	----------------------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
アブラムシ類 ヨトウムシ	アーデント水和剤	1000 倍	1日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
アザミウマ類	アクタラ顆粒水溶剤	2000 倍	1日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
アブラムシ アザミウマ	アディオン乳剤	2000 倍	1日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
カンザワハダニ ヒラス・ハナアザミウマ	コテツフロアブル	2000 倍	1日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
アザミウマ類	スピノエース顆粒水和剤	5000 倍	1日	1		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
カイガラムシ類, 縮葉病	サンケイ石灰硫黄合剤	7～10 倍							
ネコブセンチュウ	ネマトリンエース粒剤	20 kg/10a	60日	1		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
カミキリムシ類	バイオリサ・カミキリ	1 本	成虫発生初期						
ハダニ類	バロックフロアブル	2000 倍	1日	1		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------

2025年

いちじく

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 6 1 - 1

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病虫害	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ハダニ類	マイトコーネフロアブル	1000 倍	1日	1	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
アザミウマ類 キボシカミキリ	モスピラン顆粒水溶剤	2000 倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
疫病、そうか病	アミスター10フロアブル	1000 倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
さび病	アンビルフロアブル	1000 倍	1日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
疫病	コサイド3000	1000 倍	—		/	/	/	/	/
疫病	Zボルドー	1000 倍	—		/	/	/	/	/
疫病	ダコニール1000	2000 倍	1日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
黒かび病	トップジンM水和剤	1000～1500 倍	7日	5	/	/	/	/	/
さび病、そうか病	トリフミン水和剤	2000 倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
さび病	ラリー水和剤	2000 倍	1日	4	/	/	/	/	* * / * *
疫病	ランマンフロアブル	2000 倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
黒かび病	ロブラール500アクア	1000 倍	3日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

果樹類:果実を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

月

作業開始

かき

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 6 2 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		定植日		管理()		管理()
---------	--------	--	-----	--	-------	--	-------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
アザミウマ ヘタムシ カメムシ	アクタラ顆粒水溶剤	2000 倍	3日	3				* * / * *	* * / * *
アザミウマ類、イラガ類、カキハタニ、カキノヘタムシ	コテツフロアブル	2000～4000 倍	14日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
チャノキイロアザミウマ フジコナカイガラムシ	コルト顆粒水和剤	2000～3000 倍	1日	3				* * / * *	* * / * *
カキノヘタムシ、カメムシ類 チャノキイロアザミウマ	スタークル顆粒水溶剤	2000 倍	1日	3				* * / * *	* * / * *
うどんこ病、黒星病	石灰硫黄合剤	100 倍	—						
カキタマアザミウマ カキノヒメヨコバイ、ハダニ類	テルスター水和剤	1000 倍	14日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
カイガラムシ	ハーベストオイル	50 倍	発芽前						
イラガ類 カキノヘタムシ	フェニックス顆粒水和剤	4000 倍	7日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
アザミウマ類 カキノヒメヨコバイ カキノヘタムシ、カメムシ類	モスピラン顆粒水溶剤	2000～4000 倍	1日	3				* * / * *	* * / * *

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--

2025年

かき

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 6 2 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
灰色かび病	オンリーワンフロアブル	2000 倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
落葉病	エムダイファー水和剤	400～650 倍	45日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
うどんこ病 灰色かび病 炭疽病 落葉病	ストロビードライフロアブル	3000 倍	14日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
黒星病 うどんこ病	ベルコート水和剤	1000～1500 倍	14日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
炭疽病	ペンコゼブ水和剤	400～800 倍	45日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

果樹類:果実を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

月

作業開始

おうとう

生産履歴帳

0100110363-1

生産者(コード/氏名)	品種名(※栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	定植日	/	管理()	/	管理()	/
---------	--------	---	-----	---	-------	---	-------	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
コスカシハ [®] キクイムシ類	ガットキラー乳剤	50～100 倍	休眠期	1	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
オウトウショウジョウハ [®] エカン ザ [®] ワハダニ、チャノキイロアザ [®] ミウマ、ナミハダニ	コテツフロアブル	2000 倍	7日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
アメリカンロトリ、ナシク ンバイ、ハマキムシ類	スミチオン乳剤	1000 倍	14日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
カイガラムシ類	トモノールS	25～50 倍	—		/	/	/	/	/
ハダニ類	マイトコーネフロアブル	1000～1500 倍	14日	1	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
灰星病、褐色せん孔病、炭疽病	オーソサイド水和剤80	800 倍	3日	5	/	/	/	/	/
灰星病 せん孔病	トップジンM水和剤	1000～1500 倍	14日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

農薬散布後
収穫予定日 / 農薬散布後
収穫予定日 / 農薬散布後
収穫予定日 / 農薬散布後
収穫予定日 / 農薬散布後
収穫予定日 /

おうとう

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 6 3 - 1

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

[illegible]

果樹類 核果類：果実を収穫するもの（さくらんぼ）

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始 非結球メキャベツ 生産履歴帳 0100110364 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい) ■収穫開始予定月 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		播種日		定植日		* * / * *
---------	--------	--	-----	--	-----	--	-----------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病虫害	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
アブラムシ類	オンコル粒剤5	1 g/株 株元散布	定植時	1		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
ハスモンヨトウ	アフーム乳剤	1000 倍	7日	3				* * / * *	* * / * *
ハスモンヨトウ	コテツフロアブル	2000 倍	7日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
ヨトウムシ	スピノエース顆粒水和剤	5000 倍	14日	3				* * / * *	* * / * *
アオムシ、ウリノメイガ、オオタバコガ、コナガ、シロイチモンヨトウ、ハスモンヨトウ	デルフィン顆粒水和剤	1000 倍	1日						
アブラムシ類	モスピラン顆粒水溶剤	2000 倍	7日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
べと病、褐斑細菌病、黒斑細菌病、黒腐病、斑点細菌病	Zボルドー	500 倍	—						
さび病、灰色かび病、うどんこ病	ハーモメイト水溶剤	800 倍	1日						

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--

非結球メキャベツ 生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 6 4 - 1

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

[illegible]

野菜類 葉菜類 非結球あぶらな科葉菜類: 茎葉及び脇芽を収穫するもの(プチヴェール)

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

しいたけ

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 6 5 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	植菌日	/	管理()	/	管理()	/
---------	--------	---	-----	---	-------	---	-------	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
トリコデルマ菌によるほだ木の障害	きのこ用ベンレート水和剤	1000 倍	30日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

しいたけ

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 6 5 - 1

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

[illegible]

きのこ類:子実体(きのこ)を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日			/			農薬散布後 収穫予定日			/			農薬散布後 収穫予定日			/			農薬散布後 収穫予定日			/			農薬散布後 収穫予定日			/		
----------------	--	--	---	--	--	----------------	--	--	---	--	--	----------------	--	--	---	--	--	----------------	--	--	---	--	--	----------------	--	--	---	--	--

2025年 月 作業開始

たけのこ

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 6 6 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	管理()	/	管理()	/	管理()
---------	--------	---	-------	---	-------	---	-------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
アオムシ、ウリノメイガ、オオタバコガ、コナガ、シロイチモンヨトウ、ハスモンヨトウ	デルフィン顆粒水和剤	1000 倍	1日		/	/	/	/	/
褐斑細菌病	コサイド3000	2000 倍	—		/	/	/	/	/
べと病、褐斑細菌病、黒斑細菌病、黒腐病、斑点細菌病	Zボルドー	500 倍	—		/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

0 1 0 0 1 1 0 3 6 6 - 1

2025年 月 作業開始

あさつき

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 6 7 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	播種日	/	定植日	/	/
---------	--------	---	-----	---	-----	---	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
コガネムシ	ダイアジノン粒剤5	4～6 kg/10a	定植時	2	/	/	/	/	/
ヨトウムシ シロイチモジヨトウ	アフーム乳剤	1000～2000倍	7日	3	/	/	/	/	/
アザミウマ類、シロ イチモジヨトウ	スピノエース顆粒水和剤	2500～5000倍	3日	3	/	/	/	/	/
アザミウマ類	モスピラン顆粒水溶剤	2000倍	7日	3	/	/	/	/	/
さび病 ベと病 黄斑病 黒斑病	アミスター20フロアブル	2000倍	3日	4	/	/	/	/	/
褐斑細菌病、黒腐病、 軟腐病、斑点細菌病	コサイド3000	2000倍	—		/	/	/	/	/
アザミウマ類、ネキ ハモグリハエ	ファインセーブフロアブル	2000倍	1日	2	/	/	/	/	/
さび病	ラリー水和剤	2000倍	14日	3	/	/	/	/	/
黒斑病 小菌核腐敗病	ロブラール水和剤	1000～1500倍	14日	3	/	/	/	/	/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

ふき

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 6 8 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		播種日		定植日		
---------	--------	----------------------	-----	----------------------	-----	----------------------	----------------------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
フキアブラムシ	ダイアジノン粒剤5	株元処理 4 kg/10a	30日	3					
アブラムシ類 コナジラミ類	アドマイヤーフロアブル	4000 倍	7日	2					
ハスモンヨトウ ハダニ類	コテツフロアブル	2000 倍	7日	2					
アオムシ、ウリノメイガ、オオタバコガ、コナガ、シロイチモンジヨトウ、ハスモンヨトウ	デルフィン顆粒水和剤	1000 倍	1日						
フキノメイガ アザミウマ アブラムシ	パダンSG水溶剤	1500 倍	7日	2					
ハスモンヨトウ	プレバソンフロアブル5 (ふきのとうには不可)	2000 倍	3日	3					
コナジラミ類	モスピラン顆粒水溶剤 (ふきのとうには不可)	3000 倍	14日	2					
うどんこ病	ジーファイン水和剤	750～1000 倍	1日						
灰色かび病	セイビアーフロアブル20 (ふきのとうには不可)	1000 倍	7日	2					

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------

2025年

ふき

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 6 8 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
べと病,褐斑細菌病,黒斑細菌病,黒腐病,斑点細菌病	Zボルドー	500 倍	—		/	/	/	/	/
うどんこ病	トリフミン水和剤	3000 倍	14日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
白絹病	バリダシン液剤5 (ふきのとうには不可)	800 倍	7日	5	/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

野菜類 茎野菜類 ふき類:葉柄を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

月

作業開始

未成熟ささげ

生産履歴帳

0100110369-1

生産者(コード/氏名)	品種名(※栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	播種日	/	定植日	/	/
---------	--------	---	-----	---	-----	---	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
コガネムシ類幼虫	ダイアジノン粒剤5	4～6 kg/10a	定植時	2	/	/	/	/	/
ハモグリハエ類	アフーム乳剤	2000 倍	3日	2	/	/	/	/	/
ハダニ類	コテツフロアブル	2000 倍	1日	2	/	/	/	/	/
ハダニ類	コロマイト乳剤	1500 倍	1日	2	/	/	/	/	/
ハダニ類	ダニトロンフロアブル	1000～2000 倍	7日	1	/	/	/	/	/
アザミウマ類,ハスモンヨトウ,ハモグリハエ類	ディアナSC	2500～5000 倍	1日	2	/	/	/	/	/
ハスモンヨトウ	フェニックス顆粒水和剤	2000 倍	1日	2	/	/	/	/	/
シロイチモンジヨトウ,ハスモンヨトウ	プレオフロアブル	1000～2000 倍	1日	2	/	/	/	/	/
カメムシ類,ハモグリハエ類,マメシキイガ	マラソン乳剤	1000 倍	7日	3	/	/	/	/	/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

未成熟ささげ

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 6 9 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
アザミウマ類	モスピラン顆粒水溶剤	4000 倍	7日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
さび病,灰色かび病,菌核病	アフエットフロアブル	2000 倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
褐斑細菌病,黒腐病,軟腐病,斑点細菌病	コサイド3000	2000 倍	—		/	/	/	/	/
灰色かび病	セイビアーフロアブル20	1000 倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

野菜類 豆類(未成熟):未成熟なさや付き豆を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---