

南部営農だより 5月の防除

南部総合経済センター 電話：237-5580 Fax：237-5155
 長田営農出張所 電話：259-3233 Fax：258-2867



新体制になりました。
 今年度もよろしくお願
 いいたします。

センター長	購買	女性部	広域指導担当	地区購買担当	配送	地区指導担当
畑澤	郡司	山本	森(果樹)	久保田(東豊田・豊田)	立花	深井
	糟屋		山森(苺)	栗田(久能・大谷)		望月
	加藤			森川(高松・大里)		岩田

☆☆ ゴールデンウィークの営業のお知らせ ☆☆

月	火	水	木	金	土	日
4/28 通常営業	4/29 休業	4/30 通常営業	5/1 通常営業	5/2 通常営業	5/3 休業	5/4 休業
5/5 休業	5/6 休業	5/7 通常営業	5/7(水)より通常通りの営業となります。 ご理解ご協力お願いいたします。			

令和7年度 JA 静岡市農業支援策について

- ・茶園改植支援対策…茶園の若返、優良品種への更新を図る改植を支援(国の改植支援事業に準ずる)
- ・茶園転換支援対策…茶園から他作物への転換に対して支援
- ・ハウス新設支援対策…野菜、花卉、果樹等の経営改善を支援
- ・野生鳥獣害被害防止支援対策…防護施設設置等に対して支援

詳しくは南部総合経済センター
 までお問合せください。



令和7年度 静岡市農業支援策について

☆多様な担い手育成支援事業補助金

- ・補助対象者：前年の農業収入が50万円以上であること(認定農業者を除く)
- ・補助率：対象となる事業費(税抜)の1/3(上限30万円)

☆いきいき都市農業推進事業補助金

- ・補助対象者：市内に市街化区域内の農地を有しており、前年の農業収入が50万円以上であること
- ・補助率：対象となる事業費(税抜)の1/3(上限30万円)

高田農具展示会

修理も受け付けています

- ★5/1(木)5/2(金)8:30~12:30 長田支店前
- ★5/12(月)8:30~12:00 大谷支店前
- ★5/28(水)8:30~12:00 南部総合経済センター前

注意

市内にて防霜ファンの配線盗難が発生！！

ご自身の圃場並びに農業機械の確認をしてください。
 また、農地で不審者を見た際は、速やかに最寄りの
 警察にご相談下さい。

部農会回覧中

★JA 飲料のご案内

★トイレットペーパー注文書

★特定健診募集のお知らせ



防除暦の配布について

- 茶・水稻の防除暦(ポスター)について、部農会配布の無い地区で、必要な方は長田・南部
 営農までご来店お願いします。



女性部 お知らせ

- ◇ 5/13(火) 長田ブロック資源回収
- ◇ 5/14(水) 国吉田健康体操教室
- ◇ 5/20(火) 南部ブロック ゴキブリ団子作り

茶 (岩田)

防除作業を行う時は周辺茶園の摘採状況を確認し、ドリフトしないよう注意して下さい。

病害虫防除

一茶摘採後	カンザワハダニ チャノナガサビダニ ウンカ・スリップス	アグリメック [Ⓡ]	1,000 倍	7日
二茶萌芽期	炭疽病・もち病	スコア顆粒水和剤	2,000 倍	混用 7日
	ウンカ・スリップス	ウララDF	1,500 倍	

※サビダニやチャトゲコナジラミの発生が見られる茶園ではウララDFをコテツフロアブル[Ⓡ] (2,000 倍・7 日)
 に変えて散布して下さい。

「クワシロカイガラムシ」(防除時期・5月中旬頃) ※近年、発生が早い傾向があります。

防除薬剤：コルト顆粒水和剤(2,000 倍・7 日) 1000リットル／10a (枝幹に十分かかるように散布する。)

水稻 (石原・深井・望月)

- (1) 塩水選 10a あたり種もみ 4kg を用意し沈んだもみを用いる。

うるち	水 10 リットルあたり、塩 1.6kg または 硫安 2.0kg
もち	水 10 リットルあたり、塩 0.9kg または 硫安 1.1kg

種子浸漬について

昨年の記録的な猛暑により休眠が深く、
 出芽揃いがばらつく可能性があります。
対策 ⇒ 種子浸水の期間延長

- (2) 水洗い・水切り
 - ・塩分が残らないよう、種もみを十分水洗いする。
 - ・水を切り、目の粗い網袋などに詰める。袋詰は、7 分目程度とし余裕をもたせる。

- (3) 薬剤浸漬 薬液 20 リットルで、種もみ 10kg 分まで処理が可能。

ばか苗病・み枯細菌病	テクリードCフロアブル	(200 倍)100ml/水 20 ℓ	混用可
イネシנגレセンチュウ	スミチオン乳剤	(1,000 倍)20ml/水 20 ℓ	

※ 浸漬の際は薬液中で袋をよくゆする。24 時間静置後、取り出したら水洗いはしない。

- (4) 水中浸漬
 - ・種もみの 2 倍量の清水にゆっくり浸漬する。
 - ・日陰などの涼しい場所に 3~4 日 間静置する。この間、水を攪拌しない。
 - ・4 日目以降は、2 日に 1 度、水を入れ替える。

イチバン残液処理

残液 100 リットルに対し消石灰
 3kg を入れ、数日間直射日光
 にさらし、周囲に影響のない地
 点で土壌表面に散布などの処
 理をする。

- (5) 芽だし
 - ・発芽を揃えるため、30℃程度の温水で加温し 1mm 程度芽だしする。

- (6) 育苗
 育苗資材の消毒 10a あたり 20 箱準備する。

イチバン液	1,000 倍 瞬時浸漬 または ジョロによる散布(培土にはかけない)
-------	-------------------------------------

- ・培土は 10a 当たり粒状ばーまっと3号を3袋準備する。(床土約 2~3 kg・覆土約 1 kg)
- ・1 箱あたり 1 リットル以上をたっぷりかん水し、根上りを予防する。(覆土後は灌水しない)
- ・床土の水がひいたら、1 箱あたり催芽もみ 150~160g をは種し、覆土する。

- (7) 発芽→緑化
 - ・発芽時、もみ枯細菌病予防のため、30℃以上にならないように注意する。
 - ・緑化は日焼けしないよう、寒冷紗を用い、少しづつ光に慣らす

- (8) 硬化 日光に十分あて、丈夫な苗にする。下記薬剤をかん注する。

苗立枯病、ムレ苗予防、発根促進	タチガレン(液)	500 倍	1 箱当たり 500ml かん注
-----------------	----------	-------	------------------

Ⓡの記載のある農薬は、購入の際に印鑑が必要になります。

落葉果樹（森）＊使用時期ごとの農薬は混用できます

作物	使用時期	対象病虫害	農薬	倍率	使用基準
桃	5月上旬 (袋掛前)	黒星病・灰星病	フルーツセイバー	2,000倍	前日－3回
		カイガラムシ類	コルト顆粒水溶剤	2,000倍	前日－3回
		展着剤	ブレイクスルー	10,000倍	－
	5月中旬 (袋掛後)	せん孔細菌病 灰星病、うどんこ病 シンクイムシ類	バリダシン液剤 5 インダーフロアブル エクシレル SE	500倍 5,000倍 5,000倍	7日－4回 前日－4回 前日－3回
梨	5月上旬 (袋掛前)	黒星病・灰星病	フルーツセイバー	2,000倍	前日－3回
		アブラムシ類	コルト顆粒水溶剤	2,000倍	前日－3回
		展着剤	ブレイクスルー	10,000倍	－
	5月中旬	せん孔細菌病 灰星病、うどんこ病 シンクイムシ類	バリダシン液剤 5 インダーフロアブル エクシレル SE	500倍 5,000倍 5,000倍	7日－4回 前日－4回 前日－3回
梅	5月上旬 (袋掛前)	黒星病・灰星病	フルーツセイバー	2,000倍	前日－3回
		アブラムシ類	コルト顆粒水溶剤	2,000倍	前日－3回
		展着剤	ブレイクスルー	10,000倍	－
	5月中旬	せん孔細菌病 灰星病、うどんこ病 シンクイムシ類	バリダシン液剤 5 インダーフロアブル エクシレル SE	500倍 5,000倍 5,000倍	7日－4回 前日－4回 前日－3回
キウイ	5月上旬 (袋掛前)	黒星病・灰星病	フルーツセイバー	2,000倍	前日－3回
		アブラムシ類	コルト顆粒水溶剤	2,000倍	前日－3回
		展着剤	ブレイクスルー	10,000倍	－
	5月中旬	せん孔細菌病 灰星病、うどんこ病 シンクイムシ類	バリダシン液剤 5 インダーフロアブル エクシレル SE	500倍 5,000倍 5,000倍	7日－4回 前日－4回 前日－3回
いちじく	5月上旬 (袋掛前)	黒星病・灰星病	フルーツセイバー	2,000倍	前日－3回
		アブラムシ類	コルト顆粒水溶剤	2,000倍	前日－3回
		展着剤	ブレイクスルー	10,000倍	－
	5月中旬	せん孔細菌病 灰星病、うどんこ病 シンクイムシ類	バリダシン液剤 5 インダーフロアブル エクシレル SE	500倍 5,000倍 5,000倍	7日－4回 前日－4回 前日－3回
柿	5月上旬 (袋掛前)	黒星病・灰星病	フルーツセイバー	2,000倍	前日－3回
		アブラムシ類	コルト顆粒水溶剤	2,000倍	前日－3回
		展着剤	ブレイクスルー	10,000倍	－
	5月中旬	せん孔細菌病 灰星病、うどんこ病 シンクイムシ類	バリダシン液剤 5 インダーフロアブル エクシレル SE	500倍 5,000倍 5,000倍	7日－4回 前日－4回 前日－3回

＊やや盛り上がった紫黒色の病斑の枝をみつけたら、剪除し処分。（せん孔細菌病予防）

柑橘（森・新出）《青島温州、中晩柑(甘夏)》 病虫害防除

5月上中旬	灰色カビ病	スイッチ顆粒水和剤	3,000 倍(青島 7 日-3 回) (中晩柑 45 日-2 回)	混用可
	チャノキイロアザミウマ カメムシ類	スタークル顆粒水溶剤	2,000 倍(前日-3回)	
5月下旬	サビダニ チャノキイロアザミウマ	グレーシアフロアブル	4,000 倍(7 日-2 回)	混用可
	黒点病	ファンタジスタ顆粒水和剤	3,000 倍(14 日-3 回)	

＊カメムシ発生注意報発令中です。園内をよく観察し、今後の発生に注意してください。

有害鳥獣 捕獲実施中

捕獲期間中は、事故がないよう十分注意してください。

長田実施期間：5月31日まで(カラス・ヒヨドリ)6月30日まで(イノシシ・ハクビシン・アナグマ・アライグマ・ニホンジカ・サル)

南部実施期間：6月30日まで(タヌキ・アナグマ)通年(イノシシ・ハクビシン・アライグマ)

令和6年度 捕獲実績（協議会、猟友会より捕獲報告があったものの合計）

【長田】・イノシシ 65 頭 ・ハクビシン 2 頭 ・シカ 3 頭 ・カラス 2 羽 ・アナグマ 4 頭 ・タヌキ 11 頭

【南部】・イノシシ 4 頭 ・ハクビシン 20 頭 ・アナグマ 1 頭 ・タヌキ 3 頭



いちご（山森）

1. 育苗管理

① I B 化成 S1 号の場合：親株 1 株あたり 10 日で 3 粒もしくは 14 日で 4～5 粒を施用。

② 給液管理の場合：EC0.5～0.6 を目安に給液。（5 月の目安：400ml/株/日）



時期	薬剤	RAC	倍率	回数	主な対象病虫害
第 1 週 (27 日～3 日)	セイビアー（フ）	12	1000～1500 倍	1/3	炭そ病、うどんこ病
第 2 週 (4 日～10 日)	カスケード（乳）	15	4,000 倍	1/3	ヨトウ・アザミウマ
第 3 週 (11 日～17 日)	コサイド 3000	M1	1000 倍	-	炭そ病
第 4 週 (18 日～24 日)	エコピタ（液）	-	100 倍	-	うどんこ病・ハダニ・アブラムシ
第 5 週 (25 日～31 日)	ジマンダイセン（水）	M3	600 倍	2/6	炭そ病
第 6 週 (1 日～7 日)	モベント（フ）※散布	23	2,000 倍	1/2	ハダニ・アブラムシ・アザミウマ
第 7 週 (8 日～14 日)	ベルコート（水）	M7	1,000 倍	1/5	炭そ病・うどんこ病
第 8 週 (15 日～21 日)	エコピタ（液）	-	100 倍	-	うどんこ病・ハダニ・アブラムシ
第 9 週 (22 日～28 日)	デラン（フ）	M9	1000 倍	1/2	炭そ病
第 10 週 (29 日～5 月 4 日)	アグリメック	6	500～1000 倍	1/2	ハダニ
第 11 週 (5 月 5 日～11 日)	グレーシア（乳）	30	2000 倍	1/2	ハダニ・ヨトウ・アブラムシ・アザミウマ

2. 本圃管理

①病虫害防除

病虫害	薬剤名	RAC	倍率	回数	天敵	蜜蜂
うどんこ病	パレード 20（フ）	7	2,000～4,000 倍	3	なし	1 日
灰色かび病	ファンタジスタ（顆水）	11	2,000～3,000 倍	3	なし	1 日
アザミウマ	ファインセーブ（フ） [㊦]	34	1,000～2,000 倍	3	なし	1 日
	ベネビア OD	28	2,000 倍	3	なし	1 日
	㊦ディアナ SC	5	2,500～5,000 倍	2	14 日	7 日
アザミウマ・ハダニ	㊦グレーシア（乳）	30	2,000 倍	2	100 日以上	1 日
アブラムシ・コナジラミ	ウララ（DF）	29	2,000 倍	2	なし	1 日
ハダニ	※1 ダニオーテ（フ）	33	2,000 倍	2	なし	1 日
	㊦コロマイト（水和）	6	2,000 倍	2	7 日	1 日

㊦ 天敵や蜜蜂への影響が長い薬剤になります。ご使用には注意して下さい。

②収穫終了後の管理

- ・アザミウマが外へ出て増えないように、ハウスを閉めきり蒸しこみを行う
- ・高設栽培…収穫終了後2週間ほど水のみ流し、肥料分を吸わせた後処分する。
- ・土耕栽培…被覆資材を外し、雨にあてる。



野菜（石原・深井・望月）

野菜苗の定植時に粒剤を使用すると初期の害虫を抑えられ農薬散布の手間を省くことができます。

その他の適用害虫・登録作物につきましてはお問い合わせください。

農薬名	主な対象害虫	登録作物					
		キュウリ	スイカ	カボチャ	ナス	ピーマン	トマト
スタークル粒剤	アブラムシ・コナジラミ・アザミウマ	○	○	○	○	○	○
オルトラン粒剤	アブラムシ・コナジラミ・アザミウマ	○			○	○	○※
プリロッソ粒剤オメガ	アブラムシ・コナジラミ・アザミウマ	○	○		○	○	○
ダイアジノン粒剤5	ケラ・ネキリムシ・コガネムシ幼虫	○	○	○	○	○	○

※ ミニトマトに登録なし

㊦の記載のある農薬は、購入の際に印鑑が必要になります。