

南部営農だより

5月の防除

南部総合経済センター
長田営農出張所

電話：237-5580
電話：259-3233

Fax：237-5155
Fax：258-2867

	女性部	購買関係		指導関係	
		窓口	地区担当	広域指導	指導
南部総合経済センター センター長 畑沢 Tel 237-5580	山本	郡司 糟屋 加藤	田中（丸子） 渡辺（長田） 天野（長田営農出張所）	森（果樹・茶・有害） 山森（園芸・苺）	深井（園芸・水稻） 望月（園芸・水稻） 岩田（茶・有害）
長田営農出張所 Tel 259-3233	（山本）	（天野）	（田中） （渡辺）	（森） （山森）	石原（園芸・水稻） 新出（柑橘） 古井（園芸・水稻）

★★ ゴールデンウィークの営業のお知らせ ★★

月	火	水	木	金	土	日
4/28 通常営業	4/29 休業	4/30 通常営業	5/1 通常営業	5/2 通常営業	5/3 休業	5/4 休業
5/5 休業	5/6 休業	5/7 通常営業	5/7(水)より通常通りの営業となります。 ご理解ご協力お願いいたします。			

令和7年度 JA 静岡市農業支援策について

- ・茶園改植支援対策…茶園の若返、優良品種への更新を図る改植を支援(国の改植支援事業に準ずる)
- ・茶園転換支援対策…茶園から他作物への転換に対して支援
- ・ハウス新設支援対対策…野菜、花卉、果樹等の経営改善を支援
- ・野生鳥獣害被害防止支援対策…防護施設設置等に対して支援

詳しくは南部総合経済センター
までお問合せください。

令和7年度 静岡市農業支援策について(別紙パンフレット参照)

☆多様な担い手育成支援事業補助金(認定農業者を除く)

- ・補助対象者:前年の農業収入が50万円以上であること
- ・補助率:対象となる事業費(税抜)の1/3(上限30万円)

☆いきいき都市農業推進事業補助金

- ・補助対象者:市内に市街化区域内の農地を有しており、前年の農業収入が50万円以上であること
- ・補助率:対象となる事業費(税抜)の1/3(上限30万円)



高田農具展示会

修理も受け付けています

- ★5/1(木)5/2(金)8:30~12:30 長田支店前
- ★5/12(月)8:30~12:00 大谷支店前
- ★5/28(水)8:30~12:00 南部総合経済センター前



市内にて防霜ファンの配線盗難が発生！！



ご自身の圃場並びに農業機械の確認をしてください。
また、農地で不審者を見た際は、速やかに最寄りの警察に
ご連絡下さい。

防除暦の配布について

- 茶・水稻の防除暦(ポスター)について、部農会配布の無い地区に必要な方は、長田・南部営農まで
ご来店お願いします。柑橘防除暦は振興費を支払いの方に配布しています。

部農会回覧中

★JA 飲料のご案内

★トイレットペーパー注文書

★特定健診募集のお知らせ



茶（森・岩田）

防除作業を行う時は周辺茶園の摘採状況を確認し、ドリフトしないよう注意して下さい。

病虫害防除

一茶摘採後	カンザワハダニ チャノナガサビダニ ウンカ・スリップス	アグリメック [Ⓔ]	1,000 倍	7日
二茶萌芽期	炭疽病・もち病	スコア顆粒水和剤	2,000 倍	混用 7日
	ウンカ・スリップス	ウララDF	1,500 倍	

※サビダニやチャトゲコナジラミの発生が見られる茶園ではウララDFをコテツフロアブル[Ⓔ]（2,000 倍・7 日）
に変えて散布して下さい。

「クワシロカイガラムシ」(防除時期・5月中旬頃) ※近年、発生が早い傾向があります。

防除薬剤：コルト顆粒水和剤(2,000 倍・7 日) 1000 リットル／10a（枝幹に十分かかるように散布する）

水稻（石原・深井・望月）

- (1) 塩水選 10a あたり種もみ 4kg を用意し沈んだもみを用いる。

うるち	水 10 リットルあたり、塩 1.6kg または 硫安 2.0kg
もち	水 10 リットルあたり、塩 0.9kg または 硫安 1.1kg

- (2) 水洗い・水切り

- ・塩分が残らないよう、種もみを十分水洗いする。
- ・水を切り、目の粗い網袋などに詰める。袋詰は、7 分目程度とし余裕をもたせる。

- (3) 薬剤浸漬 薬液 20 リットルで、種もみ 10kg 分まで処理が可能。

ばか苗病・もみ枯細菌病	テクリードC フロアブル(200 倍)	100ml/水 20 $\frac{リットル}{リットル}$	混用可
イネシンガレセンチュウ	スミチオン乳剤(1000 倍)	20ml/水 20 $\frac{リットル}{リットル}$	

※ 浸漬の際は薬液中で袋をよくゆする。24 時間静置後、取り出したら水洗いせず風乾する。

- (4) 水中浸漬

- ・種もみの 2 倍量の清水にゆっくり浸漬する。
- ・日陰などの涼しい場所に 3～4 日 間静置する。この間、水を攪拌しない。
- ・4 日目以降は、2 日に 1 度、水を入れ替える。(浸漬期間の延長)

- (5) 芽だし

- ・発芽を揃えるため、30℃程度の温水で加温し 1mm 程度芽だしする。

- (6) 育苗

育苗資材の消毒 10a あたり 20 箱準備する。

イチバン液	1,000 倍	瞬時浸漬 または ジョロによる散布(培土にはかけない)
-------	---------	-----------------------------

- ・培土は 10a 当たり「粒状ばーるまっと3号」を3袋準備する。(床土約 2～3 kg・覆土約 1 kg)
- ・1 箱あたり 1 リットル以上をたっぷりかん水し、根上りを予防する。
- ・床土の水がひいたら、1 箱あたり催芽もみ 150～160g をは種し覆土する。(覆土後は灌水しない)

- (7) 発芽→緑化

- ・発芽時、もみ枯細菌病予防のため、30℃以上にならないように注意する。
- ・緑化は日焼けしないよう、寒冷紗を用い、少しづつ光に慣らす

- (8) 硬化 日光に十分あて、丈夫な苗にする。下記薬剤をかん注する。

苗立枯病、ムレ苗予防、発根促進	タチガレン(液)	500 倍	1 箱当たり 500ml かん注
-----------------	----------	-------	------------------

*育苗中にカビが発生したらダコレート(水)500 倍を1箱当たり 500ccかん注する。

種子浸漬について

昨年の記録的な猛暑により種子の休眠
が深く、出芽揃いがばらつく可能性があ
ります。

対策 ⇒ 種子浸漬の期間延長

イチバン残液処理

残液 100 リットルに対し消石灰
3kg を入れ、数日間直射日光
にさらし、周囲に影響のない地
点で土壌表面に散布などの処
理をする。

[Ⓔ]の記載のある農薬は、購入の際に印鑑が必要になります。

落葉果樹（森）＊使用時期ごとの農薬は混用できます

作物	使用時期	対 象 病 害 虫	農 薬	倍 率	使用基準
桃	5月上旬 （袋掛前）	黒星病・灰星病	フルーツセイバー	2,000倍	前日－3回
		カイガラムシ類	コルト顆粒水溶剤	2,000倍	前日－3回
		展着剤	ブレイクスルー	10,000倍	－
	5月中旬 （袋掛後）	せん孔細菌病 灰星病、うどんこ病 シンクイムシ類	バリダシン液剤 5 インダーフロアブル エクシレル SE	500倍 5,000倍 5,000倍	7日－4回 前日－4回 前日－3回
梨	5月上旬 （袋掛前）	灰星病・枝折病	トップジンM水和剤	1,000倍	前日－6回
		＊やや盛り上がった紫黒色の病斑の枝をみつけたら、剪除し処分。（せん孔細菌病予防）			
		黒星病、赤星病 アブラムシ類	オンリーワンフロアブル アクタラ顆粒水溶剤	2,000倍 3,000倍	前日－3回 前日－3回
	5月中旬	黒星病・輪紋病 ハマキムシ・シンクイムシ類	ベルコート水和剤 ロディー水和剤Ⓣ	1,500倍 1,000倍	14日－5回 前日－2回
梅	5月上旬	黒星病 カメムシ類	ストロビーDF スタークル顆粒水溶剤	3,000倍 2,000倍	7日－3回 前日－3回
		黒星病	インダーフロアブル	5,000倍	前日－2回
	5月中旬				
キウイ	5月中旬	かいよう病	コサイド3000 バイカルティ(必ず加用)	2,000倍 1,000倍	満開時は 避ける
		果実軟腐病 クワシロカイガラムシ	ダコニール 1000 モスピラン顆粒水溶剤Ⓣ	1,000倍 2,000倍	60日－7回 7日－3回
	5月下旬				
いちじく	5月中旬	疫 病	Zボルドー バイカルティ(必ず加用)	1,000倍 1,000倍	――
		＊敷きワラをして雨水の跳ねを防止する。＊周辺の除草をしてアザミウマ発生を防ぐ			
柿	5月上旬	黒星病・落葉病	ベルコート水和剤	1,500倍	14日－3回
		灰色カビ病・落葉病	ストロビーDF	3,000倍	14日－3回
		アザミウマ類	モスピラン顆粒水溶剤Ⓣ	4,000倍	前日－3回
	5月中下旬				

※カメムシ発生注意報発令中です。園内をよく観察し、今後の発生に注意してください。

柑橘（森・新出）≪青島温州、中晩柑(甘夏)≫ 病虫害防除

5月上中旬	灰色カビ病	スイッチ顆粒水和剤	3,000 倍(青島 7 日-3 回) (中晩柑 45 日-2 回)	混 用 可
	チャノキイロアザミウマ カメムシ類	スタークル顆粒水溶剤	2,000 倍(前日-3回)	
5月下旬	サビダニ チャノキイロアザミウマ	グレーシアフロアブル	4,000 倍(7 日-2 回)	混 用 可
	黒点病	ファンタジスタ顆粒水和剤	3,000 倍(14 日-3 回)	

※カメムシ発生注意報発令中です。園内をよく観察し、今後の発生に注意してください。

有害鳥獣 捕獲実施中 捕獲期間中は、事故がないよう十分注意してください。

長田実施期間:5月31日まで(カラス・ヒヨドリ)6月30日まで(イノシシ・ハクビシン・アナグマ・アライグマ・ニホンジカ・サル)

南部実施期間:6月30日まで(タヌキ・アナグマ) 通年(イノシシ・ハクビシン・アライグマ)

令和6年度 捕獲実績（協議会、猟友会より捕獲報告があったものの合計）

【長田】・イノシシ 65 頭 ・ハクビシン 2 頭 ・シカ 3 頭 ・カラス 2 羽 ・アナグマ 4 頭 ・タヌキ 11 頭

【南部】・イノシシ 4 頭 ・ハクビシン 20 頭 ・アナグマ 1 頭 ・タヌキ 3 頭



いちご（山森・石原）

1. 育苗管理

① I B 化成 S1 号の場合：親株 1 株あたり 10 日で 3 粒もしくは 14 日で 4～5 粒を施用。

② 給 液 管 理 の 場 合：EC0.5～0.6 を目安に給液。（5 月の目安：400ml/株/日）



時 期	薬 剤	RAC	倍率	回数	主な対象病虫害
第 1 週 (27 日～3 日)	セイビアー（フ）	12	1000～1500 倍	1/3	炭そ病、うどんこ病
	カスケード（乳）	15	4,000 倍	1/3	ヨトウ・アザミウマ
第 2 週 (4 日～10 日)	コサイド 3000	M1	1000 倍	-	炭そ病
	エコピタ（液）	-	100 倍	-	うどんこ病・ハダニ・アブラムシ
第 3 週 (11 日～17 日)	ジマンダイセン（水）	M3	600 倍	2/6	炭そ病
	モベント（フ）※散布	23	2,000 倍	1/2	ハダニ・アブラムシ・アザミウマ
第 4 週 (18 日～24 日)	ベルコート（水）	M7	1,000 倍	1/5	炭そ病・うどんこ病
	エコピタ（液）	-	100 倍	-	うどんこ病・ハダニ・アブラムシ
第 5 週 (25 日～31 日)	デラン（フ）	M9	1000 倍	1/2	炭そ病
	アグリメック グレーシア（乳） ^α	6 30	500～1000 倍 2000 倍	1/2 1/2	ハダニ ハダニ・ヨトウ・アブラムシ・アザミウマ

2. 本圃管理

①病虫害防除

病虫害	薬剤名	RAC	倍 率	回数	天敵	蜜蜂
うどんこ病	パレード 20（フ）	7	2,000～4,000 倍	3	なし	1 日
灰色かび病	ファンタジスタ（顆水）	11	2,000～3,000 倍	3	なし	1 日
アザミウマ	ファインセーブ（フ）Ⓣ	34	1,000～2,000 倍	3	なし	1 日
	ベネピア OD	28	2,000 倍	3	なし	1 日
	Ⓣディアナ SC	5	2,500～5,000 倍	2	14 日	7 日
アザミウマ・ハダニ	Ⓣグレーシア（乳）	30	2,000 倍	2	100 日以上	1 日
アブラムシ・コナジラミ	ウララ（DF）	29	2,000 倍	2	なし	1 日
ハダニ	※1 ダニオーテ（フ）	33	2,000 倍	2	なし	1 日
	Ⓣコロマイト（水和）	6	2,000 倍	2	7 日	1 日

Ⓣ 天敵や蜜蜂への影響が長い薬剤になります。ご使用には注意して下さい。

②収穫終了後の管理

- ・アザミウマが外へ出て増えないように、ハウスを閉めきり蒸しこみを行う
- ・高設栽培…収穫終了後2週間ほど水のみ流し、肥料分を吸わせた後処分する。
- ・土耕栽培…被覆資材を外し、雨にあてる。



野菜（石原・深井・望月）

野菜苗の定植時に粒剤を使用すると初期の害虫を抑えられ農薬散布の手間を省くことができます。

その他の適用害虫・登録作物につきましてはお問い合わせください。

農薬名	主な対象害虫	登録作物					
		キュウリ	スイカ	カボチャ	ナス	ピーマン	トマト
スタークル粒剤	アブラムシ・コナジラミ・アザミウマ	○	○	○	○	○	○
オルトラン粒剤	アブラムシ・コナジラミ・アザミウマ	○			○	○	○※
プリロッソ粒剤オメガ	アブラムシ・コナジラミ・アザミウマ	○	○		○	○	○
ダイアジノン粒剤5	ケラ・ネキリムシ・コガネムシ幼虫	○	○	○	○	○	○

※ ミニトマトに登録なし

Ⓣの記載のある農薬は、購入の際に印鑑が必要になります。