



しづはた

令和7年 4月 発行

しづはた購買店だより

静岡市葵区下 1459-1 ☎294-9330 FAX294-1635

購買：山下・谷米		配送：白鳥			
購買・地区担当	昭府地区担当：海野	大河内地区担当：川嶋	梅ヶ島地区担当：望月 達		
北部営農センター（しづはた担当）	茶：折山	蔬菜・苺・水稻：石井	果樹：伊藤	女性部：市川 恵	


人事異動のお知らせ

転出

安本 公美（購買）⇒販売課
市川 肇（地区担当）⇒薫科購買店
望月 星哉（蔬菜）⇒南部総合経済 C

転入

谷米 友穂（購買）⇐南部総合経済 C
海野 文男（地区担当）⇐南部総合経済 C
石井 敦己（蔬菜）⇐北部営農 C 美和地区担当



《茶》1番茶生産

今年は3月の寒さで生育は抑えられ、昨年より2～5日遅く推移をしております。近年は物価高騰の影響により、緑茶の消費量が落ち込んでおり、仕入れが慎重になる茶商もあります。コロナも落ち着いてきており、今後の明るい兆しに期待して、今まで通り、選ばれる荒茶生産をお願い致します。

- ◆摘採 自分の摘採計画よりも2日～3日早い摘採を心掛けましょう
- ポイント①

圃場巡回をし、茶園の生育を確認して摘採計画をしっかりと練る。
- ポイント②

手摘みの際に傷葉、古葉や赤棒等が混入しないよう注意！丁寧な摘採を。
- ポイント③

やぶきたは適期浅刈をし、品種は必ずミル芽摘採に努める。
- ポイント④

茶商の需要に合わせた摘採・製造に努めましょう。

◆防除 農薬散布後は生産履歴の記帳に努めましょう！！

【1茶前】

摘採までの日数を注意する。
赤ダニ多発園⇒ミルベノック乳剤(7日) 1,000倍 又は 劇コテツフロアブル(7日) 2,000倍

【1茶摘採後】

アカダニ・サビダニ・トジムシ・ウンカ・スリップス 劇アグリメック(7日) 1,000倍 単用

【クワシロカイガラムシ】

散布時期の判断がつかない場合は営農センターまで相談ください。

時期	… 5月中下旬～6月上旬	散布量	…10a当たり 1,000ℓ
薬剤	… コルト顆粒水和剤 2,000倍 7日 又は アブロードエースフロアブル 1,000倍 14日		

- ◆施肥 灌水施設がある茶園では、しっかり灌水しましょう！！肥料の効果UP
- ・1茶芽出肥2回目

1茶摘採20日前

化成又は硫安 3袋／10a
- ・2茶肥

2茶摘採30日前

化成 4袋／10a
- ◆整枝
- ・時期 → 摘採後、7～10日遅れ芽が出し切った頃（ミル芽摘採した茶園は約14日）

・深さ → 1茶摘採面、遅れ芽を除く程度に浅く摘採面を整える。

しづはた 地区				大河内 地区	
茶摘み料金（時間当たり）		賃揉み料金（生葉 1kg 当たり）		1番茶・加工料金（荒茶 1kg 当たり）	
手摘み	1,000 円	1 茶本茶	250 円	5,000 円以上	1,400 円
手鋏刈り	1,100 円	1 茶番茶	120 円	2,000 円～4,999 円	1,200 円
動力刈り	1,300 円	2 茶本茶	160 円	1,999 円以下	1,100 円

荒茶共販出荷者の方へ

☆農協共販では荒茶出荷時前までに生産履歴の提出が必要です

施肥・防除管理終了後、ただちに作業記録用紙に記帳し、最寄りの農協までご提出ください。

提出期限

最終防除終了後早めに提出ください。※ 製造記録用紙は荒茶出荷時に提出をお願いします。

提出先

しづはた購買店・大河内事務所(ポスト)・梅ヶ島事務所(ポスト)

※ 共同工場は組織ごとに栽培日誌の取りまとめをお願いします。



茶改植等補助金 2次申請のお知らせ（予定）

注）2次申請の公募がない場合もあります。

例年、茶改植や台切り、茶からの転換に対する補助事業が5月末にあります。

募集期間が非常に短いため、公募前ですが下記の予定がある方は、農協へご相談ください。

【対象】

・改植 ・新植 ・台切り（地上15cm以下のみ） ・茶園を伐根して他作物に転換
・有機栽培への転換（転換中の茶園はNG）

【締切】

5月17日（金）まで ※ 事前着工、放任園は対象外となります

静岡市の茶・補助事業紹介（抜粋）

①茶加工施設機械整備事業	対象	荒茶加工施設等で使用する機械の導入	補助率	5割（個人上限150万円） （法人上限500万円）
②茶園改良整備事業	対象	茶園平坦化、園内道整備、防霜ファン整備	補助率	5割(上限30万／反)他
③茶園管理資材導入事業	対象	乗用型摘採機、バックホウ、被覆資材導入	補助率	5割(上限500万／個人)

◆ 各補助事業に要綱があり、補助対象とならない場合がありますので、まずは農協へご相談ください。

茶防除暦の配布について

茶防除ポスターにつきまして、必要な方は『しづはた購買店』でお渡しいたします。
お手数ですが、ご来店の際お受け取り下さい。恐縮ですがご了承お願い致します。

防除ファン 配線の盗難発生について

4月に入り新茶時期の近づく中で防霜ファン配線の盗難事件が起きました。生産者の皆様におかれましては、自身の圃場並びに農業機械の確認を実施して下さい。また、不審者を見た際は、速やかに最寄りの警察にご相談下さい。

駿府本山 秋のお茶まつり参加者募集について

毎年11月に「駿府本山秋のお茶まつり」を開催しており、昨年より静岡歴史博物館の前にて販売会を行っています。
自身のお茶を販売したい方は、是非、ご参加下さい。
参加条件：駿府本山お茶まつり委員会事業に参加・協力頂ける方、井川お茶蔵に保管し「熟成本山茶」を作る方です。
申込者が多い場合は、委員会で抽選させていただきますのでご理解ください。
詳しい内容の問合せは、J A 静岡市本店 担当深井（054-288-8440）までご連絡下さい。

いちご

《本圃》灰色カビ病・アザミウマの発生が非常に増えています。
灰色カビ病はハウス内湿度を極力下げよう努めて下さい。アザミウマは地中に蛹が潜伏する生態のため、残効が長い薬剤を連続散布（3～5 日間隔）することが重要です。
天敵での防除が困難になってきている圃場は薬剤防除体系へ切り替えることも必要です。また、被害果及び被害花は早めに除去し、圃場外へ早急に持ち出しましょう。

お勧め農薬 下記表における天敵への影響はミヤコ・チリに対するものです。

病害虫	薬剤名	RAC	倍 率	回数	天敵	蜜蜂
うどんこ病	パレード 20（フ）	7	2,000～4,000 倍	3	なし	1 日
灰色カビ病	ファンタジスタ（顆水）	11	2,000～3,000 倍	3	なし	1 日
アザミウマ	ファインセーブ（フ）劇	34	1,000～2,000 倍	3	なし	1 日
	ベネビア OD	28	2,000 倍	3	なし	1 日
	選 効ディアナ SC	5	2,500～5,000 倍	2	14 日	7 日
アザミウマ・ハダニ	選 グレーシア（乳）	30	2,000 倍	2	100 日以上	1 日
アブラムシ・コナジラミ	ウララ（DF）	29	2,000 倍	2	なし	1 日
ハダニ	※1 ダニオーテ（フ）	33	2,000 倍	2	なし	1 日
	選 コロマイト（水和）	6	2,000 倍	2	7 日	1 日

※1 ダニオーテ（フ）は銅剤との混用、近接散布は薬剤の効果を著しく低下させます。
14 日以上はあけるようにして下さい。
選 天敵や蜜蜂への影響が長い薬剤になります。ご使用には注意して下さい。

《育苗》 育苗スケジュールを立て、今後の予定を明確にしながら作業しましょう。

- （1）親株栽培 「ランナーの発生を促す要因は温度、水、栄養が大事です。」
温度管理 ： 25℃程度（ハウス内気温）
※夏場の高温期でも 35℃以上にならないよう遮光、遮熱をしましょう。
湿度管理 ： 過湿、過乾燥に注意
※ハウス内の排水対策と過乾燥時は適宜ハウス内への散水をしましょう。
肥料濃度 ： 硝酸イオン濃度を測定して、体内窒素濃度をこまめに確認しましょう。
メルコクアント試験紙で 500ppm 以上を推移しましょう。
- （2）親株肥料管理
① I B化成 S 1 号の場合：親株 1 株あたり 10 日で 3 粒もしくは 14 日で 4～5 粒を施用。
② 給 液 管 理 の 場 合：ECO.5～0.6 を目安に給液。（5 月の目安：400ml/株/日）
→灌水不足はランナー発生の減少に繋がります。培地が乾かない様適時灌水して下さい
→過湿には注意して、プランター及び圃場内の排水対策を行いましょう。

☆育苗圃防除ローテーション☆

5 月	時 期	薬 剤	RAC	倍率	回数	主な対象病害虫
	第 1 週 (27 日～3 日)	セイビアー（フ）	12	1,000～1,500 倍	1/3	炭そ病
		カスケード（乳）	15	4,000 倍	1/3	ヨトウ・アザミウマ
	第 2 週 (4 日～10 日)	コサイド 3000	M1	1,000 倍	-	炭そ病
		エコピタ（液）	-	100 倍	-	うどんこ病・ハダニ・アブラムシ
	第 3 週 (11 日～17 日)	ジマンダイセン（水）	M3	600 倍	2/6	炭そ病
		モベント（フ）※散布	23	2,000 倍	1/2	ハダニ・アブラムシ・アザミウマ
	第 4 週 (18 日～24 日)	ベルコート（水）	M7	1,000 倍	1/5	炭そ病・うどんこ病
		エコピタ（液）	-	100 倍	-	うどんこ病・ハダニ・アブラムシ
	第 5 週 (25 日～31 日)	デラン（フ）劇	M9	1,000 倍	1/2	炭そ病
		アグリメック 劇	6	500～1,000 倍	1/2	ハダニ
		グレーシア（乳）選択	30	2,000 倍	1/2	ハダニ・ヨトウ・アザミウマ

水稻

種子消毒（10a あたり種もみ 4kg を用意） 水 10L あたりの使用量

塩水選	購入した種もみも必ず実施すること			
水洗い	沈んだ種もみを十分水洗いする			
袋詰め	目の粗い袋に、7 割程度詰める			
薬剤浸漬	まず、薬液中で袋をよくゆすり薬を隅々まで行渡らせてから 24 時間浸漬する			

ばか苗病 もみ枯細菌病	テクリード C(フ)	200 倍	100ml/水 20L
シンガレセンチュウ	スミチオン(乳)	1,000 倍	20ml/水 20L

（薬液 20L で、種もみ 10kg 分まで処理が可能）

水中浸漬 薬剤浸漬後は水洗いせず、種もみの 2 倍量の清水にゆっくり浸漬する
水が腐らないように日陰に 3～4 日間静置する。この間に攪拌しないこと。

芽出し 発芽を揃えるため、28～29℃の温水で加温し 1mm 程度芽だしする。
もみ枯れ細菌病を防ぐために 30 度以上にしない。



ハトムネ状態

もみ枯細菌病対策 もみ枯細菌病は多発すると苗が全滅する恐れがあります。昨年発生した方や発生が懸念される場合は、下記の対策を行って下さい。

- ◆育苗箱・シルバーポリトウ等の資材を『イチバン液 1,000 倍』で浸漬し消毒する。
- ◆『ツインターボ箱粒剤』を覆土前に処理すると、もみ枯細菌病を含む病害虫を 7 月末まで抑制
- ◆発芽時の温度は 30℃以上にしない。

育苗培土

- ① 育苗期間 20 日で草丈 10～15cm、本葉 2～2.5 枚を目標
- ② 育苗には水道水などのきれいな水を使うこと

育苗箱の消毒	イチバン 1,000 倍	瞬間浸漬・またはジョロ散布
培土	宇部培土	4 袋／10a 1 袋で 6 箱分
	粒状ばーるまっと 3 号	3 袋／10a 1 袋で 7 箱分

◆ 野生鳥獣被害防除事業補助金申請について（静岡市補助事業）

野生鳥獣の農業被害を防ぐための設備（電気柵や獣害用ネット等）の購入に対して下記のとおり助成します。

補 助 率 オクシズ（門屋以北）の場合 9 割（上限 10 万）、
オクシズでないの場合 5 割（上限 10 万）

受付開始日 予定：5 月 7 日(水)～予算満額まで

受 付 先 静岡市中山間地振興課 （054-294-8807）

補助事業を利用したい組合員は最初に『市役所 中山間地振興課』へ直接電話をお願いします。

※「団体申請」のメニュー（補助率 9 割）もあります。詳細は、農協または中山間地振興課へ相談ください。

農薬購入時には印鑑を！ 毒劇物に指定されている農薬は(劇)と表記してあります。購入の際には必ず印鑑（認印）をご持参ください。

《柑橘》

柑橘類の生育は天候に左右されやすいので、生育ステージを見極め適期防除を行って下さい。
本年度の青島温州の開花始めは、今後の気温にもよりますが連休中と予想されます。

●防除管理

温州みかん

県病害虫防除所から

「果樹カメムシの発生注意報」

が発表されました。

防 除 時 期	対 象 病 害 虫	農 薬 名	希釈倍数	使 用 基 準
3 分咲き期	ア ザ ミ ウ マ 類	ス タ ー ク ル 顆 粒 水 溶 剤	2,000 倍	前日－3 回
	訪 花 昆 虫	ス イ ッ チ 顆 粒 水 和 剤	3,000 倍	7 日－3 回
落 弁 期	アザミウマ類・サビダニ	グ レ ー シ ア フ ロ ア ブ ル	4,000 倍	7 日－2 回
	黒 点 病 ・ そ う か 病	フ ァ ン タ ジ ス タ 顆 粒 水 和 剤	3,000 倍	14 日－3 回

※他作物と隣接している圃場並び昨年、そうか病が発生した圃場は、スイッチ顆粒水和剤に変え
フロンサイドSC2,000倍 30日－1回 を使用する。

※花と芽の競合を避ける為、3 分咲き防除時に尿素500倍とリンクエース 1,000 倍を混用散布。
落弁期防除時に尿素500倍と結晶粒マグ500倍を混用散布することにより、新葉緑化と着果安定が高まる。

※着花量が非常に多い場合には、ダブルクイック S 550を1 袋／10a施用。芽と花の競合を助け、着果量の確保を図りましょう。

中 晩 柑

防 除 時 期	対 象 病 害 虫	農 薬 名	希釈倍数	使 用 基 準
満 開 期	ア ザ ミ ウ マ 類	ス タ ー ク ル 顆 粒 水 溶 剤	2,000 倍	前日－3 回
	訪 花 昆 虫	ス イ ッ チ 顆 粒 水 和 剤	3,000 倍	45 日－2 回
5 月中下旬	アザミウマ類・サビダニ	グ レ ー シ ア フ ロ ア ブ ル	4,000 倍	7 日－2 回
	黒 点 病 ・ そ う か 病	フ ァ ン タ ジ ス タ 顆 粒 水 和 剤	3,000 倍	14 日－3 回

《落葉果樹》

対 象 作 物 防 除 時 期	対 象 病 害 虫	農 薬 名	希 釈 倍 数	使 用 基 準
いちじく 5月上旬	疫 病	Z ボ ル ド ー 加用 ク レ フ ノ ン	1,000 倍 200 倍	—
柿 5月中下旬	チャノキイロアザミウマ 落葉・灰色カビ・うどんこ病	劇コ テ ッ フ ロ ア ブ ル ス ト ロ ビ ー D F	2,000 倍 3,000 倍	14 日－2 回 14 日－3 回
梅 5月上中旬	カ メ ム シ 類 黒 星 病	ス タ ー ク ル 顆 粒 水 溶 剤 ス ト ロ ビ ー D F	2,000 倍 3,000 倍	前日－3 回 7 日－3 回
梨 5月中旬	黒 星 病 ・ 輪 紋 病 シンクイ類・カメムシ類	ベ ル ク ー ト 水 和 剤 ア ク タ ラ 顆 粒 水 溶 剤	1,500 倍 3,000 倍	14 日－5 回 前日－3 回
ぶ どう 開 花 期	灰色カビ・黒とう病 う どん こ 病	ロ ブ ラ ー ル 水 和 剤 インダーフロアブル	1,000 倍 8,000 倍	60 日－3 回 30 日－3 回

※生育状況を確認し、防除適期を逃さないようにして下さい。

※梅のや二果・そぶ果（ホウ素欠乏）の発生する園では、防除時にヨーヒB5 1,000 倍の混用散布をお勧めします。また、フィールドアップ（土壌改良剤）4 袋／10a も効果があります。

越冬成虫が昨年や過去のデータと比較して「かなり多い」状況にあります。これは、昨年に発生した成虫数が多いことや気温高により世代交代が遅くまで続いたこと、越冬した成虫も多いことによるものと考えられます。

カメムシは、仲間を呼び寄せると言われています。園内でカメムシが見受けられたら、早急に防除を行って下さい。

※使用農薬については、しづはた支店購買店までお問合せ下さい！