

南部営農だより 6月の防除 長田地区版

南部総合経済センター 電話：237-5580 Fax：237-5155
 長田営農出張所 電話：259-3233 Fax：258-2867

★年金感謝 DAY★
6/13(金)・6/16(月)
 ～お茶詰め放題～ 1袋 ¥1,000
 長田支店 下川原支店 旧丸子支店

高田農具展示会

修理も受け付けています

★6/6(金)8:30～12:30 長田支店前
 ★6/2(月)9:00～13:00 大谷支店前
 ★6/25(水)9:00～13:00 南部総合経済センター前

女性部お知らせ

◇ 6/5(木) JA 静岡市女性部 大阪万博見学
 ◇ 6/13(金) 朝市加エグループ代表者会議
 (本店 14:00～)

JA 農業機械大展示会

日時：6月27日(金)28日(土)9:00～15:00
 会場：ツインメッセ静岡 北館(静岡市駿河区曲金3丁目1-10)
 内容：農業機械・農業資材の展示・中古(特価)農業機械コーナー

★入場無料★
 ご来場者に
 記念品進呈

土壌分析実施のお知らせ

※本年度は分析料の半額助成はありません

- 申込締切：6月6日(金) 分析料 1,330 円(税込)/検体・・・後日通帳より引落します
- 申込方法：風乾し篩掛けした土400g程を紙袋に入れ、住所・氏名・作物名・施設か否かを明記
 ※ 詳しい土壌の採取方法は、肥料年特説明書 P20 をご参照ください
- 提出先：南部総合経済センターまたは長田営農出張所

令和7年度 第1回狩猟免許試験(農)のお知らせ

・免許取得希望の方は 南部総合経済センター237-5580 までお問合せ下さい！

《事前講習会》

日程：令和7年8月9日(土)
 会場：静岡県教育会館 定員200名
 申込：6月16日～7月18日

《わな猟試験》

日程：令和7年8月24日(日)
 会場：静岡県総合庁舎有明町
 申込：6月16日～7月16日迄

私有地内でも
 許可なく有害鳥獣
 の捕獲駆除はでき
 ませんのでご注意
 ください。免許と
 捕獲許可が必要で
 す。

令和7年度 野生鳥獣害防除資材(電気柵等)補助制度の受付開始

市へ直接電話し申請書の入手と補助金の予約をしてください ☎294-8807 市中山間地振興課

野菜 (石原・深井・望月) 梅雨の時期は病気が発生しやすいので、雨の合間に予防防除を！
 トマト・ミニトマト

葉かび病・灰色かび病	ファンタジスタ顆粒水和剤	2,000～3,000 倍	前日 - 3 回
アザミウマ類・コナジラミ類	ディアナ S C	2,500 倍	前日 - 2 回

☆尻腐れ予防…カルクロン 200 倍 各花房の第1花が開花したときに散布する

☆着果促進 …トマトトーン 100 倍 花房の3～5花が開花した時に1花房に1回散布する
 芽や幼葉にかかると葉が萎縮するので、花・花房のみにかかるよう噴霧する

きゅうり

べと病・褐斑病(予防)	ジマンダイセン水和剤	600 倍	前日 - 3 回
アザミウマ類・コナジラミ類	ディアナ S C	2,500 倍	前日 - 2 回

水稻 (石原・深井・望月)

1. 田植期の防除

基本コース	ブーンレパード箱粒剤	50 g /箱	田植 3 日前～田植当日
低コスト	ツインターボ箱粒剤 0 8		播種時～田植当日

※ 効果低減を防ぐため、散布ムラにならないように注意しましょう

※ 箱剤は田植え前日～3日前に施用すると効果が高いです

2. 田植機の調整

- (1) 植付株数：70 株/坪 にこまる：70 株/坪 (高温障害の回避の場合 80 株/坪)
- (2) 植付本数：3～4 本/株 (早く分けつし、太い茎をつくる)
- (3) 植付深さ：2～3cm (浅植えにし早期の活着や茎数の確保を促す)

3. 水の管理

- (1) 田植後～活着：水深 4～6cm 程度の深水とし、活着を促す
 ※ジャンボタニシの食害が危惧される場合は浅水(4 cm以下)管理とする
- (2) 活着後：水深 2～4cm 程度の浅水とする
- (3) 田植 2～3 週間後にガス抜きをする場合は、1～2 日間落水する

4. スクミリングガイ(ジャンボタニシ)

- (1) 水路の貝が取水口から侵入するので、取水口に網を張る
- (2) 例年発生が多い水田は次の薬剤を発生初期に施用する

スクミリングガイ	スクミノン	1～4kg/10a	収穫 60 日前-2 回
----------	-------	-----------	--------------

除草剤 体系処理の場合

田植前	サキドリ E W	500ml/10 a	① 代掻き時(田植えまで 7 日間空ける) ② 田植直後 ①、②いずれか 1 回
田植後	ラオウ 1 キロ粒剤	1 kg/10 a	移植後 30 日まで ノビエ 2.5 葉まで
	カイリキ Z ジャンボ	300 g/10 a	移植後 3 日～30 日まで ノビエ 3 葉期まで

毎年被害が多いので、
ご注意ください

注意

いちご (石原・山森)

1. 親株の管理

- ① 弱いランナー・側枝は早期に除去し充実した太いランナーを誘引する
- ② 肥切れしないよう適時追肥をする(1 B 化成 4～5 粒/株を 2 週間間隔)

2. 病虫害防除 育苗炭そ病防除ローテーション(例)

	薬剤名	倍率	回数	混用薬剤 例
6 月 1 週目	ジマンダイセン(水)	600 倍	6	プレオフロアブル
6 月 2 週目	サンヨール	500 倍	6	エコピタ(液)
6 月 3 週目	オーソサイド(水)	800 倍	5	ニッソラン(水)
6 月 4 週目	デラン(フ) ㊞	1,000 倍	2	エコピタ(液)
6 月 5 週目	ベルコート(水)	1,000 倍	5	コテツフロアブル ㊞

※発生病虫害を観察し農薬を選択してください。農薬は葉裏、株元にしっかりとかかるように!!

3. 高温対策

- ①風通し⇒ ハウスをあげ、妻面のビニールを除去、循環扇を回す
- ②温度を下げる⇒(1)遮光資材(寒冷紗・塗布剤)を使用する
 (2)気化熱を利用した育苗資材(紙ポット等)で根痛みを防ぐ

スリムホワイト 4 5 (遮光ネット)	光反射率が高く、サイド等に外張りをする事でスリップスの侵入を防ぎ、またハウス天面等に使用することでハウス内温度を下げる資材
レディーヒート (吹付色遮熱剤)	光合成に有効な光(PAR)は通し、熱線(IR)を遮る効果。 ハウスに吹き付ける遮光剤で温度を3～4度下げ、効果は3～5ヵ月維持

㊞の記載のある農薬は、購入の際に印鑑が必要になります。

茶（森・岩田）

二茶萌芽期	炭疽病・もち病	スコア顆粒水和剤	2,000 倍	7 日	混 用 可
	ウンカ・スリップス	ウララ DF	1,500 倍		
二茶整枝後	ハマキムシ類	ディアナ SC	5,000 倍	前日	

※ 輪斑病の予想される園地では、アミスター20フロアブル 2,000 倍（14 日）を散布する。

【 2 茶を収穫しない茶園のナラシ 】

時期：6 月中下旬（2 茶芽が出揃った頃） 位置：昨年の秋ナラシ位置～1 茶摘採面の間

【 茶園の更新 】

1 番茶の芽の不揃い、生育ムラ、生育不良、細枝化の改善が期待できます

時期：1 番茶後できるだけ早めに 位置：樹勢に応じて浅刈り、深刈り、中切り

【2 茶肥】

時期：1 番茶摘採後 10～15 日（摘採 30 日前）

施肥量：化成肥料 3 袋/10 a（施肥後は中耕する）

※2 番茶を摘採しない圃場でも樹勢回復の為、施肥を行う



かんきつ（新出）

☆青島温州

6 月上中旬	ミカンハダニ	マシン油乳剤（97%）	150 倍	—	混 用 可
	カイガラムシ類 チャノキイロアザミウマ	エクシレル S E または スタークル顆粒水溶剤	5,000 倍 2,000 倍	前日-3 回 前日-3 回	
	黒点病	ペンコゼブ水和剤	600 倍	30 日-4 回	

※施肥：夏肥は満開から 6 月 20 日までに、
（青島）粒状固形 080 6 袋/10a 又は みかん化成 1 号 6 袋/10a
（早生）みかん化成 1 号 4 袋/10a

☆スルガエレガント・中晩柑

6 月上旬	カイヨウ病	I C ボルドー412	50 倍	—
-------	-------	-------------	------	---

※ IC ボルドー412 に関しては取り寄せになります

6 月中旬	ミカンハダニ	マシン油乳剤（97%）	150 倍	—	混 用 可
	チャノキイロアザミウマ	エクシレル S E または スタークル顆粒水溶剤	5,000 倍 2,000 倍	前日-3 回 前日-3 回	
	黒点病	ペンコゼブ水和剤	600 倍	90 日-4 回	

※施肥：夏肥は 6 月上旬に （ス ル ガ） スルガペレット 8 袋/10a
（ポンカン）みかん 50 ペレット 6 袋/10a

※ペンコゼブ水和剤に代えてジマンダイセン水和剤 600～800 倍（90 日-4 回）も可能

NEW! 熱中症対策水 3,100 円(税込)

季節限定商品です

日向夏1ケース(500ml×24 本入り)

乾いたカラダに水分・塩分チャージ！
日向夏味でスッキリ美味しい！



青色専従者の源泉手続き

上期源泉の納期は 7 月 10 日迄です
JA の相談会を利用される方
7 月 3 日（木）10:00

長田支店 2F

4 日（金）10:00

下川原支店 2F

南部総合経済センターだより 令和 7 年 5 月 20 日発行

落葉果樹（担当：森）

※カメムシ注意報発令中です。今後の発生増に注意してください

作物	使用時期	病 害 虫	薬 剤 名	使用倍 数	使用基準
桃	6 月（収穫前） 混用可	黒 星 病 ・ 灰 星 病 シンクイムシ	ベルコート水和剤 フェニックス顆粒水和剤	2,000 倍 4,000 倍	前日－3 回 前日－2 回
	※ 除袋又は収穫前には必ず上記殺菌剤を散布する ※収穫時期のため、使用基準を厳守する				
梨	6 月上旬	輪紋病 ・ 黒星病 ・ うどんこ病	ナリアWDG	2,000 倍	前日－3 回
	※5 月下旬～6 月上旬に仕上げ摘果を終了し、薬剤散布をして袋掛けを行う				
	6 月中旬	ハ ダ ニ 類	コロマイト水和剤	2,000 倍	前日－1 回
	6 月下旬	シンクイムシ類 クワコナカイガラムシ	バリアード顆粒水和剤 ㊦	4,000 倍	前日－3 回
キウイ	6 月上旬	果 実 軟 腐 病 キイロマイコガ・ウンカ	ダコニール 1000 アグロスリン乳剤 ㊦	1,000 倍 2,000 倍	60 日－7 回 7 日－3 回
	6 月中旬	果 実 軟 腐 病	ベルコート水和剤	1,000 倍	前日－5 回
	6 月下旬	果 実 軟 腐 病	ベンレート水和剤	2,000 倍	7 日－5 回
	6 月上旬	疫 病	Z ボルドー1,000 倍 + バイカルティ 1,000 倍混用		
イチジク	6 月上中旬	アザミウマ類	ダントツ水溶剤	2,000 倍	3 日－3 回
	（アザミウマ類には光反射シート、粘着トラップの設置も有効）				
	6 月下旬	ハダニ（発生時）	ダニサラバフロアブル	2,000 倍	前日－2 回
	6 月下旬	疫 病	Z ボルドー1,000 倍 + バイカルティ 1,000 倍混用		
柿	6 月上旬	うどんこ病・落葉病	オンリーワンフロアブル	2,000 倍	前日－3 日
	6 月上旬	フジコナカイガラムシ	モスピラン顆粒水溶剤 ㊦	2,000 倍	前日－3 回
	6 月中旬	落葉病、疑似炭疽病	ベンレート水和剤	2,000 倍	前日－6 回
	6 月中旬	柿ハダニガ、カメムシ チャノキイロアザミウマ	アクタラ顆粒水溶剤	2,000 倍	3 日－3 回
	6 月下旬	落葉病・うどんこ病	ベルコート水和剤	1,500 倍	14 日－3 回

※果樹類は殺菌剤の効果を持続させる耐雨性展着剤 アピオンE（1,000 倍）を使用しましょう！

補助金の紹介

静岡市/JA 静岡市

- ・いきいき都市農業推進事業（4 月訪問日配布資料参照）
市街化区域で生産活動を行う農業者（前年売上 50 万円以上）が導入する
施設や農機具等 補助率：1/3～1/2 上限 30 万円
市民農園の整備または付帯設備等 補助率：1/2 上限 50 万円
- ・多様な担い手育成支援事業（4 月訪問日配布資料参照）
市街化区域を除いた農地で生産活動を行う農業者（前年売上 50 万円以上）が導入する
施設農機具等 補助率：1/3（上限 30 万円）
- ・野生鳥獣害防除資材支援（電気柵他）（5 月訪問日配布資料参照）
市内で生産活動を行う農業者が導入する有害鳥獣対策資材（電気柵・フェンス等）
補助率：1/2 JA 静岡市の上乗せ支援を加え上限 70%7 万円

㊦の記載のある農薬は、購入の際に印鑑が必要になります。