

購買：山下・谷米		配送：白鳥			
購買・地区担当	昭府地区担当：海野	大河内地区担当：川嶋	梅ヶ島地区担当：望月 達		
北部営農センター（しづはた担当）	茶：折山	蔬菜・苺・水稻：石井	果樹：伊藤	女性部：市川 恵	

≪ お茶 ≫

- ◎ 今年は昨年より5日程度遅く、平年より2日程度遅い茶期となりました。
- ◎ 今年は、例年より反収が少ない状況となりました。また、連続降雨や急激な気温上昇がなく、生産後半でも荒茶品質は安定しています。
- ◎ 来年1番茶の品質・収量は、今後の管理が重要となります。来年に向けて備えましょう。

茶栽培のポイント2点に意識してください。

☆更新作業を行い、力強い芽重型の内容が濃い生葉生産に努める。

☆母枝肥・秋肥をしっかりと施肥する。1番茶の味・香りに大きく影響します。

【1番茶後 整 枝】

2番茶を摘採する茶園

時 期 遅れ芽がほぼ出揃った頃 1番茶摘採から10日～14日

整枝位置 1番茶摘採面を揃える程度にごく浅く
1番茶が伸びて、浅く摘採した園は一葉（一節）残した位置で整枝

2番茶を摘採しない茶園

翌年の1番茶の芽が不揃いになる可能性がありますので、母枝の太さと芽数の均一化を図る為に1番茶後に通常の整枝を行って下さい。

1回目整枝 （2茶前の整枝と同じように行ってください）
時 期 1番茶終了後 （通常の2茶前の整枝と同じ頃）

整枝位置 1番茶摘採位置（通常の2茶前の整枝と同じ位置）

2回目整枝
時 期 6月中下旬 2番茶が充実して葉色が濃くなった頃

整枝位置 平 地…昨年の秋整枝位置から一番茶摘採面の間で、やや深めに行う。
山間地…葉層を10cm確保する為に2茶摘採の様に2茶を一節残す。

【2番茶 摘 採】

1番茶摘採から42～43日後を目安に摘採ください。
※梅雨時期と被るので、天気予報を確認して早めの摘採計画を立ててください。

【更 新】 来年に向けて力強い芽を作ろう

枝が細く小葉や葉層が薄く樹勢が弱い茶園については、1番茶摘採後ただちに更新を行って下さい。深さを決めるには、枝の構成（枝の太さ、本数）をよく観察し、樹勢にあった更新（浅刈り、深刈り、中切り）をして下さい。

【施 肥】

2茶肥 2茶摘採30日前 化成肥料 3～4袋／10a当たり
母枝肥 2茶摘採後の時期 化成肥料 3～4袋／10a当たり

【防 除】

1番茶整枝後

カンザワハダニ	}	劇	アグリメック	1,000倍	7日
チャノナガサビダニ					
ウンカ・スリップス					
チャノコカクモンハマキ					

クワシロカイガラムシ 被害がある場合は、6月最上旬までに防除

温暖化で孵化が早まっています。防除は、しっかりと幹・枝まで届く様に散布をお願いします。

アプロードエースF 1,000倍・14日 単用 又は コルト顆粒水和剤 2,000倍・7日 単用

- ◎ふ化幼虫期の判定は、枝を持参いただければ、しづはた営農経済センターで行うことができます。
- ◎2番茶の摘採時期と防除時期が接近していますので、使用基準を守って防除して下さい。

2番茶萌芽期 ～ 1葉期

炭そ病・もち病 スコア顆粒水和剤 2,000倍
ウンカ・スリップス ウララDF 1,500倍

※降雨が続くと「もち病」の発生が予想されるので、防除を徹底して下さい。

◎カンザワハダニ発生園は、劇 コテツフロアブル 2,000倍 7日
（※ウンカ・スリップス・サビダニ同時防除）

◎ツマグロアオカスミカメ発生が予測される園は、
スタークル顆粒水溶剤 2,000倍 7日



≪お知らせ≫

茶業における補完作物転換事業のご紹介【 締切り：6月18日（水）まで 】

補助対象： 荒れていない茶園を伐根して、他の作物を植える場合（2a以上）
補 助 額： 単年性作物（野菜等） 4,100円/a 永年性作物（果樹等） 7,600円/a

※既に着工している場合は、対象外です。

※申請する場合は、必ず、現況写真を農協へ提出下さい。

その他要件があり、補助対象とならない場合がありますので、まずは農協へご相談ください。

「令和7年度 JA静岡市農業振興のための支援策」について

今月の訪問日にて「令和7年度JA静岡市農業振興のための支援策」を配布しますので、ご一読ください。
なお、今年度当初の部農会長会議で一度説明させていただきましたが、その後、予算枠の拡充・要件の緩和を行いました。
今回の配布資料を最新版とさせていただきますので、ご了承下さい。



いちご

＜育苗＞ランナー受け開始の時期です。炭そ病予防を重点に行いましょう。

(ア) 親株管理

- ① I B化成S1号の場合：親株 1 株あたり 10 日で 3 粒もしくは 14 日で 4～5 粒を施用。
- ② 給液管理の場合：EC0.5～0.6 を目安に給液。（6 月の目安：500～1,000m l /株/日）
→灌水不足はランナー発生の減少に繋がります。培地が乾かない様に適時灌水して下さい。
→培土や灌水チューブの種類によって灌水量や頻度が異なります。
→過湿には注意して、プランターや圃場内の排水対策を行いましょう。

(イ) 炭そ病対策 ～出さない、広げないを徹底しましょう～

- ① 作業開始前に怪しい株の除去をしましょう。（拡大させない！！）
→炭疽病と思われる株を触った際は必ず、手袋等を交換し鉢などの道具も再度消毒する。
→農薬散布により胞子は 500 cm以上飛散
→頭上灌水により胞子は 120 cm程度飛散
- ② 出さない環境づくり
・葉が濡れている時間が長いほど病気になりやすい為、循環扇や扇風機を活用し乾きを促す。
・資材は必ずイチバン（500～1,000 倍、瞬時浸漬）等で消毒したものを用いる。
※葉かきに使用するハサミなどの作業道具も消毒しましょう。
・ランナーが過密とならないよう親株の古葉やわき芽の整理し、ランナーの側枝は除去する。
- ③ 親株・子株ともに点滴チューブを利用した灌水を推奨します。
→灌水チューブから出る熱水対策として自動排水弁（チェックバルブ等）や白色チューブの利用をお勧めします。
→水はね防止、葉をできるだけ濡らさないように意識しましょう。
- ④ 傷口のできる作業を行った際は消毒を実施して傷口からの侵入を防ぎましょう。
→コサイド 3000 等使用回数制限のない薬剤を使いましょう。
- ⑤ 薬剤散布は予防主体として（M1、M3、M4、12）ローテーション防除を行いましょう。
- ⑥ 子株側から親株側へ散布することで子株への感染拡大リスクを抑えましょう。

育苗圃病害虫防除ローテーション（先月号の続きです）

時 期		薬 剤	RAC	倍率	主な対象病害虫
6月	第 1 週 (1 日～7 日)	アントラコール（顆水）	M3	500 倍	炭そ病
		エコピタ（液）	—	100 倍	うどんこ・ハダニ・アブラムシ
	第 2 週 (8 日～14 日)	キノンドー（フ）	M1	500~800 倍	炭そ病
		プレオ（フ）	UN	1,000 倍	ヨトウ
	第 3 週 (15 日～21 日)	オーソサイド（水）	M4	800 倍	炭そ病
		エコピタ（液）	—	100 倍	うどんこ・ハダニ・アブラムシ
	第 4 週 (22 日～28 日)	ジマンダイセン（水）	M3	600 倍	炭そ病
		コテツ（フ）	13	2,000 倍	ハダニ・ヨトウ・アザミウマ

- ★今年も暑い夏になることが予想されます！！
高温対策でハウス内を「いちごと生産者の双方が過ごしやすい」好適な環境にしましょう！
- ・風通しを良くする ⇒ ハウスをあける、妻面のビニールを除去する、扇風機を回す
 - ・温度を下げる ⇒ ①遮光資材（寒冷紗・塗布剤）を使用する
②気化熱を利用した育苗資材（紙ポット等）で根傷みを防ぐ

水稻

●元肥の施用（10a）

元肥は田植え予定日の 1 週間以内に施用すること



品種 コース	ひとめぼれ キヌヒカリ	コシヒカリ	きぬむすめ ヒノヒカリ	あいちのかおり にこまる、葵美人
化成	マップ 202			
	2 袋	1.5 袋	2 袋	2 袋
省力	ジェイコシ 18 号	ジェイコシ 18 号	ナイスワンパワー	にこ・モチー発 244
	2.5 袋	2 袋	2.5 袋	2 袋

●田植時育苗箱処理

- ① 箱粒剤 普通期田植えで 7 月末頃まで防除不要

基本	ブーンレパード箱粒剤	50 g /箱	播種時～移植当日
低コスト	ツインターボ箱粒剤 08		播種時～移植当日
ウンカ防除重視	フルスロットル箱粒剤		播種時～移植当日
カメムシ防除重視	ゴウケツバスター箱粒剤		移植 3 日前～移植当日

- ② 除草剤（10a） 水もちの悪い圃場では体系処理（初期剤→1 ㍑粉剤→中後期剤）とする。

エンペラー 1 キロ粒剤	1 k g	移植直後～ノビエ 3 葉期 但し収穫 60 日前まで
ラオウ 1 キロ粒剤	1 k g	移植直後～ノビエ 2.5 葉期 但し移植後 30 日まで

- I 水の管理 田植後～活着 水深 4～6cm 程度の深水とし、活着を促す。
- II 活着後 水深 2～4cm 程度の浅水とする。ガス抜きする場合、1～2 日間落水する。

●スクミリンゴガイ（ジャンボタニシ）の防除

スクミノン	1～4kg/1 0a	移植後 但し、収穫 60 日前まで — 2 回
-------	------------	-------------------------

水稻除草剤「カイリキZジャンボ」について

水稻栽培履歴（ポスター）に記載しています「カイリキZジャンボ」について、
使用量に誤りがありました。大変ご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。
なお、10 ㍑あたり 1 袋（300g）の使用が適正です。
正：300 g（30 g×10） 誤：500 g（50 g×10）



野菜・母土壌診断の実施について


★分析項目 7 項目（pH、EC、石灰、苦土、加里、リン酸、腐植）

- ☆分析料金：1 検体 1,330 円（税込） 代金は後日、購買代金として引き落します
- ※本年度は、JA で実施していた分析代金の補助はありませんので、ご了承ください
- ☆提出締切：6 月 6 日（金）までにしづはた購買店までご提出ください。（担当：石井）

☆サンプリング方法

- (1)圃場内の 5 ヶ所位から採土し、混合する※ (2)日陰で新聞紙の上に広げて、よく乾燥させる
- (3)土塊を砕き、mm 目のふるいにかける (4)ふるいにかけた乾いた土 400g 以上を袋に入れる
- (5)「住所」・「氏名」・「電話番号」・「作物名」・「施設・露地」などを明記して提出する

※右の図のようにそれぞれの場所で表土を外して
深さ 15cm 程度 V 字型に掘り斜面に沿い 2 cm 採土する



＜＜柑橘＞＞

本年産の青島温州の満開が福田ヶ谷では5月12日前後、大平では5月15日前後という状況です。着花量・春芽の発生状況からみると良い状況と思われますので、病虫害防除等適期を逃さないようにして下さい。

●温州みかん ※ カメムシ類が多く発生しています！

防除時期	対象病虫害	農薬名	希釈倍率	使用基準
6月上旬	ミカンハダニ	マシン油乳剤97%	150倍	前日—3回 30日—4回
	カイガラムシ類	エクスレルSE	5,000倍	
	チャノキロアザミウマ 黒点病	ペンコゼブ水和剤	600倍	

※マシン油の散布後3日間は、雨にあたらないように、天気予報に注意し散布する。

●夏肥について

5月から6月にかけて樹体の養分競合が激しく、夏場の養分吸収が一番良い時期になるので施用時期が遅れないように実施をお願いします。肥料の遅効きは果実の着色遅れの原因になりますので、施肥は6月上旬に完了させてください。

●中晩柑

防除時期	対象病虫害	農薬名	希釈倍率	使用基準
5月下旬	かいよう病	ICボルドー412	50倍	—
6月上旬	ミカンハダニ	マシン油乳剤97%	150倍	前日—3回 90日—4回
	チャノキロアザミウマ	エクスレルSE	5,000倍	
	黒点病	ペンコゼブ水和剤	600倍	

＜＜落葉果樹＞＞ ※ カメムシ類が多く発生しています！

対象作物 防除時期	対象病虫害	農薬名	希釈倍数	使用基準
いちじく 6月上・下	疫病	Zボルドー クレフノン	1,000倍 200倍	—
	アザミウマ類 カミキリムシ類	ダントツ水溶剤	2,000倍	
6月上中旬 6月下旬	カンザワハダニ	ダニサラバフロアブル	2,000倍	前日—2回
6月上旬 梨 中旬 下旬	輪紋病・黒星病・うどんこ病	ナリアWDG	2,000倍	前日—3回
	ハダニ類	コロマイト水和剤	2,000倍	前日—1回
	シンクイムシ類・コナカイガラムシ	スタークル顆粒水溶剤	2,000倍	前日—3回
柿 6月上旬	チャノキロアザミウマ カイガラムシ類	劇モスピラン顆粒水溶剤	2,000倍	前日—3回
	うどんこ・落葉病	オンリーワンフロアブル	2,000倍	前日—3回
6月中下旬	カキノヘタムシガ チャノキロアザミウマ	アクタラ顆粒水溶剤	2,000倍	3日—3回
	落葉病・うどんこ病	ベルコート水和剤	1,500倍	14日—3回
ぶどう 落花直後 袋掛け直前	チャノキロアザミウマ	コルト顆粒水和剤	3,000倍	前日—3日
	晩腐病・灰色かび病・べと病	ストロビードライフフロアブル	3,000倍	14日—3回
	チャノキロアザミウマ	劇アドマイヤー顆粒水和剤	5,000倍	21日—2回

組合員の皆様へ

令和7年度
JA静岡市単独 野生鳥獣害防除資材
(電気柵)等の補助制度について

補助内容

野生鳥獣被害を防ぐための設備(電気柵・猿防護用ネット等)を購入、設置する方に対し、「JA静岡市」から下記により助成金が交付されます。
◎市の定めるオクシズ地域及び団体型においては、静岡市野生鳥獣被害防除事業の助成が購入資材費の90%以内、上限額10万円と手厚く、市の定めるオクシズ地域以外は、50%、上限額10万円と地域差が生じている為、JA静岡市としては、広域化する被害状況を鑑み、効果的な対策支援をするため、予算の範囲内で以下の支援(助成)を行います。

★支援内容★

市の定めるオクシズ地域以外の事業電柵・猿防除資材等を購入するための個人(組合員)への購入資材等の助成をします。

◎防護柵設置資材代(税抜、百円未満は切り捨て)のうちその他の補助制度と併せ90%以内、上限90,000円まで助成をします。

★注意事項★

※令和2年度以降助成を受けた場合も対象となるが、同一圃場については5年経過後可能とする。

※静岡市が定める助成「基準額」とは、電気柵を一般的な設置方法で施工された場合に必要と見込まれる資材の額です。

※申請書類提出前の事前着工は不可ですのでご注意ください。

助成金の1,000円未満は切り捨てとなります。

現在、申し込みが集中しているため、申請をご検討中の方は
お早めにご相談ください。

★お問い合わせ★

JA静岡市 しづはた購買店(294-9330)
までお願い致します。

