

茶	平野・八木	野菜・水稲・苺	繁田・内野	購買	市川学・岡田・末永・岡部・小澤
女性部	平野	地区担当	市川肇(服東・服西) ・ 後藤(南葦科) ・ 大森(清沢・大川)		

二番茶集荷について

昼荷受けのみで、翌日販売。

※平日 17 時まで } 葦科購買店にて
※土曜日 9～11 時 }

※2 番茶については、朝集荷は行わず、
日曜集荷もしませんのでご了承下さい。
☆1 番茶後の最終防除が終わった時点で
栽培記録を提出して下さい。(防除・施肥)

茶摘み・賃揉み料金（標準）

茶摘み料金(1 時間当たり)

・手摘み1,040 円 ・ハサミ1,050 円 ・動力1,250 円

茶賃揉み料金(生葉 1 キロ当たり)

・1 茶250 円 ・2 茶190 円

※標準金額になりますので、各戸の状況により調整して下さい。

土壌診断(いちご・野菜)の申込受付について

1・提出期日 令和7年 6 月 9 日(月)まで

2・提出先 葦科購買店 繁田・内野まで TEL279－0772

3・料金について 1 検体 1,330(税込) ※代金は購買代金引落とし口座より翌月引落としです。

4・試料について ①風乾した土を 500g 程度。土は必ず風乾し、1 mm のふるいにかけてください。
②土を入れた袋には、「支店名」・「氏名」・「電話番号」・「作物名」・「ハウス・露地の別」などを明記して下さい。
③圃場内の採土位置・採土方法は下記参照

図1：圃場の平面図

※圃場内5カ所より
採土し混合する




図2：採土場所の断面図

※図のように深さ15cm程度V字型に
掘り、斜面に沿い2cm程度採土する



狩猟免許試験予備講習会について

日 時：令和7年 8 月 9 日(土)

会 場：静岡市葵区駿府町 1－1 2 『静岡県教育会館』

受 講 料：10,000 円(テキスト、送料含む)

申込期間：令和7年6月16日(月)～7月18日(金)

お申込みは 静岡猟友会事務局 253－6427

(平日 9：00～12：00・13：00～16：00 受付)

※講習内容は実技のみとなります。※学科は各自にて勉強して頂くとのことです。

※講習会参加希望の方は、葦科購買店平野・八木まで事前に連絡をお願いします。

※講習会は、定員になり次第締め切りとなりますので、お早めに申込みしてください！

【茶】

※今後の気象により病虫害の発生が早まる可能性があります。茶園を観察して防除薬剤を選択して下さい。

◎防除 茶工場等で使用できる農薬が決められている場合、そちらを優先して下さい。

1 茶摘採後	カンザワハダニ ウンカ・スリップス チャノホソガ	アグリメック ㊟	1,000 倍	単用 7 日
--------	--------------------------------	----------	---------	--------

※アグリメックは、サビダニ・チャトゲコナジラミ・チャノコカクモンハマキにも効果あり。

※アグリメックは、幅広い害虫に対して効果を発揮します。

2 茶萌芽期	炭そ病・もち病	スコア顆粒水和剤	2,000 倍	混用 7 日
	ウンカ・スリップス カメムシ・アブラムシ	ウララ DF	1,500 倍	

※コナジラミ・アカダニ・サビダニ・マダラカサハラハムシの発生が見られる園では、ウララ DF に代えて
コテツフロアブル ㊟ 2,000 倍(7 日)を散布して下さい

※ハマキムシの発生が見られる園はテッパン液剤 1,000 倍(3 日)を散布してください。

茶：クワシロカイガラムシについて ※近年、発生時期が早まっていますので注意して下さい

下記の時期(第1世代)の防除が効果的ですが、防除適期は地域毎に異なり、適期を逃すと効果がありません。正確な適期を把握したい方は、幼虫が寄生した枝を、葦科購買店へお持ち下さい。

・散布時期 平地:5 月中下旬頃 山間部:5 月下旬～6 月上旬

・散布薬剤 コルト顆粒水和剤 [2,000 倍・7 日] 又は アブロードエースフロアブル [1,000 倍・14 日]
枝幹に十分かかるように散布する

1 茶摘採後の管理について

◎2 茶を摘採する茶園管理(化粧ナラシ)

・遅れ芽が出揃った頃、遅れ芽を取り除く程度に整枝して下さい(摘採面より深くしないこと)

・ナラシ時期目安 ①みる芽⇒摘採20日後 ②普通芽⇒摘採14日後 ③硬葉芽⇒摘採10日後

◎2 茶を摘採しない茶園管理(整枝)

・整枝時期⇒ 6 月中下旬(2 茶芽が出揃い、葉色が濃くなった頃)

・整枝位置⇒ 1 茶摘採位置から秋整枝位置の間までとし、それ以上、下げないで下さい(古葉を残す)

※なるべく、1 茶後に 2 茶摘採園と同じように、整枝(化粧ナラシ)を行って下さい。

※整枝を 2 回やることで、翌年 1 番茶の元となる母枝の太さと芽数の均一化が図れます。

◎1 茶後の更新

・更新時期： 1 茶摘採後、なるべく早めに ・更新位置： 樹勢に応じて、浅刈り・深刈り・中刈り

※樹勢がひどく悪い園、古い園の更新は株枯れが発生する恐れがあります。

※枝が細く・小葉・葉層が薄く樹勢が弱い茶園では、1 茶後に台刈り更新をし、樹勢回復を図って下さい

【野菜】

◎キュウリ

病虫害名	薬剤名	倍率	使用基準
うどんこ病	アフェットフロアブル	2,000 倍	前日－3 回
べと病	ランマンフロアブル	1,000～2,000 倍	前日－4 回
斑点細菌病	カスミンボルドー	1,000 倍	前日－5 回

◎トマト・ミニトマト

アブラムシ類・コナジラミ類	コルト顆粒水和剤	4,000 倍	前日－3 回
---------------	----------	---------	--------

※カルシウム剤(カルクロンやアクアカル)を定期的に葉面散布することで、尻腐れ果の対策となります。

◎ナス

ハダニ類	コロマイト水和剤	2,000 倍	前日－2 回
アザミウマ類	スタークル顆粒水溶剤	2,000 倍	前日－2 回

【水稲】

元肥 田植前1週間以内に施肥



箱粒剤 田植え予定の3日前に処理し灌水を行い、なるべく苗に吸わせることにより効果が上がります。

	薬剤名	紋枯	処理時期	処理量
基本コース	ブーンレパード箱粒剤	○	田植え3日前～移植当日	50g／ 1箱
低コストコース	ツインターボ箱粒剤 08		播種時～移植当日	
ウンカ重点	フルスロツトル箱粒剤	○	播種時(覆土前)～当日	
カメムシ重点	ゴウケツバスター箱粒剤		田植え3日前～移植当日	

スクミリンゴガイ(ジャンボタニシ)対策

浅水管理にすることにより、食害が抑えられるので、田植え後2～3週間は浅水管理(4cm以下)とする。

発生が多い場合は薬剤による防除	スクミノン	1～4kg/10a	田植直後に処理
-----------------	-------	-----------	---------

除草剤

	薬剤名	10a処理量	処理時期
低コスト	ラオウ1キロ粒剤	1kg	田植直後～30日まで
おすすめ	ラオウジャンボ	250g(25g×10パック)	移植直後～30日まで
ノビエに長く効く	ミスターホームランLジャンボ	500g(50g×10)	田植3日～10日まで
高級強力	カイリキZジャンボ	300g(30g×10)	田植3日～30日まで

※水稲栽培歴に記載しています「カイリキZジャンボ」の使用量に誤りがありました。
大変ご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。

正: 300g(30g×10) 誤: 500g(50g×10)

水管理

- 田植後: 活着を良くするために、2葉の葉身が水面を出る程度の深水管理。
- 活着後: 分けつを促すために浅水管理(1～3cm)。
- どぶどぶした水田や葉色が悪い場合は田植後7日頃、2～3日水を切り、
植えいたみ回復と根の酸素補給を行なう。(ガス抜き)

【イチゴ】

(1) 炭そ病対策

- ① 親株・子株ともに葉を濡らさないようにかん水チューブでソフトなかん水とする。
(葉が濡れている時間が長いほど病気になりやすい)
- ② 薬剤はクラウンと地際部、葉裏にかかるようにていねいに散布する。

育苗圃病害虫防除ローテーション(先月号の続きです)

時 期		薬 剤	RAC	倍率	主な対象病害虫
6月	第1週 (1日～7日)	アントラコール(顆水)	M3	500倍	炭疽病
		エコピタ(液)	—	100倍	うどんこ・ハダニ・アブラムシ
	第2週 (8日～14日)	キノドー(フ)	M1	500～800倍	炭そ病
		プレオ(フ)	UN	1,000倍	ヨトウ
	第3週 (15日～21日)	オーソサイド(水)	M4	8000倍	炭そ病・うどんこ
		エコピタ(液)	—	100倍	うどんこ・ハダニ・アブラムシ
	第4週 (22日～28日)	ジマンダイセン(水)	M3	6000倍	炭そ病
		コテツ(フ) 劇	13	2,000倍	ハダニ・ヨトウ・アザミウマ

【果樹】

果樹名	時期	病害虫名	薬剤名	倍率
柑橘 (青島温州)	5月 (落弁期)	サビダニ、チャノキロアザミウマ	グレーシアフロアブル	4,000倍
		黒点病	ファンタジスタ顆粒水和剤	3,000倍
	6月中旬	黒点病	ペンコゼブ水和剤	600倍
		チャノキロアザミウマ ミカンハダニ	エクシレル SE マシン油乳剤(97%)	5,000倍 150倍
キウイ フルーツ (Hayward)	5月下旬	クワシロカイガラムシ	モスピラン顆粒水溶剤 劇	2,000倍
		かいよう病	コサイド3000 (クレフノン 200倍加用)	2,000倍
	6月上旬	果実軟腐病 キロマイコガ キウイヒメヨコバイ	ダコニール1000 アグロスリン乳剤 劇	1,000倍 2,000倍
		果実軟腐病	ベルコート水和剤	1,000倍
柿	5月下旬	うどんこ病 落葉病・灰色かび病	ストロビー ドライフロアブル	3,000倍
		チャノキロアザミウマ	モスピラン顆粒水溶剤 劇	2,000倍
	6月上旬	うどんこ病 落葉病・灰色かび病	オンリーワンフロアブル	2,000倍
		落葉病・類似炭そ病 カキハタムシ・チャノキロアザミウマ	ベンレート水和剤 アクタラ顆粒水溶剤	2,000倍 2,000倍
	6月中旬			

「令和7年度JA静岡市農業振興のための支援策」について

今月の訪問日にて「令和7年度JA静岡市農業振興のための支援策」を配布しましたのでご一読ください。

なお、今年度当初の部農会長会議で一度説明させていただきましたが、その後、予算枠の拡充、要件の緩和を行いました。今回の配布資料を最新版とさせていただきますことご了承ください。

【女性部】＜行事・会議＞

6/ 2(月)13:00～ ひかりの会定例会【藁科】 ピアノ 6/3, 17(火)13:30～【藁科】
6/13(金)14:00～ 朝市加工G会議【本店】 藁科体操 6/3, 17(火)19:30～【藁科】
6/17(火)10:30～ 県女性部リーダー・事務局研修会【農業会館】 パッチワーク 6/11, 25(水)9:30～【藁科】
6/19(木)13:30～ 運動会実行委員会【本店】 フラダンス 6/12, 26(木)19:00～【藁科】
6/23(月)13:30～ 生活講座 防災食【内牧】 書道 6/13, 27(金)13:30～【藁科】
6/30(月)13:30～ 加工衛生講習会【クラシック】 和太鼓 6/ 8, 22(日)19:00～【生涯C】

水分補給にJA飲料！



JA静岡茶
400g×24本
税込 2,916円



ポストニック
ウォーター(普通・レモン)
500ml×24本
税込2,350円



NEW!

季節限定販売
熱中対策水
500ml×24本
税込 3,100円