

南部営農だより 5月の防除

南部総合経済センター 電話：237-5580 Fax：237-5155

長田出張所 電話：259-3233 Fax：258-2867



☆☆ ゴールデンウィークの購買営業のお知らせ ☆☆

月	火	水	木	金	土	日
4/27	4/28	4/29 休	4/30	5/1	5/2 午前営業	5/3 休
5/4 休	5/5 休	5/6 休	5/7	5/8	5/9 午前営業	5/10 休

静岡市支援金「農業者物価高騰対策事業費」申請会について

- 対象者 申請時に静岡市の認定農業者、認定新規就農者である方。
又は令和7年・収支決算書(青色・白色)における農産物販売額(自家消費対象外)が500万円以上の農業者(法人含む)で環境負荷軽減の取組みが確認できる方。
- 受付日程 令和8年5月11日(月) 13:30～(会場：大谷支店2階)
令和8年5月15日(金) 9:00～(会場：大谷支店2階)

※詳細は別紙をご参照ください



令和8年度 茶・水稻・柑橘 防除暦について

南部総合経済センター、長田営農出張所の窓口にて各防除暦を配布しています

高田農具展示会

- ★5/1 (金) 8:30～12:30 長田支店前
- ★5/11 (月) 8:30～12:00 大谷支店前
- ★5/27 (水) 8:30～12:00 南部総合経済センター前

修理も受け付けています

有害鳥獣伝言板

	南部	長田
ハクビシン	2頭	1頭
イノシシ	3頭	-
タヌキ	3頭	-
シカ	-	2頭

春先になりハクビシンやタヌキの活動が活発な時期(繁殖期)を迎えています。設置中の電気柵は昼夜、問わず通電状態にしておくことが効果的です。今一度、防除を見直しましょう。

～女性部お知らせ～

- ▷5/12(火) 8:30～ 長田ブロック資源回収
- ▷5/12(火) 13:30～ 大谷地区役員会(旧南部AC)
- ▷5/20(水) 14:00～ 健康体操教室(旧国吉田)

購買飲料新商品をご紹介します

- ・能登まるごと はとむぎ茶 500ml×24本
- ・小川珈琲 ブラック無糖・カフェオレ加糖 195g×15本
- ・トマトの果実(有機トマトジュース) 160g×30本



◎注意：農薬購入の際は印鑑をご持参ください

茶 (岩田)

病害虫防除 防除作業を行う時は周辺茶園の摘採状況を確認し、ドリフトしないよう注意して下さい。

一茶摘採後	カンザワハダニ チャノナガサビダニ ウンカ・スリップス	アグリメック®	1,000倍	7日
二茶萌芽期	炭疽病・もち病 ウンカ・スリップス	スコア顆粒水和剤 ウラウDF	2,000倍 1,500倍	混用 7日

※サビダニやチャトゲコナジラミの発生が見られる茶園ではウラウDFをコテツフロアブル®(2,000倍・7日)に変えて散布して下さい。

「クワシロカイガラムシ」(防除時期・5月中旬頃) ※近年、発生が早い傾向があります。

防除薬剤：コルト顆粒水和剤(2,000倍・7日) 1000リットル/10a
(枝幹に十分かかるように散布する。)

水稻 (石原・深井・望月)

- (1) 塩水選 10aあたり種もみ4kgを用意し沈んだもみを用いる。

うるち	水10リットルあたり、塩1.6kg または 硫安2.0kg
もち	水10リットルあたり、塩0.9kg または 硫安1.1kg

水洗い・水切り

- ・塩分が残らないよう、種もみを十分水洗いする。
- ・水を切り、目の粗い網袋などに詰める。袋詰は、7分目程度とし余裕をもたせる。

- (2) 薬剤浸漬 薬液20リットルで、種もみ10kg分まで処理が可能。

ばか苗病・もみ枯細菌病	テクリードCフロアブル	(200倍) 100ml/水20㍓	混用可
イネシソガレセンチュウ	スミチオン乳剤	(1,000倍) 20ml/水20㍓	

※ 浸漬の際は薬液中で袋をよくゆする。24時間静置後、取り出したら水洗いはしない。

- (3) 水中浸漬(浸種)

- ・種もみの2倍量の清水にゆっくり浸漬する。
- ・日陰などの涼しい場所に3～4日間静置する。
- ・4日目以降は、2日に1度、水を入れ替える。

2.

- (4) 芽だし

- ・発芽を揃えるため、30℃程度の温水で加温し1mm程度芽だしする。

- (6) 育苗

育苗資材の消毒 10aあたり20箱準備する。

イチバン液 1,000倍 瞬時浸漬 または ジョロによる散布(培土にはかけない)

- ・培土は10a当たり粒状ばーまっと3号を3袋準備する。(床土約2～3kg・覆土約1kg)
- ・1箱あたり1リットル以上をたっぷりかん水し、根上りを予防する。(覆土後は灌水しない)
- ・床土の水がひいたら、1箱あたり催芽もみ150～160gをは種し、覆土する。

- (7) 発芽→緑化

- ・発芽時、もみ枯細菌病予防のため、30℃以上にならないように注意する。
- ・緑化は日焼けしないよう、寒冷紗を用い、少しずつ光に慣らす

- (8) 硬化 日光に十分あて、丈夫な苗にする。下記薬剤をかん注する。

苗立枯病、ムシ苗予防、発根促進	タチガレン(液)	500倍	1箱当たり500mlかん注
-----------------	----------	------	---------------

猛暑・品種特性により休眠が深く出芽前にはばらつく可能性がある
あるので、しっかり行いましょう！
積算温度100℃(水温×日数)
・水温15℃の場合7日間
・粒がアメ色になり、胚が白く透けて見える程度が目安です。

落葉果樹（森）＊使用時期ごとの農薬は混用できます

作物	使用時期	対象病虫害	農薬	倍率	使用基準
桃	5月上旬 (袋掛前)	黒星病・灰星病	フルーツセイバー	2,000倍	前日－3回
		カイガラムシ類	コルト顆粒水溶剤	2,000倍	前日－3回
		展着剤	ブレイクスルー	10,000倍	－
	5月中旬 (袋掛後)	せん孔細菌病 灰星病、うどんこ病 シンクイムシ類	バリダシン液剤5 インダーフロアブル エクシレルSE	500倍 5,000倍 5,000倍	7日－4回 前日－4回 前日－3回
梨	5月上旬 (袋掛前)	灰星病・枝折病	トップジンM水和剤	1,000倍	前日－6回
		＊やや盛り上がった紫黒色の病斑の枝をみつけたら、剪除し処分。(せん孔細菌病予防)			
		黒星病、赤星病 アブラムシ類	オンリーワンフロアブル アクタラ顆粒水溶剤	2,000倍 3,000倍	前日－3回 前日－3回
	5月中旬	黒星病・輪紋病 ハマキムシ・シンクイムシ類	ベルコート水和剤 ロディー水和剤㊞	1,500倍 1,000倍	14日－5回 前日－2回
梅	5月上旬	黒星病 カメムシ類	ストロビードライフロアブル スタークル顆粒水溶剤	3,000倍 2,000倍	7日－3回 前日－3回
	5月中旬	黒星病	インダーフロアブル	5,000倍	前日－2回
キウイ	5月中旬	かいよう病	コサイド3000 バイカルティ(必ず加用)	2,000倍 1,000倍	満開時は 避ける
	5月下旬	果実軟腐病	ダコニール1000	1,000倍	60日－7回
いちじく	5月中旬	疫病	Zボルドー バイカルティ(必ず加用)	1,000倍 1,000倍	――
	＊敷きワラをして雨水の跳ねを防止する。＊周辺の除草をしてアザミウマ発生を防ぐ				
柿	5月上旬	黒星病・落葉病	ベルコート水和剤	1,500倍	14日－3回
	5月中下旬	灰色カビ病・落葉病 アザミウマ類	ストロビーDF コテツフロアブル㊞	3,000倍 2,000倍	14日－3回 14日－2回

柑橘（新出）≪青島温州、中晩柑(甘夏)≫ 病虫害防除

5月上中旬	灰色カビ病	スイッチ顆粒水和剤	3,000倍(青島7日－3回) (中晩柑45日－2回)	混用可
	チャノキイロアザミウマ カメムシ類	スタークル顆粒水溶剤	2,000倍(前日－3回)	
5月下旬	サビダニ チャノキイロアザミウマ	グレーシアフロアブル	4,000倍(7日－2回)	混用可
	黒点病	ファンタジスタ顆粒水和剤	3,000倍(14日－3回)	

有葉花摘蕾 有葉花の新葉を5枚以上有している蕾に対し、5月中・下旬に摘蕾を実施。

有害鳥獣 捕獲実施中 捕獲期間中は、事故がないよう十分注意してください。

長田実施期間：5月31日まで(カラス・ヒヨドリ)6月30日まで(イナシシ・ハクビシン・アナグマ・アライグマ・ニホンジカ・サル)
南部実施期間：6月30日まで(タヌキ・アナグマ)通年(イナシシ・ハクビシン・アライグマ)

令和7年度 捕獲実績 (R7.4月～R8.3月までに協議会、猟友会より捕獲報告があったものの合計)

【長田】・イナシシ 56頭 ・ハクビシン 8頭 ・シカ 7頭 ・サル 2頭 ・アナグマ 18頭 ・タヌキ 4頭
・カラス 3羽 ・ヒヨドリ 4羽

【南部】・イナシシ 10頭 ・ハクビシン 19頭 ・タヌキ 13頭

㊞注意：農薬購入の際は印鑑をご持参ください

いちご（山森・石原）

1. 育苗管理

①IB化成S1号の場合：親株1株あたり10日で3粒もしくは14日で4～5粒を施用。

②給液管理の場合：ECO.5～0.6を目安に給液。(5月の目安：400ml/株/日)

時期	薬剤	RAC	倍率	回数	主な対象病虫害
第1週 (26日～2日)	セイビアー(フ)	12	1000倍	1/3	炭そ病、灰色かび病
	カスケード(乳)	15	4,000倍	1/3	ヨトウ・アザミウマ
第2週 (3日～9日)	コサイド3000	M1	1000倍	－	炭そ病
	エコピタ(液)	－	100倍	－	うどんこ病・ハダニ・アブラムシ
第3週 (10日～16日)	ジマンダイセン(水)	M3	600倍	2/6	炭そ病
	モメント(フ)※散布	23	2,000倍	1/2	ハダニ・アブラムシ・アザミウマ
第4週 (17日～23日)	ベルコート(水)	M7	1,000倍	1/5	炭そ病・うどんこ病
	エコピタ(液)	－	100倍	－	うどんこ病・ハダニ・アブラムシ
第5週 (24日～30日)	デラン(フ)	M9	1000倍	1/2	炭そ病
	アグリメック } どちらか グレーシア(乳) }	6 30	500～1000倍 2000倍	1/2 1/2	ハダニ ハダニ・ヨトウ・アブラムシ・アザミウマ

2. 本圃管理

①病虫害防除

病虫害	薬剤名	RAC	倍率	回数	天敵	蜜蜂
うどんこ病	パレード20(フ)	7	2,000～4,000倍	3	なし	1日
灰色かび病	カリグリーン ※1	NC	800～1,000倍	－	なし	1日
灰色かび病	ファンタジスタ(顆水)	11	2,000～3,000倍	3	なし	1日
アザミウマ	ファインセーブ(フ)㊞	34	1,000～2,000倍	3	なし	1日
	ベネビアOD	28	2,000倍	3	なし	1日
	㊞ディアナSC	5	2,500～5,000倍	2	14日	7日
アザミウマ・ハダニ	㊞グレーシア(乳)	30	2,000倍	2	100日以上	1日
アブラムシ・コナジラミ	ウララ(DF)	29	2,000倍	2	なし	1日
ハダニ	ダニオーテ(フ)※2	33	2,000倍	2	なし	1日
	㊞コロマイト(水)	6	2,000倍	2	7日	1日

※1 灰色かび病の防除は800倍

※2 ダニオーテ(フ)は銅剤との混用、近接散布は薬剤の効果を低下させるため、14日以上はあける

㊞天敵や蜜蜂への影響が長い薬剤になります。ご使用には注意して下さい。

②収穫終了後の管理

・アザミウマが外へ出て増えないように、ハウスを閉めきり蒸しこみを行う

・高設栽培…収穫終了後2週間ほど水のみ流し、肥料分を吸わせた後処分する。

・土耕栽培…被覆資材を外し、雨にあてる。

【新規薬剤の紹介】※いずれも取り寄せ品となります

『エフィコンSL』…アザミウマ、アブラムシに効果。天敵昆虫に影響が少なく、ミツバチは2日の影響。

『アイーナ20LF』…うどんこ病、灰色かび病、炭疽病に効果のある新規系統(FRACコード52)薬剤。

