



くじらがし、け

しづはた購買店だより

静岡市葵区下 1459-1 ☎294-9330 FAX294-1635

令和8年 4月 発行

購買：山下・谷米・竹澤		配送：白鳥			
購買・地区担当	昭府地区担当：海野	大河内地区担当：川嶋		梅ヶ島地区担当：望月 達	
北部営農センター（しづはた担当）		茶：折山	蔬菜・苺・水稻：石井	果樹：伊藤	女性部：大越


人事異動のお知らせ

転出

市川 恵（女性部）⇒ 営 農 課

転入

大越 紫折（女性部）⇐ 営 農 課
竹澤 悠斗（購 買）⇐ 新入職員



《 茶 》 1 番茶生産

今年は 3 月の寒さで生育は抑えられ、昨年並～3 日ほど早く推移をしております。
今まで通り、選ばれる荒茶生産をお願い致します。

◆ 摘 採 自分の摘採計画よりも 2 日～3 日早い摘採を心掛けましょう

- ポイント①

圃場巡回をし、茶園の生育を確認して摘採計画をしっかりと練る。
- ポイント②

手摘みの際に傷葉、古葉や赤棒等が混入しないよう注意！丁寧な摘採を。
- ポイント③

やぶきたは適期浅刈をし、品種は必ずミル芽摘採に努める。
- ポイント④

茶商の需要に合わせた摘採・製造に努めましょう。

◆ 防 除 農薬散布後は生産履歴の記帳に努めましょう！！

【1 茶 前】摘採までの日数を注意する。
赤ダニ多発園 ⇒ ミルベノック乳剤(7 日) 1,000 倍 又は 劇コテツフロアブル(7 日) 2,000 倍

【1 茶摘採後】
アカダニ・サビダニ・トジムシ・ウンカ・スリップス 劇アグリメック(7 日) 1,000 倍 単用

【クワシロカイガラムシ】散布時期の判断がつかない場合は営農センターまで相談ください。

時 期	… 5 月中下旬～6 月上旬	散布量	…10 a 当たり 1,000 ℓ
薬 剤	… コルト顆粒水和剤	2,000 倍	7 日
	又は アプロードエースフロアブル	1,000 倍	14 日

◆ 施 肥 灌水施設がある茶園では、しっかり灌水しましょう！！肥料の効果 UP

・1 茶芽出肥 2 回目	1 茶摘採 2 0 日前	化成又は硫安	3 袋／1 0 a
・2 茶肥	2 茶摘採 3 0 日前	化成	4 袋／1 0 a

◆ 整 枝

・時 期 → 摘採後、7 ～ 1 0 日遅れ芽が出し切った頃（ミル芽摘採した茶園は約 14 日）

・深 さ → 1 茶摘採面、遅れ芽を除く程度に浅く摘採面を整える。

茶摘み・賃揉み標準料金

しづはた 地区				大河内 地区	
茶摘み料金（時間当たり）		賃揉み料金（生葉 1kg 当たり）		1 番茶・加工料金（荒茶 1 kg 当たり）	
手摘み	1,000 円	1 茶本茶	250 円	5,000 円以上	1,400 円
手鋏刈り	1,100 円	1 茶番茶	120 円	2,000 円～4,999 円	1,200 円
動力刈り	1,300 円	2 茶本茶	160 円	1,999 円以下	1,100 円

※ 現在、重油等の燃料・資材の価格がかなり高騰しています。
上の表の金額（R7 年 同様）はあくまで参考ですので、状況に合わせて賃揉料金の設定をお願いします。

荒茶共販出荷者の方へ ☆農協共販では荒茶出荷時前までに生産履歴の提出が必要です

施肥・防除管理終了後、ただちに作業記録用紙に記帳し、最寄りの農協までご提出ください。

提出期限 最終防除終了後早めに提出ください。※ 製造記録用紙は荒茶出荷時に提出をお願いします。

提出先 しづはた購買店 ・ 大河内事務所(ポスト) ・ 梅ヶ島事務所(ポスト)

※ 共同工場は組織ごとに栽培日誌の取りまとめをお願いします。



静岡市の茶・補助事業紹介（抜粋） ※市の予算の関係で R8 年度で対応できない場合があります。

- ①茶加工施設機械整備事業

対象

荒茶加工施設等で使用する機械の導入

補助率

5 割（個人上限 150 万円）
（法人上限 500 万円）
- ②茶園改良整備事業

対象

茶園平坦化、園内道整備、防霜ファン整備

補助率

5 割(上限 30 万／反)他
- ③茶園管理資材導入事業

対象

乗用型摘採機、バックホウ、被覆資材導入

補助率

5 割(上限 500 万／個人)

◆ 各補助事業に要綱があり、補助対象とならない場合がありますので、まずは農協へご相談ください。

茶防除暦の配布について

茶防除ポスターにつきまして、必要な方は『 しづはた購買店 』でお渡しいたします。
お手数ですが、ご来店の際お受け取り下さい。恐縮ですがご了承お願い致します。

静岡市支援金「農業者物価高騰対策事業費」申請手続きについて


- ・概要

高騰する生産資材の価格上昇分の一部陸助成
- ・対象者

申請時に静岡市の認定農業者、認定新規就農者である方。又は令和 7 年・収支決算書(青色・白色)における農産物販売額(自家消費対象外)が 5 0 0 万円以上の農業者(法人含む)で環境負荷軽減の取組みが確認できる方。
- ・対象経費

経費科目⇒ 種苗、肥料、飼料、農具、農薬、諸材料、修繕、動力光熱の 8 科目
※ 燃油セーフティネット事業(重油・ガス・灯油・LNG)に関わる資産(例 暖房機・製茶機械)を所有されている方は、動力光熱費は全て対象外になります。

※ 申請受付会の日程・時間等の詳細は、柑橘情報の裏面に掲載しますので、ご覧ください。



《本圃》 灰色カビ病・アザミウマの発生が非常に増えています。
灰色カビ病はハウス内湿度を極力下げよう努めて下さい。アザミウマは地中に蛹が潜伏する生態のため、残効が長い薬剤を連続散布（3～5 日間隔）することが重要です。
天敵での防除が困難になってきている圃場は薬剤防除体系へ切り替えることも必要です。また、被害果及び被害花は早めに除去し、圃場外へ早急に持ち出しましょう。

☆お勧め農薬☆ 下記表における天敵への影響はミヤコ・チリに対するものです。						
病害虫	薬剤名	RAC	倍 率	回数	天敵	蜜蜂
うどんこ病 灰色かび病	バレード 20（フ）	7	2,000～4,000 倍	3	なし	1 日
	カリグリーン ※1	NC	800～1,000 倍	—	なし	1 日
灰色かび病	ファンタジスタ顆（水）	11	2,000～3,000 倍	3	なし	1 日
アザミウマ	ファインセーブ（フ）	34	1,000～2,000 倍	3	なし	1 日
	ベネビア OD	28	2,000 倍	3	なし	1 日
	ディアナ SC	5	2,500～5,000 倍	2	14 日	7 日
アザミウマ・ハダニ	グレーシア（乳）	30	2,000 倍	2	100 日以上	1 日
アブラムシ・コナジラミ	ウララ DF	29	2,000 倍	2	なし	1 日
ハダニ	ダニオーテ（フ）※2	33	2,000 倍	2	なし	1 日
	コロマイト（水）	6	2,000 倍	2	7 日	1 日

※1 ダニオーテ（フ）は銅剤との混用、近接散布は薬剤の効果を著しく低下させます。
14 日以上はあけるようにして下さい。
 天敵や蜜蜂への影響が長い薬剤になります。ご使用には注意して下さい。




《育苗》 育苗スケジュールを立て、今後の予定を明確にしながら作業しましょう。
（1）親株栽培 「ランナーの発生を促す要因は温度、水、栄養が大事です。」
温度管理 ： 25℃程度（ハウス内気温）
※夏場の高温期でも 35℃以上にならないよう遮光、遮熱をしましょう。
湿度管理 ： 過湿、過乾燥に注意
※ハウス内の排水対策と過乾燥時は適宜ハウス内への散水をしましょう。
肥料濃度 ： 硝酸イオン濃度を測定して、体内窒素濃度をこまめに確認しましょう。
メルコクアント試験紙で 500p pm 以上を推移しましょう。

（2）親株肥料管理
① I B 化成 S1 号の場合：親株 1 株あたり 10 日で 3 粒もしくは 14 日で 4～5 粒を施用。
② 給 液 管 理 の 場 合：EC0.5～0.6 を目安に給液。（5 月の目安：400ml/ 株/ 日）
→灌水不足はランナー発生の減少に繋がります。培地が乾かない様適時灌水して下さい
→過湿には注意して、プランター及び圃場内の排水対策を行いましょう。

（3）炭そ病防除
・培土は必ず新品もしくはしっかりと消毒したものを使用して下さい。
・採苗ポット、ランナーピン、ハサミなど使用する資材は全て消毒しましょう。
・発生が疑わしい株は迷わずすぐに除去し、圃場の外に持ち出しましょう。
→入口付近などに溜めて置かずに、早めに処分しましょう。（焼却が好ましい）
→除去した後に薬剤防除を必ず行いましょう。
・葉かきなど作業をした際は毎回薬剤防除をしましょう。（回数制限の無い薬剤の有効利用）
例：コサイド 3000 等の薬剤を使用し、作業で出来た傷口の保護をして下さい。

☆育苗圃防除ローテーション☆

時 期		薬 剤	RAC	倍率	回数	主な対象病害虫
5 月	第 1 週 (26 日～2 日)	セイビアー（フ）	12	1,000 倍	1/3	炭そ病、灰色カビ病
		カスケード（乳）	15	4,000 倍	1/3	ヨトウ・アザミウマ
	第 2 週 (3 日～9 日)	コサイド 3000	M1	1,000 倍	-	炭そ病
		エコピタ（液）	-	100 倍	-	うどんこ病・ハダニ・アブラムシ
	第 3 週 (10 日～16 日)	ジマンダイセン（水）	M3	600 倍	2/6	炭そ病
		モベント（フ）※散布	23	2,000 倍	1/2	ハダニ・アブラムシ・アザミウマ
	第 4 週 (17 日～23 日)	ベルコート（水）	M7	1,000 倍	1/5	炭そ病・うどんこ病
		エコピタ（液）	-	100 倍	-	うどんこ病・ハダニ・アブラムシ
	第 5 週 (24 日～30 日)	デラン（フ） 	M9	1,000 倍	1/2	炭そ病
アグリメック 		6	500～1,000 倍	1/2	ハダニ	
グレーシア（乳） 		30	2,000 倍	1/2	ハダニ・ヨトウ・アブラムシ・アザミウマ	

水稻

種子消毒（10a あたり種もみ 4kg を用意）

塩水選

購入した種もみも必ず実施すること

水洗い

沈んだ種もみを十分水洗いする

袋詰め

目の粗い袋に、7 割程度詰める

薬剤浸漬

まず、薬液中で袋をよくゆすり薬を隅々まで行渡らせてから 24 時間浸漬する

水 10L あたりの使用量

	塩の場合	硫安の場合
うるち	1.6kg	2.0kg
も ち	0.9kg	1.1kg

ばか苗病 もみ枯細菌病	テクリード C(フ)	200 倍	100ml/水 20L
シンガレセンチュウ	スミチオン(乳)	1,000 倍	20ml/水 20L

(薬液 20L で、種もみ 10kg 分まで処理が可能)

水中浸漬

薬剤浸漬後は水洗いせず、種もみの 2 倍量の清水にゆっくり浸漬する
水が腐らないように日陰に 3～4 日間静置する。この間に攪拌しないこと。

芽出し

発芽を揃えるため、28～29℃の温水で加温し 1mm 程度芽だしする。
もみ枯れ細菌病を防ぐために 30 度以上にしない。



もみ枯細菌病対策 もみ枯細菌病は多発すると苗が全滅する恐れがあります。昨年発生した方や発生が懸念される場合は、下記の対策を行って下さい。

- ◆育苗箱・シルバーポリトウ等の資材を『イチバン液 1,000 倍』で浸漬し消毒する。
- ◆『ツインターボ箱粒剤』を覆土前に処理すると、もみ枯細菌病を含む病害虫を 7 月末まで抑制
- ◆発芽時の温度は 3 0℃以上にしない。

育苗培土

① 育苗期間 20 日で草丈 10～15cm、本葉 2～2.5 枚を目標		
② 育苗には水道水などのきれいな水を使うこと		
育苗箱の消毒	イチバン 1,000 倍	瞬間浸漬・またはジョロ散布
培土	宇部培土	4 袋／10a 1 袋で 6 箱分
	粒状ばーるまっと 3 号	3 袋／10a 1 袋で 7 箱分

農薬購入時には印鑑を！ 毒劇物に指定されている農薬はと表記してあります。購入の際には必ず印鑑（認印）をご持参ください。

《柑橘》

柑橘類の生育は天候に左右されやすいので、生育ステージを見極め適期防除を行って下さい。
本年度の青島温州の開花始めは4月下旬、満開は連休中と予想されています。

●防除管理

温州みかん

防 除 時 期	対 象 病 害 虫	農 薬 名	希 釈 倍 数	使 用 基 準
3 分咲き期	アザミウマ類	スタークル顆粒水溶剤	2,000 倍	前日－3 回
	訪花昆虫 灰色カビ病	スイッチ顆粒水和剤	3,000 倍	7 日－3 回
落 弁 期	アザミウマ類・サビダニ	グレーシアフロアブル	4,000 倍	7 日－2 回
	黒点病・そうか病	ファンタジスタ顆粒水和剤	3,000 倍	14 日－3 回

※他作物と隣接している圃場並び昨年、そうか病が発生した圃場は、スイッチ顆粒水和剤に換え
フロンサイドSC2,000 倍 30日－1 回 を使用する。

※花と芽の競合を避ける為、3 分咲き防除時に尿素 500 倍とリンクエース 1,000 倍を混用散布。
落弁期防除時に尿素 500 倍と結晶粒マグ 500 倍を混用散布することにより、新葉緑化と着果安定が高まる。

※着花量が非常に多い場合には、ダブルクイック S 550を1 袋／10 a 施用。芽と花の競合を助け、着果量の確保を図りましょう。

中 晩 柑

防 除 時 期	対 象 病 害 虫	農 薬 名	希 釈 倍 数	使 用 基 準
満 開 期	アザミウマ類	スタークル顆粒水溶剤	2,000 倍	前日－3 回
	訪花昆虫 灰色カビ病	スイッチ顆粒水和剤	3,000 倍	45 日－2 回
5 月中下旬	アザミウマ類・サビダニ	グレーシアフロアブル	4,000 倍	7 日－2 回
	黒点病・そうか病	ファンタジスタ顆粒水和剤	3,000 倍	14 日－3 回

《落葉果樹》

対 象 作 物 防 除 時 期	対 象 病 害 虫	農 薬 名	希 釈 倍 数	使 用 基 準
いちじく 5月上旬	疫 病	Z ボ ル ド ー 加用 ク レ フ ノ ン	1,000 倍 200 倍	—
柿 5 月中下旬	チャノキイロアザミウマ 落葉・灰色カビ・うどんこ病	劇コテツフロアブル ストロビー D F	2,000 倍 3,000 倍	14 日－2 回 14 日－3 回
梅 5 月上中旬	カ メ ム シ 類 黒 星 病	スタークル顆粒水溶剤 ストロビー D F	2,000 倍 3,000 倍	前日－3 回 7 日－3 回
梨 5月中旬	黒星病・輪紋病 シンクイ類・カメムシ類	ベルコート水和剤 アクタラ顆粒水溶剤	1,500 倍 3,000 倍	14 日－5 回 前日－3 回
ぶ ど う 開 花 期	灰色カビ・黒とう病 うどんこ病	ロブラール水和剤 インダーフロアブル	1,000 倍 8,000 倍	60 日－3 回 30 日－3 回

※生育状況を確認し、防除適期を逃さないようにして下さい。

※梅のヤニ果・そぶ果（ホウ素欠乏）の発生する園では、防除時にヨーヒ B 5 1,000 倍の混用散布をお勧めします。また、フィールドアップ（土壌改良剤）4 袋／10 a も効果があります。