

茶	苺・水稻・蔬菜	果樹・柑橘	女性部（しづはた兼任）	購買
松尾	松尾・小柳・奥田	大塚	大越	橋本・萩原・中村（早）・鈴木・田山 中村（則）・松下

※大型連休前のご注文は、余裕をもっていただきますようお願いいたします。

購買店
営業日

月	火	水	木	金	土	日
4/27 通常営業	4/28 通常営業	4/29 休	4/30 通常営業	5/1 通常営業	5/2 AM 営業	5/3 休
5/4 休	5/5 休	5/6 休	5/7 通常営業	5/8 通常営業	5/9 AM 営業	5/10 休

水稻

- （1） 塩水選（購入籾でも必ず行う）
- ・10a あたり4kg の籾を準備
 - ・塩水選した後に十分水洗いする。

	比重	10L あたり	
		塩	硫安
うるち	1.10	1.6k g	2.0k g
もち	1.06	0.9k g	1.1k g

- （2） 種子消毒 下記薬剤に24時間浸漬する ※袋に籾を詰めすぎないようにしましょう

病虫害	薬剤	倍率	薬量
ば か 苗 病	テクリードC	200 倍	100ml/水 20L
も み 枯 細 菌 病			
イネシンガレセンチュウ	スミチオン乳剤	1,000 倍	20ml/水 20L

- ※ 薬液から取り出したら、水洗いせず、種籾の倍量の精水に3～4日間静置侵種しておく。
- （3） 芽だし：30℃前後に加温（温水に浸す）・・・1～2日間（水温や浸種状態によって変わる）
芽出しの程度は「ハト胸」・・・芽が切れて1mm程度出た状態
吸水が不十分だと発芽しにくい、芽だしが不完全だと播種後の発芽揃いが悪くなります。
- （4） 育苗箱はイチバン（1,000 倍）で殺菌する。
- （5） 床土：宇部倍培土又は粒状ばーるまっと3号1箱あたり約3～4kg（床2～3kg、覆土1kg）
- （6） 根上がり防止のために十分灌水。籾は一箱あたり150～160gを均一に撒く。
健苗作りのため厚播きしない。
- （7） タチガレン液剤（500倍）を箱あたり500ml灌注すると丈夫な苗に！
防除しない場合も要灌水 種籾が少し浮くほどに灌水・籾が横になり重なりをなくす。
- （8） 根上がり防止のため、覆土は充分する。（種籾の上5～6mm程度）覆土した後は灌水しない。

茶 管内の茶の生育状況は、昨年より若干早いと思われます。今後の降雨、気温の上昇で生育が進むことも考えられますので、計画を立てて摘採を実施しましょう。

今後の管理

◇ 1番茶摘採の注意事項

- ・摘採前に茶株面の落葉等の異物を除去する。
- ・樹勢維持の為、1葉程度残す摘採とする。（古葉は絶対に製品に入れない）
- ・摘採した生葉にイタミが生じないよう、取扱いに十分注意する。
- ・茶工場内外での異物混入の防止、衛生面にも十分気を配る。

※農薬名に劇が付いている農薬は購入時に印鑑が必要になります。



人事異動のお知らせ

転出者

市川 恵（女性部担当）
⇒ 本店営農課（女性部担当）

転入者

大越 紫折 ⇐ 本店営農課
（女性部担当）

松下 桜夕 ⇐ 新規採用職員

大変お世話になりました！
ありがとうございました！

中村 早苗 ⇐ 西奈支店
（共済担当）

奥田 さや ⇐ 本店直販課

これから精一杯がんばります！よろしくお願いします！

静岡市支援金「農業者物価高騰対策事業費」申請手続きについて

- ・概要 高騰する生産資材の価格上昇分の一部を助成
- ・対象者 申請時に静岡市の認定農業者、認定新規就農者である方。
又は令和7年・収支決算書(青色・白色)における農産物販売額(自家消費対象外)が500万円以上の農業者(法人含む)で環境負荷軽減の取組みが確認できる方。
- ・対象経費 経費科目⇒ 種苗、肥料、飼料、農具、農薬、諸材料、修繕、動力光熱の8科目
※燃油セーフティネット事業(重油・ガス・灯油・LNG)に関わる資産(例 暖房機・製茶機械)を所有されている方は、動力光熱費は全て対象外になります。
- ・対象金額 上記、対象金額の合計金額(税抜き)×0.0138(1.38%)
※計算例 肥料30万、農薬20万、農具20万、修繕30万 合計100万の場合
100万×0.0138⇒ 助成金額 13,000円※千円未満切り捨て
- ・持ち物 ①令和7年度確定申告時の農業収支計算書
②減価償却資産台帳(JAで登録されている方は受付時に印刷します)
③通帳
- ・問合せ 静岡市農業政策課 電話054-354-2091
- ・受付日程 令和8年5月18日、19日 あさはた支店2階会議室

柑橘

5月は花の防除になります。開花の程度は園地ごとバラつきがあるため、自身の園地や生育状況をこまめに観察し、防除適期を逃さないようにしてください。
また、1～4年生の苗木に関しましては、樹を早く成長させるため蕾を全て摘蕾しましょう。

【防除】

・温州みかん

花と芽の競合を避けるため、3分咲き防除時に尿素500倍とリンクエース1,000倍を混用散布。

時期	病害虫名	農薬名	使用倍率	日数-回数
3分咲き期	灰色カビ病	スイッチ顆粒水和剤	3,000倍	7日-3回
	チャノキイロアザミウマ カメムシ	スタークル顆粒水溶剤	2,000倍	前日-3回
落弁期	サビダニ チャノキイロアザミウマ	グレーシアフロアブル	4,000倍	7日-2回
	黒点病	ファンタジスタ顆粒水和剤	3,000倍	14日-3回

・中晩柑

時期	病害虫名	農薬名	使用倍率	日数-回数
5月上旬 (満開時)	灰色カビ病	スイッチ顆粒水和剤	3,000倍	45日-2回
	チャノキイロアザミウマ カメムシ	スタークル顆粒水溶剤	2,000倍	前日-3回
5月中下旬	サビダニ チャノキイロアザミウマ	グレーシアフロアブル	4,000倍	7日-2回
	黒点病	ファンタジスタ顆粒水和剤	3,000倍	14日-3回

落葉果樹

作物名	時期	病害虫名	農薬名	使用倍数	日数-回数
キウイ	5月中旬	かいよう病	コサイド3000	2,000倍	収穫後から 果実肥大期まで
			クレフノン	200倍	
		クワシロカイガラムシ	モスピラン顆粒水溶剤(劇)	2,000倍	7日-3回
梅	5月上旬	黒星病	ストロビーD.F	3,000倍	7日-3回
梨	5月上旬	黒星病	ベンレート水和剤	3,000倍	前日-4回
		アブラムシ類	アクタラ顆粒水溶剤	3,000倍	前日-3回
	5月中旬	黒星病・輪紋病	ベルコート水和剤	1,500倍	14日-5回
		ハマキムシ類	ロディー水和剤(劇)	1,000倍	前日-2回
柿	5月上旬	黒星病・落葉病・うどんこ病	ベルコート水和剤	1,500倍	14日-3回
	5月中旬	チャノキイロアザミウマ	コテツフロアブル(劇)	2,000倍	14日-2回
	5月下旬	うどんこ病・落葉病・灰色カビ病	ストロビーD.F	3,000倍	14日-3回

- 梅のヤニ果が発生する園地ではヨーヒB5 1,000倍を防除時に混用散布するか、フィールドアップ（土壌改良剤）4袋/10aの施用をお勧めします。

※農薬名に(劇)が付いている農薬は購入時に印鑑が必要になります。

いちご

気象庁の3ヶ月予報では、向こう3ヶ月は気温が高い見込みで、降水量は平年並みか多い見込みです。病害虫の発生には要注意です、予防の徹底や早期の発見と防除を心掛けるようにお願いします。

《本圃》 病害虫が増えていきます、総合的防除を行いましょう。

- ・灰色カビ病 : ハウス内湿度を極力下げよう努めて下さい。
循環扇の利用や、暖房機の強制稼働（夜間や早朝の稼働）も効果的です。
- ・アザミウマ : アザミウマは地中に蛹が潜伏する生態のため、残効が長い薬剤を連続散布（3～5日間隔）することが重要です。

病害虫	薬剤名	RAC	倍率	回数	天敵	蜜蜂
うどんこ病 灰色かび病	パレード20(フ)	7	2,000～4,000倍	3	なし	1日
	カリグリーン※1	NC	800～1,000倍	—	なし	1日
灰色かび病	ファンタジスタ顆(水)	11	2,000～3,000倍	3	なし	1日
アザミウマ	ファインセーブ(フ)劇	34	1,000～2,000倍	3	なし	1日
	ベネピアOD	28	2,000倍	3	なし	1日
	ⓈディアナSC	5	2,500～5,000倍	2	14日	7日
アザミウマ・ハダニ	Ⓢグレーシア(乳)	30	2,000倍	2	100日以上	1日
アブラムシ・コナジラミ	ウララDF	29	2,000倍	2	なし	1日
ハダニ	ダニオーテ(フ)※2	33	2,000倍	2	なし	1日
	Ⓢコロマイト(水)	6	2,000倍	2	7日	1日

※1 灰色かび病は800倍で散布

※2 ダニオーテ(フ)は銅剤との混用、近接散布は薬剤の効果を著しく低下させます。14日以上はあけ下さい。

《育苗》 育苗スケジュールを立て、今後の予定を明確にしながら作業しましょう。

- 親株栽培 「ランナーの発生を促す要因は温度、水、肥料が大事です。」
 - 温度管理 : 25℃程度（ハウス内気温）
※夏場の高温期でも35℃以上にならないよう遮光、遮熱をしましょう。
 - 水分管理 : 湿度は日中60～70%を目安に管理。過湿、過乾燥に注意
※ハウス内の排水対策と過乾燥時は適宜ハウス内への散水をしましょう。
水不足はランナー発生の減少につながります、培土が乾かないように適宜灌水しましょう。また、プランターに水が溜まらないように排水対策も行う。
 - 肥料濃度 : メルコクアント試験紙で500ppm以上を推移しましょう。
- ☆育苗圃防除ローテーション☆

時 期		薬 剤	RAC	倍率	回数	主な対象病害虫
5月	第1週 (26日～2日)	セイビアー(フ)	12	1000倍	1/3	炭そ病、灰色カビ病
		カスケード(乳)	15	4000倍	1/3	ヨトウ・アザミウマ
	第2週 (3日～9日)	コサイド3000	M1	1000倍	—	炭そ病
		エコピタ(液)	—	100倍	—	うどんこ病・ハダニ・アブラムシ
	第3週 (10日～16日)	ジマンドイセン(水)	M3	600倍	2/6	炭そ病
		モベント(フ)※散布	23	2000倍	1/2	ハダニ・アブラムシ・アザミウマ
	第4週 (17日～23日)	ベルコート(水)	M7	1000倍	1/5	炭そ病・うどんこ病
		エコピタ(液)	—	100倍	—	うどんこ病・ハダニ・アブラムシ
	第5週 (24日～30日)	デラン(フ)	M9	1000倍	1/2	炭そ病
		アグリメック グレーシア(乳)α	6 30	500～1000倍 2000倍	1/2 1/2	ハダニ ハダニ・ヨトウ・アブラムシ・アザミウマ