



【防 除】

〔1 番茶摘採後〕※工場で決められた農薬がある場合、その指示に従って下さい。

アグリメック [®]	1,000 倍	赤ダニ・サビダニ ウンカ・スリップス	単用 7 日
---------------------	---------	-----------------------	--------

☆赤ダニ・サビダニが多発生の場合は、「ミルベノック乳剤・1 0 0 0 倍・7 日」

〔2 番茶萌芽期〕※工場で決められた農薬がある場合、その指示に従って下さい。

スコア顆粒水和剤	2,000 倍	炭そ病・もち病	混用 7 日
ウララDF	1,500 倍	ウンカ・スリップス	

【施 肥】 2 茶肥・・・2 番茶 摘採 30 日前 化成 3～4 袋／1 0 a

～2 番茶生産依頼について～ ☆☆☆出荷される方は履歴の提出をお願い致します☆☆☆

本年の 1 番茶情勢は昨年より単価高で推移し、最終単価も昨年を上回る見込みになります。
下物需要は堅調なことから、1 番茶合組用として形状品の 2 番茶需要がかなり高まっており、
茶商の引き合いの強さが予測されますので、積極的な 2 番茶生産をお願いします。

☆2 茶後の整枝(時期・位置)について☆ 夏場の干ばつ対策

①昨年の気象状況

- ・6 月～9 月の間に 35℃以上が 11 日、その内 8/6 には 41.4℃を記録。
本年も 7 月～8 月にかけて酷暑(35℃以上)及び少雨が予想されます。

②高温少雨による影響

- ・新芽は高熱で壊死(日焼け)するのは、45℃で半数致死、47℃以上で全滅と言われており、
35℃を超えると高気温と少雨が連日続くと茶樹は水分不足となり、翌年の母枝となる 3 番茶
芽の成育が著しく低下、1 番茶の収量品質が大きく低下することが予測されます。

③高温少雨対策

- ・灌水効果が一番高いですが下記 2 茶後の整枝時期、深さを調整して高温少雨に備えて下さい。

④2 茶後の整枝時期、深さ

- ・時期 今までより前倒しする
(遅くとも 7 月上旬までに、干ばつの影響を甚大に受けた茶園は 6 月末までに)
- ・深さ 樹勢が強い茶園 ⇒ 1 番茶摘採位置より若干深め(古葉を必ず残す)
干ばつの影響を受けた茶園 ⇒ 2 番茶摘採面を揃える程度
※輪斑病の防除をお願いします。

※葉層を確保し翌年 1 番茶の為、今までより浅めの整枝位置に心掛けて下さい。

☆静岡市支援金「農業者物価高騰対策事業費」申請手続きについて☆

- ・概要 高騰する生産資材の価格上昇分の一部を助成
- ・対象者 申請時に静岡市の認定農業者、認定新規就農者である方。
又は令和 7 年・収支決算書(青色・白色)における農産物販売額(自家消費対象外)が
5 0 0 万円以上の農業者(法人含む)で環境負荷軽減の取組みが確認できる方。
- ・対象経費 経費科目⇒ 種苗、肥料、飼料、農具、農薬、諸材料、修繕、動力光熱の 8 科目
※**燃油セーフティネット事業(重油・ガス・灯油・LNG)に関わる資産(例 暖房機・製
茶機械)を所有されている方は、動力光熱費は全て対象外になります。**
- ・対象金額 上記、対象金額の合計金額(税抜き)×0.0 1 3 8 (1.3 8 %)
- ・持ち物 ①令和 7 年度確定申告時の農業収支計算書
②減価償却資産台帳(J A で登録されている方は受付時に印刷します)
③通帳
- ・問合せ 静岡市農業政策課 電話 0 5 4 - 3 5 4 - 2 0 9 1
- ・受付日程 6 月 1 日、2 日 9 時～1 5 時美和支店で作成説明会を開催致します。

JA 静岡市

電話 296-2121 ファックス 296-2125

茶(広域担当)	深井	茶・果樹	武田	苺・そ菜・水稻	宇佐美	そ菜・苺・青壮年部	八木	女性部	平野
購買	横山、滝浪、川島			購買・地区担当		瀧田、大石、池田、中畠			

土壌診断(イチゴ・野菜)の申込受付について ※ 詳しくは別紙参照お願い致します。

- 1・提出期日 令和 8 年 6 月 11 日(木)まで
- 2・提出先 美和購買店 宇佐美・八木まで TEL 296-2121
- 3・料金について 1 検体・1,330 円(税込み)
※代金は購買代金引落し口座より翌月引き落としになります。
- 4・試料について ① 風乾した土を 3 0 0 g 程度。土は必ず乾燥し、1 mm のフルイにかけて下さい。
② 土を入れた袋には、「氏名」・「電話番号」・「作物名」・「ハウス・露地」
などを明記して下さい。



茶 茶園を観察して防除薬剤を選択して下さい。

2 番茶摘採の注意事項

【摘 採】

- ・硬葉化させないように早めの摘採を心がけましょう。(目安：1 番茶摘採後・4 2 ～4 3 日)
- ・外見の欠点は評価を落とす要因です。荒茶に「古葉・木茎」が入らないよう摘採は丁寧に。

【1 番茶後の整枝】

2 番茶を摘採する茶園

- ・時期 1 茶摘採後、2 ～3 週間以内《ナラシ時期目安・下記参照》
☆時期目安 ①みる芽⇒摘採 2 0 日後 ②普通芽⇒摘採 1 4 日後 ③硬葉芽⇒摘採 1 0 日後
- ・位置 摘採面を揃える程度に浅く

※ ナラシが早すぎると 2 番茶に銀葉が入ってしまうので気を付けて下さい。

2 番茶を摘採しない茶園

- ・時期 6 月中下旬《2 茶芽が出揃い、葉色が濃くなった頃》
- ・位置 深くても昨年の秋整枝面から一番茶摘採面の間までとし、それ以上
下げないで下さい(古葉を残す)

※樹勢が悪い園や、樹高枝が細く芽数が過多となっている園は更新して下さい。
※1 茶後に 2 茶摘採園と同様に整枝を行うと 1 回に落とす葉の量が減り作業が楽です。
※また、整枝を 2 回行うことで母枝の太さの均一化と芽数の確保を図れます。

【1 番茶後の更新】

1 番茶芽の不揃い・生育ムラ・生育不良・細枝化の改善を図れます。
寒干害のあった園では被害部を除去するように更新をして下さい。

- ・時期 1 茶摘採後、早めに
- ・位置 樹勢に応じて浅刈り・深刈り・中切り

※ 樹勢が悪い茶園・古い茶園の更新は、株枯れ等が発生する恐れがあります。

いちご

《本圃》 収穫終了まであと少し。片付け前に除塩と薬剤散布をしましょう。

(1) 病害虫防除

病害虫	薬剤名	RAC	倍 率	回数	天敵	蜜蜂
う・灰	パレード 20 (フ)	7	2,000～4,000 倍	3 回	なし	1 日
ア・ハ	㊟ グレーシア (乳)	30	2,000 倍	2 回	100 日以上	1 日
ア	㊟ ディアナ (SC)	5	2,500 倍	2 回	14 日	7 日
ア・油・コ	㊟ モベント (フ)	23	2,000 倍	3 回	45 日	45 日
ア・ハ・油	㊟ アーデント (水)	3A	1,000 倍	4 回	60 日以上	5 日

病害虫：う→うどんこ病 灰→灰色カビ病 ア→アザミウマ ハ→ハダニ 油→アブラムシ コ→コナジラミ

㊟ ：天敵や蜜蜂への影響が長い薬剤になります。ご使用には注意して下さい。

天 敵：上記表における天敵とはミヤコ、チリカブリダニへの影響日数

育苗圃の管理ポイント

- ・水と肥料は切らさない。→露地育苗では梅雨時期、肥料の流亡に注意。
IBS1 号を 10 日間隔で 3 粒/株施用。1 ヶ月で株あたり 8 粒目安(株の草勢により加減する。)
- ・わき芽や古葉、ぜに葉などは天気の良い日に整理する。風通しの良い環境を作る。
- ・ランナー受けは 5 月下旬～6 月中旬を目安に行う。(紅ほっぺ・章姫の場合)
- ・親株 1 株からの採苗は 20～25 本を目安に行う。
- ・切り離し時期は 7 月下旬を目標に行う。育苗期間 45～50 日を確保する。

育苗期防除ローテーション

	殺菌剤	RAC	殺虫剤	RAC	対象病害虫
6 月 1 週目	アントラコール(顆水)	M3	エコピタ液剤	気門	炭、ダ、ア、コ
6 月 2 週目	キノンドー (フ)	M1	プレオ (フ)	UN	炭、ヨ、ス
6 月 3 週目	オーソサイド (水)	M4	エコピタ液剤	気門	炭、灰、う、ダ、ア
6 月 4 週目	ジマンダイセン (水)	M3	コテツ (フ) ㊟	13	炭、ス、ヨ、ダ

※炭→炭そ病 う→うどんこ病 ア→アブラムシ コ→コナジラミ ス→スリップス

ヨ→ヨトウ ダ→ダニ 灰→灰色カビ病

必ず使用倍率・回数の確認をお願いします！！

- ・梅雨時期には耐雨性の展着剤「アピオンE」で防除効果が安定。(屋外)

女性部

＜行事・会議＞

- 6/ 1(月) 13:30～ 女性部本部委員会【本店】
- 6/ 3(水) 13:30～ 女性部役員会【美和】
- 6/12(金) 9:30～ JA 遠州夢咲視察受入【本店】
- 6/12(金) 13:30～ 助け合い G 代表者会議【本店】
- 6/17(水) 13:30～ 漬物教室【本店】
- 6/24(水) 東洋綿業視察旅行【愛知】
- 6/29(月) 13:30～ 加工衛生講習会【クラシック】

＜サークル＞

- 北部ピアノ
- フラダンス
- 銭太鼓
- フラワーアレンジ

水稻

- 1. 育苗 ① 育苗期間 20 日で草丈 10～15cm、本葉 2～2.5 枚を目標
- ② 育苗には水道水などのきれいな水を使うこと
- ③ もみ枯細菌病予防のため発芽時には 30℃以上にならないように注意する

2. 元肥の施用(10a)

元肥は田植え予定日の 1 週間以内に施用すること

品種 コース	ひとめぼれ キヌヒカリ	コシヒカリ	きぬむすめ ヒノヒカリ	あいちのかおり にこまる、葵美人
化成	マップ 202			
	2 袋	1.5 袋	2 袋	2 袋
有機	もとごえペレット			
	2.5 袋	2 袋	2.5 袋	2.5 袋
省力	ジェイコシ 18 号		ナイスワンパワー	
	2.5 袋	2 袋	2.5 袋	

3. 田植時育苗箱処理

- ① 箱粒剤 どの薬剤も効き目長持ち 2 ヶ月間！

基本	ブーンレパード箱粒剤	50g / 箱	移植 3 日前～移植当日
低コスト	ツインターボ箱粒剤		播種時～移植当日(覆土前使用可能)
ウンカ重点	フルスロットル箱粒剤 ※1		播種時～移植当日(覆土前使用可能)
カメムシ重点	ゴウケツバスター箱粒剤 ※2		移植当日

- ※1 フルスロットル箱粒剤…秋ウンカまで効果有あり！
- ※2 ゴウケツバスター箱粒剤…カメムシの早期防除が可能！！

- ② 除草剤(10a)→水もちの悪い水田には粒剤を使用し、田植直前・直後・中干剤の体系処理がおすすめ！

田植直前	サキドリ EW	500ml	① 代かき時※②田植直後いずれか 1 回	
田植直後 (一発処理剤)	エンペラー 1 キロ粒剤	1 k g	田植直後～収穫 60 日前 まで	広葉雑草の多い圃場向け
	カイリキ Z ジャンボ	300 g (30g×10)	移植後 3 日～30 日まで	ヒエ・雑草が多い圃場向け

- ③ 水の管理 田植後～活着 水深 4～6cm 程度の深水とし、活着を促す。
- ④ 活着後 水深 2～4cm 程度の浅水とする。ガス抜きをする場合、1～2 日間落水する。
※サキドリ EW は①の代かき時に使用した場合は田植まで 7 日間開けてください。

4. スクミリンゴガイ(ジャンボタニシ)の防除

スクミノン	1～4 kg/10a	移植後 但し、収穫 60 日前まで	— 2 回
-------	------------	-------------------	-------

農薬散布後の止水期間は7日間です！

水田用除草剤や本田粒剤の散布後7日間は落水やかけ流しをしないように注意しましょう

令和8年度駿府本山秋のお茶祭り参加者募集について

毎年11月に開催しています秋のお茶祭りを静岡歴史博物館前にて本年も開催を計画しております。興味のある方に置かれましては、是非ご参加ください。

参加条件、①駿府本山事業に参加、協力頂ける方、②井川お茶蔵に保管(JAで預かり入庫)し熟成本山茶を当日販売する方です。申し込み多数の場合は、抽選といたします。

詳しい内容、問合せはJA静岡市営農課深井まで(288-8440)

