

しづはた購買店だより

静岡市葵区下 1459-1 ☎294-9330 FAX294-1635

購買：山下・谷米・竹澤	配送：白鳥	
購買・地区担当	昭府地区担当：海野	大河内地区担当：川嶋
北部営農センター（しづはた担当）	茶：折山	蔬菜・苺・水稻：石井
	果樹：伊藤	女性部：大越

《 お茶 》

今年の1番茶情勢は昨年より単価高で推移し、最終単価も昨年を上回る見込みになります。
下物需要堅調なことから、1番茶合組用として形状品の2番茶需要がかなり高まっており、茶商の
引き合いの強さが予測されますので、積極的な2番茶生産をお願いします。

茶栽培のポイント2点に意識してください。

- ☆更新作業を行い、力強い芽重型の内容が濃い生葉生産に努める。
- ☆母枝肥・秋肥をしっかりと施肥する。1番茶の味・香りに大きく影響します。



【 1番茶後 整 枝 】

2番茶を摘採する茶園

時 期 遅れ芽がほぼ出揃った頃 1番茶摘採から10日～14日

整枝位置 1番茶摘採面を揃える程度にごく浅く
1番茶が伸びて、浅く摘採した園は一葉（一節）残した位置で整枝

2番茶を摘採しない茶園

翌年の1番茶の芽が不揃いになる可能性がありますので、母枝の太さと芽数の均一化を図る為に1番茶後に通常の整枝を行って下さい。

1回目整枝（2茶前の整枝と同じように行ってください）

時 期 1番茶終了後（通常の2茶前の整枝と同じ頃）

整枝位置 1番茶摘採位置（通常の2茶前の整枝と同じ位置）

2回目整枝

時 期 6月中下旬 2番茶が充実して葉色が濃くなった頃

整枝位置 平 地…昨年の秋整枝位置から一番茶摘採面の間で、やや深めに行う。
山間地…葉層を10cm確保する為に2茶摘採の様に2茶を一節残す。

【 2番茶 摘 採 】

1番茶摘採から42～43日後を目安に摘採ください。

※ 梅雨時期と被るので、天気予報を確認して早めの摘採計画を立ててください。

【 更 新 】 来年に向けて力強い芽を作ろう

枝が細く小葉や葉層が薄く樹勢が弱い茶園については、1番茶摘採後ただちに更新を行って下さい。深さを決めるには、枝の構成（枝の太さ、本数）をよく観察し、樹勢にあった更新（浅刈り、深刈り、中切り）をして下さい。

【 2茶後の整枝(時期・位置)について 】

・高温少雨による影響

本年も7～8にかけて酷暑日(35℃以上)及び少雨が予測されます。

新芽は高熱で壊死(日焼け)するのは、45℃で半数致死、47℃以上で全滅と言われており、35℃を超える高気温と少雨が連日続くと茶樹は水分不足となり、翌年の母枝となる3番茶芽の生育が著しく低下、1番茶の収量品質が大きく低下することが予測されます。

・高温少雨の対策

灌水効果が一番高いですが、下記2茶後の整枝時期、深さを調整して、高温少雨に備えて下さい。

・2茶後の整枝時期、深さ

① 時期 今までより、前倒しする

（遅くても7月上旬までに、干ばつの影響を甚大に受けた茶園は6月末までに）

② 深さ 樹勢が強い茶園 ⇒ 1番茶摘採位置より若干深め(古葉を必ず残す)

干ばつの影響を受けた茶園 ⇒ 2茶摘採面を揃える程度※輪斑病の防除をお願いします。

※ 葉層を確保し翌年1番茶の為、今までより浅めの整枝位置 に心掛けて下さい。

【 施肥 】 ・2茶肥 2茶摘採 30日前 化成肥料 3～4袋/10a当たり
・母枝肥 2茶摘採後の時期 化成肥料 3～4袋/10a当たり

【 防 除 】 1番茶整枝後

カンザワハダニ・チャノナガサビダニ } 劇 アグリメック
ウンカ・スリップス・チャノコカクモンハマキ } 1,000倍 7日

◎ クワシロカイガラムシの被害がある場合は、6月最上旬までに防除。

アプロードエースF 1,000倍 14日 単用 又は
コルト顆粒水和剤 2,000倍 7日 単用

※ 5化幼虫期の判定は、枝を持参いただければ行うことができます。

2番茶萌芽期 ～ 1葉期

炭そ病・もち病 スコア顆粒水和剤 2,000倍
ウンカ・スリップス ウララDF 1,500倍

※ 降雨が続くと「もち病」の発生が予想されるので、防除を徹底して下さい。

◎カンザワハダニ発生園は、劇 コテツフロアブル 2,000倍 7日
（※ウンカ・スリップス・サビダニ同時防除）

◎ツマグロアオカスミカメ発生が予測される園は、
スタークル顆粒水溶剤 2,000倍 7日

「 令和8年度 駿府本山 秋のお茶まつり参加者募集 」について

毎年11月に開催しています秋のお茶祭りを静岡歴史博物館前にて本年も開催を計画しております。
興味のある方に置かれましては、是非ご参加ください。

参加条件 ① 駿府本山事業に参加、協力頂ける方

② 井川お茶蔵に保管（JAで預かり入庫）し熟成本山茶を当日販売する方です。

申し込み多数の場合は、抽選といたします。

詳しい内容や問合せは JA静岡市 営農課：深井まで（TEL：288-8440）

いちご

＜育苗＞ランナー受け開始の時期です。炭そ病予防を重点に行いましょう。

(ア) 親株管理

- ① IB化成S1号の場合：親株1株あたり10日で3粒もしくは14日で4～5粒を施用。
- ② 給液管理の場合：EC0.5～0.6を目安に給液。（6月の目安：500～1,000ml/株/日）
→灌水不足はランナー発生の減少に繋がります。培地が乾かない様に適時灌水して下さい。
→培土や灌水チューブの種類によって灌水量や頻度が異なります。
→過湿には注意して、プランターや圃場内の排水対策を行いましょう。

(イ) 炭そ病対策 ～出さない、広げないを徹底しましょう～

- ① 作業開始前に怪しい株の除去をしましょう。（拡大させない！！）
→炭疽病と思われる株を触った際は必ず、手袋等を交換し鉢などの道具も再度消毒する。
→農薬散布により胞子は500cm以上飛散
→頭上灌水により胞子は120cm程度飛散
- ② 出さない環境づくり
・葉が濡れている時間が長いほど病気になりやすい為、循環扇や扇風機を活用し乾きを促す。
・資材は必ずイチバン（500～1,000倍、瞬時浸漬）等で消毒したものをを用いる。
※葉かきに使用するハサミなどの作業道具も消毒しましょう。
・ランナーが過密とならないよう親株の古葉やわき芽の整理し、ランナーの側枝は除去する。
- ③ 親株・子株ともに点滴チューブを利用した灌水を推奨します。
→灌水チューブから出る熱水対策として自動排水弁（チェックバルブ等）や白色チューブの利用をお勧めします。
→水はね防止、葉をできるだけ濡らさないように意識しましょう。
- ④ 傷口のできる作業を行った際は消毒を実施して傷口からの侵入を防ぎましょう。
→コサイド3000等使用回数制限のない薬剤を使いましょう。
- ⑤ 薬剤散布は予防主体として（M1、M3、M4、12）ローテーション防除を行いましょう。
- ⑥ 子株側から親株側へ散布することで子株への感染拡大リスクを抑えましょう。


育苗圃病害虫防除ローテーション（先月号の続きです）

時 期		薬 剤	RAC	倍率	主な対象病害虫
6月	第 1 週 (31 日～6 日)	アントラコール（顆水）	M3	500 倍	炭そ病
		エコピタ（液）	—	100 倍	うどんこ・ハダニ・アブラムシ
	第 2 週 (7 日～13 日)	キノンドー（フ）	M1	500~800 倍	炭そ病
		プレオ（フ）	UN	1,000 倍	ヨトウ
	第 3 週 (14 日～20 日)	オーソサイド（水）	M4	800 倍	炭そ病
		エコピタ（液）	—	100 倍	うどんこ・ハダニ・アブラムシ
	第 4 週 (21 日～27 日)	ジマンダイセン（水）	M3	600 倍	炭そ病
		コテツ（フ）	13	2,000 倍	ハダニ・ヨトウ・アザミウマ

★今年も暑い夏になることが予想されます！！

高温対策でハウス内を「いちごと生産者の双方が過ごしやすい」好適な環境にしましょう！

- ・風通しを良くする ⇒ ハウスをあける、妻面のビニールを除去する、扇風機を回す
- ・温度を下げる ⇒ ①遮光資材（寒冷紗・塗布剤）を使用する
②気化熱を利用した育苗資材（紙ポット等）で根傷みを防ぐ



水稻

●元肥の施用（10a）

元肥は田植え予定日の1週間以内に施用すること

品種 コース	ひとめぼれ キヌヒカリ	コシヒカリ	きぬむすめ ヒノヒカリ	あいちのかおり にこまる、葵美人
土づくり	けい酸加里プレミアム34 または ネバリン 2～3袋			
化成	マップ202			
	2袋	1.5袋	2袋	2袋
省力	ジェイコシ18号 2.5袋	ジェイコシ18号 2袋	ナイスワンパワー 2.5袋	にこ・モチー発244 2袋



●田植時育苗箱処理

① 箱粒剤 普通期田植えて7月末頃まで防除不要

基本	ブーンレパード箱粒剤	50g/箱	播種時～移植当日
低コスト	ツインターボ箱粒剤08		播種時～移植当日
ウンカ防除重視	フルスロットル箱粒剤		播種時～移植当日
カメムシ防除重視	ゴウケツバスター箱粒剤		移植3日前～移植当日

② 除草剤（10a） 水もちの悪い圃場では体系処理（初期剤→1^ホ粉剤→中後期剤）とする。

エンペラー1キロ粒剤	1kg	移植直後～ノビエ3葉期 但し収穫60日前まで
ラオウ1キロ粒剤	1kg	移植直後～ノビエ2.5葉期 但し移植後30日まで

I 水の管理 田植後～活着 水深4～6cm程度の深水とし、活着を促す。

II 活着後 水深2～4cm程度の浅水とする。ガス抜きする場合、1～2日間落水する。

●スクミリンゴガイ（ジャンボタニシ）の防除

スクミノン	1～4kg/10a	移植後 但し、収穫60日前まで — 2回
-------	-----------	----------------------

野菜・苺・花卉土壌診断の実施について

★分析項目7項目（pH、EC、石灰、苦土、加里、リン酸、腐植）



☆分析料金：1検体1,330円（税込） 代金は後日、購買代金として引き落します

☆提出締切：6月10日（水）までにしづはた購買店までご提出ください。（担当：石井）

☆サンプリング方法

- (1)圃場内の5ヶ所位から採土し、混合する※
- (2)日陰で新聞紙の上に広げて、よく乾燥させる
- (3)土塊を砕き、1mm目のふるいにかける
- (4)ふるいにかけた乾いた土400g以上を袋に入れる
- (5)「住所」・「氏名」・「電話番号」・「作物名」・「施設・露地」などを明記して提出する

※右の図のようにそれぞれの場所で表土を外して
深さ15cm程度V字型に掘り斜面に沿って2cm採土する



農薬購入時には印鑑を！

毒劇物に指定されている農薬は◎と表記してあります。購入の際には必ず印鑑（認印）をご持参ください。

《柑橘》

本年産の青島温州の満開が福田ヶ谷では5月5日前後、大平では5月10日前後と非常に早い状況でした。着花量・春芽の発生状況からみると良い状況と思われますので、病虫害防除等適期を逃さないようにして下さい。

●温州みかん

防除時期	対象病虫害	農薬名	希釈倍率	使用基準
6月上旬 (最上旬)	ミカンハダニ	マシン油乳剤 97%	150倍	前日—3回 30日—4回
	カイガラムシ類	エクスレル SE	5,000倍	
	チャノキロアザミウマ 黒点病	ペンコゼブ水和剤	600倍	

※マシン油の散布後3日間は、雨にあたらなように、天気予報に注意し散布する。

●夏肥について

5月から6月にかけて樹体の養分競合が激しく、夏場の養分吸収が一番良い時期になるので施用時期が遅れないように実施をお願いします。肥料の遅効きは果実の着色遅れの原因になりますので、施肥は6月上旬に完了させてください。

●中晩柑

防除時期	対象病虫害	農薬名	希釈倍率	使用基準
5月下旬	かいよう病	ICボルドー 412	50倍	—
6月上旬	ミカンハダニ	マシン油乳剤 97%	150倍	前日—3回 90日—4回
	チャノキロアザミウマ	エクスレル SE	5,000倍	
	黒点病	ペンコゼブ水和剤	600倍	

※ ICボルドー散布後、マシン油散布は、2週間程間隔を空けて下さい。

《落葉果樹》

対象作物 防除時期	対象病虫害	農薬名	希釈倍数	使用基準
いちじく 6月上・下	疫病	Zボルドー クレフノン	1,000倍 200倍	—
	アザミウマ類	ダントツ水溶剤	2,000倍	
6月上中旬	カミキリムシ類	ダニサラバフロアブル	2,000倍	3日—3回
6月下旬	カンザワハダニ	ダニサラバフロアブル	2,000倍	前日—2回
6月上旬 梨 中旬 下旬	輪紋病・黒星病・うどんこ病	ナリア WD G	2,000倍	前日—3回
	ハダニ類	コロマイト水和剤	2,000倍	前日—1回
	シンクイムシ類・コナカイガラムシ	スタークル顆粒水溶剤	2,000倍	前日—3回
柿 6月上旬	チャノキロアザミウマ	劇モスピラン顆粒水溶剤	2,000倍	前日—3回
	カイガラムシ類	オンリーワンフロアブル	2,000倍	前日—3回
	うどんこ・落葉病	アクタラ顆粒水溶剤	2,000倍	3日—3回
6月中下旬	カキノヘタムシガ	ベルコート水和剤	1,500倍	14日—3回
	チャノキロアザミウマ 落葉病・うどんこ病	ベルコート水和剤	1,500倍	14日—3回
ぶどう 落花直後	チャノキロアザミウマ	コルト顆粒水和剤	3,000倍	前日—3日
	晩腐病・灰色かび病・ベと病	ストロビードライフフロアブル	3,000倍	14日—3回
袋掛け直前	チャノキロアザミウマ	劇アドマイヤー顆粒水和剤	5,000倍	21日—2回