

2026

6月

美和地区営農購買だより

JA静岡市

電話 296-2121 FAX 296-2125


茶(広域担当)	深井	茶・果樹	武田	専・専菜・水稲	宇佐美	専菜・専・青壮年部	八木	女性部	平野
購買	横山・滝浪・川島	地区担当	瀧田・大石	配送担当	池田・中島				
内牧・美和・足久保地区	大石 080-9772-5227	松野・玉川・井川	瀧田 080-4110-5438						

※ 購買・注文に関するお問い合わせは 上記地区担当携帯か美和購買店 ☎296-2121 まで

購買土曜営業休業のお知らせ 7月4日(土)

夏っ得フェア開催のため、お休みさせていただきます。

皆様方には大変ご迷惑をお掛けしますが、よろしくお願いします。



ふれあい夏っ得フェア

開催日: 7月4日(土)・5日(日)

9:00~16:00 9:00~15:00

会場: JA静岡市本店 特設会場

☆ 来場者へ粗品プレゼント!

☆ 缶詰・お菓子釣りコーナー(有料)

☆ たまごつかみどり(有料、5日のみ)

農機具から食品まで各種揃えて、皆様のご来場お待ちしております!

青色専従者 源泉徴収簿 作成事務説明会

青色専従者がいる方は、上半期分の源泉徴収についての説明等を行います。

なお、納入期限は7月10日ですので、自身で納入等される方は期日までにお願いします(ゼロの方も期日までに税務署等に書類をする必要がありますが、下記にご出席の方は、農協でまとめて提出等をさせていただきます)。

日時 7月6日(月) 9時00分~10時30分 場所 美和支店2階会議室
(時間内で随時受け付けますので都合の良い時間にお越し下さい)


持ち物 ①源泉徴収簿 ②納付書 ③貯金の印鑑 ④計算機及び筆記用具 ⑤前年度の控え

65歳以上の農業者は発汗量が多く脱水症になりやすいです!

汗から塩分も多く失われてしまうため、大目に補給する必要があります。

発汗時の水分補給には、電解質(イオン)バランスのとれた飲料が、効率よくカラダに吸収され、長時間カラダをうるおしてくれます。

熱中症対策!

ポカリスエット
300ml×24本
3,150円熱中対策水 3,250円
500ml×24本ポストニックウォーター
500g×24本 2,500円

配達やご贈答用の包装も承ります☆

美和地区営農購買だより 令和8年6月20日発行

茶

暑い時期がやってきます。体調管理・事故に十分注意してお過ごしください。

【2番茶後の整枝】

☆ 1番茶以降、ハサミを入れずに秋整枝のみにすると翌年の1番茶芽が不揃いになり収量も減少するため、必ず整枝を行ってください。

時期 2番茶摘採 10~14日後

※ 2番茶を摘採しない園では6月下旬~7月最上旬まで(2茶芽が出揃った頃)

位置 2パターンあります。茶園の状態を見て判断しましょう。

① 2茶の摘採面を揃える程度 ⇒ 葉層を確保し、樹勢回復を目指します。

※ 例年、輪斑病が多発する園では感染した枝を落すために摘採面より2cm落として防除をお願いします。

② 1茶の摘採面~昨年の秋整枝面の間 ⇒ 芽数を確保しつつ芽重茶園を目指します。

☆ 整枝位置が深いと夏場の干害を受けやすくなり、来年の1番茶の品質に影響します。

また、枝数が少なくなり、秋整枝面の着葉密度が小さくなります。

※ 遅い時期の更新作業は避けてください ⇒ 3番茶の生育に影響します。

【1茶後に更新をした茶園の整枝】

〈時期〉 再生芽が平均15cm程度伸びた時期(葉が5~6枚着いた頃、再生芽が青茎から木化した頃)

・日数の目安 ⇒⇒ 深刈り更新園 更新後50日~60日

中切り更新園 更新後60日~70日

〈位置〉 更新した位置から5cm程度上(新葉が2枚程度残る高さ)

※ 但し、生育が遅く、7月末までに再生芽が充分伸びない場合は、秋に整枝を行うようにしてください。

日数より、芽の大きさを優先して下さい

※夏場の干ばつ対策※

☆ 灌水の実施(灌水施設整備園等)

☆ 2茶後の整枝時期によりその後の3茶芽生育が左右されますので、整枝時期の前倒し及び整枝深さを調整する

(前年に干ばつの影響を甚大に受けた茶園は、6月末までには完了する)

【2茶整枝後の防除】

ディアナ SC	5,000倍	ハマキムシ類(シャクトリ、チャハマキ、コカクモン)	前日・単用
---------	--------	---------------------------	-------

輪斑病の発生が予想される園では、整枝直後にテブロスフロアブル 1,000倍(14日)

または、アミスター20フロアブル 2,000倍(14日)を散布する。

【3茶萌芽~1葉開葉期の防除】

フロンサイド SC	2,000倍	炭そ病、もち病、新梢枯死症、褐色円星病	混用
コルト顆粒水和剤	2,000倍	ウンカ、スリップス、チャゲコナジラミ	14日

※ フロンサイドは皮膚に付着するとかぶれる可能性があるのをご注意ください。

気になる方は、ダコニール 1000 を 1,000倍で使用してください。

【クワシロカイガラムシ】(2回目の防除適期 7月中旬頃) ※ 10a当 1,000L

コルト顆粒水和剤[2,000倍・7日] 又は、アフロートエースフロアブル[1,000倍・14日] など

栽培・購買に関するお問い合わせは 美和購買店へ ☎296-2121

いちご

6/7に東海地方が梅雨入りをしました！！天候に注意して作業を行いましょう。

本圃の準備

これから暑さが厳しくなってきます！体調管理には十分気を付けてください！

1. 本圃除塩

土耕栽培：ビニールを外し、雨にあてる。又は、水田転作地ではたん水状態にする。

高設栽培：液肥を切り、水のみ 14 日間程度流し、いちごに養分を吸わせた後、株を処分する。じょろ口などを使用し、灌水ホースでベンチ上から水をかけ、洗い流すのも有効です。

2. 本圃土壌消毒

使用するフィルムは0.03 mm以上の厚手の農ポリもしくは農ビを。(黒マルチ等は×)

・クロルピクリン錠剤(土 OK、培土 OK)

→30 cm×30 cm間隔で 1 錠もしくは 1 m²あたり 10 錠

→気化したガス成分が効果を発揮。

→土壌を極力乾燥させてから施用することが重要。軽く握って2～3個に崩れる程度(含水率 10%以下)※基本ガス抜き不要 ※処理日数 約 10 日(地温 25～30℃)

・バスアミド微粒剤(土 OK、培土 NG)

→ 20～30 kg/10a

→水分にて分解し、ガスが発生することで効果が発揮。

→水分量は土壌を握って崩れない程度がベスト。(含水率 50%)※ガス抜き必要

・熱消毒：たっぷり灌水して、厚手のフィルムで被覆する。

3. 土壌改良

土耕栽培：物理的改善に スーパーベラボン(ヤシガラ)…3年に1度

あく抜きと無処理のものがあります。導入する量にもよりますが、あく抜きのものをオススメ致します。

高設栽培：7 年以上の培土は排水等が悪くなってくるので、5 年以上使用している場合は少しずつでも、プランター内培土の総入れ替えをおすすめします。

4. 親株肥培管理 (メルコクアント試験紙で 500ppm以上を推移しましょう。)

・IB化成S1号の場合：親株 1 株あたり 10 日で 3 粒もしくは 14 日で 4～5 粒を施用する。

※給液チューブの場合は水のかかる場所に IB 化成があるように配置して下さい。(加水分解のため。)

・給液管理の場合：EC 0.5～0.6 を目安に給液。(親株)

※培土の乾燥防止のため多頻度灌水を基本とし、7 月は目安として一日株あたり 600～1,000ml 程度あげて下さい。

5. 育苗期ローテーション散布 先月号の続き・・・

「炭そ病の発生には十分に注意してください。高温多湿条件にならない様に、圃場排水の整備や妻面の除去など環境管理にも気を付けて下さい。」

	殺菌剤	RAC	殺虫剤	RAC	対象病虫害
7月1週目	デラン(フ)	M9	エコピタ液剤	気門	炭、う、ダ、ア
7月2週目	セイビアー(フ)	12	アグリメック	6	炭、ダ
7月3週目	ジマンダイセン(水)	M3	エコピタ液剤	気門	炭、う、ダ、ア
7月4週目	ベルコート(水)	M7	グレーシア(乳)※	30	炭、う、ス、ダ

※グレーシアは天敵放飼前 100 日以上なので、早めに放飼する場合は注意が必要です。

①まず第一に作業開始前に怪しい株の除去をしましょう。(拡大させない！！)

→炭疽病と思われる株を触った際は必ず、手袋等を交換し鉢などの道具も再度消毒する。

→胞子は農薬散布により 500 cm以上飛散、頭上灌水により 120 cm程度飛散。

②点滴チューブ等を使用してソフトな灌水とする。(泥はね、水はねを防止する。)

③葉かきなどの作業は晴天日に実施する。傷口保護の為、作業の後には必ず薬剤散布をする。

炭疽病対策

水稻

1. ガス抜き

・特にどぶどぶした水田やレンゲ、雑草、ワラ等をすき込んだ水田で実施

・翌日が晴れの日の前日に落水して次の日の夕方に入水する

2. 中干し

・田植え後 30～35 日頃に 1 株 18～20 本の分けつが確保できたら開始する

・表面がヒビ割れする程度に 7～10 日間を目安に実施(乾田・やせ地は短く実施する)

3. 除草剤

・雑草が残っている場合に中干し時に下記のいずれかの薬剤を散布する

・いずれの薬剤も雑草が大きくなると効果が劣るので葉枚数 5 枚までに散布すること

(10aあたり)

ヒエ専用	クリンチャーEW	100ml/10a	混用可
広葉雑草	MCP ソーダ塩	200g/10a	
ヒエ・広葉	クリンチャーバス ME 液剤	1,000ml/10a	展着剤不要
ルイ・広葉	ロイヤント乳剤	200ml/10a	展着剤不要

素早い効果で
ルイなど大きな広
葉雑草に効果的
散布後 2 時間後の
雨でも効果大！

ジャンボタニシ対策

今年も発生が見られます！

スクミノン	1～4 kg/10a	60 日前-2 回
-------	------------	-----------

- ・田植え後 2～3 週間は浅水管理(水深 4cm)
- ・例年発生の多い水田は上記の薬剤を処理

令和8年度水稻農作業標準料金表(参考)(税込)

作業名	単位	料金	備考
荒起こし	10a	18,700円	3月以降に実施
崩し再耕	10a	13,310円	
代かき	10a	18,150円	
田植え	10a	13,310円	植付けのみ
苗(箱)	1箱	1,100円	培土・粃代含む

スイートコーン

アワノメイガの防除適期は①雄穂出穂初期②雌肥大期です。防除適期を逃さず防除を！

アワノメイガ	トレボン(乳)	1,000 倍	7 日前-4 回
	デナボン(粒) 5	4～6 kg/10a	21 日前-2 回
	プレバソン(フ) 5	2,000 倍	前日-3 回
	フェニックス(顆水)	2,000～4,000 倍	前日-2 回
アブラムシ	アディオ(乳)	2,000～3,000 倍	14 日前-4 回

Ⓢと表記してある毒劇物 指定農薬は、購入の際に必ず印鑑(認印)をご持参ください。

女性部

＜行事・会議＞

7/ 1(水) 13:30～ 「桃」料理教室【本店】

7/ 3(金) 16:30～ 親睦会七夕まつり【美和】

7/ 7(火) 14:00～ 朝市加工 G 会議【本店】

7/ 8(水) 13:30～ 生活講座①「特殊詐欺」【菓科】

7/ 9(木) 9:30～ 玉川営農講座【玉川】

7/ 9(木) 13:30～ 井川営農講座【井川】

7/22(水) 13:30～ 生活講座②「交通安全」【じはた】

7/24(金) 14:15～ 美和営農講座【美和】

＜サークル＞

フラダンス 7/7,21(火) 20:00～【内牧】

銭太鼓 7/ 9(木) 19:30～【美和】

北部料理 7/10(金) 9:30～【内牧】

ピアノ 7/21(火) 13:30～【菓科】

フラワーアレンジ7/27(月) 19:30～【美和】

7/28,29(火,水) 13:00～ ソーセージ作り【本店】