

東部購買店便利

茶	苺・水稲・蔬菜	柑橘・果樹	女性部（しづはた兼任）	購買
松尾	松尾・小柳・奥田	大塚	大越	橋本・萩原・中村（早）・鈴木・田山 中村（則）・松下



Three cartoon owls are shown. The owl on the left is winking with its right eye. The owl in the middle is holding a book. The owl on the right has a heart shape on its chest.

7/4（土）の土曜購買店はお休みとなります。ご了承ください。

茶 【防 除】

時 期	病害虫名	薬 剤 名	倍 数	日数	使用 方法
2 番 茶 整 枝 後	ハ マ キ ム シ 類	デ ィ ア ナ S C	5, 000倍	前日	単
輪斑病の発生が予想される場合混用		アミスター2070アブル	2, 000倍	14日	単
3 番 茶 萌 芽 期	炭 疽 病 ・ も ち 病 新 梢 枯 死 症	フ ロ ン サ イ ド S C	2, 000倍	14日	混
	ウンカ・スリップス	コルト顆粒水和剤	2, 000倍		

※生育が遅く、7月末までに十分伸びていない場合は、秋に整枝してください。

落葉果樹

作物名	時 期	対 象 病 害 虫	使 用 農 薬 名	希釈倍数	使用基準
柿	7月上旬	落葉病・炭そ病	エムダイファー水和剤	500 倍	45 日－2 回
		カメムシ類	スタークル顆粒水溶剤	2,000 倍	前日－3 回
	7月中旬	ヘタムシガ・ハマキムシ	フェニックスフロアブル	4,000 倍	7 日－2 回
		カメムシ類	キラップフロアブル	2,000 倍	7 日－2 回
梨	7月上旬	輪 紋 病	ベンレート水和剤	3,000 倍	前日－4 回
		ハマキ・シンクイムシ	フェニックスフロアブル	4,000 倍	前日－2 回
	7月中旬	ハマキ・シンクイムシ	テルスター水和剤	1,000 倍	前日－2 回
		輪紋病・黒星病	ストロビードライフフロアブル	3,000 倍	前日－3 回
	7月下旬	シンクイムシ・カメムシ	スタークル顆粒水溶剤	2,000 倍	前日－3 回
キウイ	7月上旬	果実軟腐病	ロブラール水和剤	1,000 倍	前日－4 回
	7月中旬	クワシロカイガラムシ	コルト顆粒水和剤	3,000 倍	前日－3 回

水稻


1. ガス抜き
特に前年の稲藁、雑草を多くすきこんだ場合や、荒起こしが遅かった場合に行う。
⇒ 1～2日間程度。(活着期)
2. 中干し
(1) 田植 30～35 日後を目安に、1 株 18～20 本の分けつを確保したら中干しを開始する
(2) 中干しは表面がヒビ割れする程度(7～10日間)とし、肥沃田や排水不良田は強め、やせ地は弱めとする
(3) 特に元肥一発肥料を施用した田では、中干し時期を厳守する

3. 除草剤(中後期剤)
中干し時に下記のいずれかを散布する 10aあたり
どの薬剤も雑草が大きくなってからは効果が劣るためノビエ5葉期までに散布を行う

ヒエ専用	クリンチャーEW	100ml	収穫 30 日前まで	混用可
広葉雑草	MCP ソーダ塩	200g	収穫 60 日前まで	
ヒエ&広葉	クリンチャーバス ME ※1	1,000ml/10a	収穫 50 日前まで	展着剤不要
	ロイヤント乳剤 ※2	200ml/10a	収穫 45 日前まで	

- ※ 1,葉害が出やすいため、雑草を良く露出させ葉茎散布
※ 2,ホタルイ・クログワイ等が多い場合はクリンチャーバス ME を使用する。

4. 中干し後の水管理
(1) 中干し後、3 日～数日おきに間断かん水とする
(2) 穂ばらみ期～出穂期は、水を最も必要とするのでたん水する
(3) 出穂後は、間断かん水に戻す



☞ポストニックウォーター 贈答用にもどうぞ♪

¥2,500

- ★ 畑作業のおともに、
- ★ お風呂上りの水分補給、
- ★ リラックスタイムに♪

本物果汁入
スパークリングみかん
¥3,100





小川珈琲

☞ブラック・カフェオレ

¥2,700

つぶらなカボス
¥4,380



★開催期間

6月26日(金)・27日(土)

★時間

AM9時～PM3時

★会場

ツインメッセ静岡(北館)
(静岡市曲金3丁目1-10)

2日間限定!
お得なこの機会をお見逃しなく!



いちご

6/7に東海地方が梅雨入りをしました。天候に注意して作業を行いましょう。

《本園》 片づけと来作に向けた準備

① 除塩

土耕…ア. たん水状態(水田)にする イ. ビニールをとり雨にあてる ウ. ソルゴー等を栽培し、圃場の外へ持ち出す。(いずれかの方法で処理する)

高設…収穫終了後14日程度は原水のみ流し、いちごに肥料を吸わせてから株を処分
じょろ口などを使用し、灌水ホースでベンチ上から水をかけ、洗い流すのも有効です。

「土壌消毒」使用する被覆シートは0.03mm以上の厚手の農ポリもしくは農ビを。(黒マルチ等は×)

クロルピクリン錠剤● (土OK、培土OK) 30cm×30cm間隔で1錠もしくは1㎡あたり10錠

- ・処理日数 約10日(地温25～30℃)
- ・基本はガス抜き不要。秋冬期などガス抜けに不安が残る際は実施。
- ・土壌を極力乾燥させてから施用することが重要。軽く握って2～3個に崩れる程度。
→被覆したビニールフィルムに水滴がつく程度。

バスアミド微粒剤● (土OK、培土NG) 20～30kg/10a

- ・処理日数7～10日(地温25℃以上)
- ・ガス抜き2回以上必須。(3日間隔)
- ・水分量は土壌を握って崩れない程度がベスト。(含水率50%)

② 土壌改良

土耕…物理性改善にベラボン(スーパーベラボン・ベラボン5M) / 3年に1度

高設…長年使っている栽培槽では断根シートが目詰まりや培土の腐食が進んでいます。

断根シートや培土の定期的な交換を行い、排水対策をしましょう。(培土交換目安:10年)

《育苗》親株肥培管理(メルコクアント試験紙で500ppm以上を推移しましょう。)

- ① IB化成S1号の場合:親株1株あたり10日で3粒もしくは14日で4～5粒を施用する。
※給液チューブの場合は水のかかる場所にIB化成があるように配置して下さい。(加水分解のため。)

- ② 給液管理の場合:EC 0.5～0.6を目安に給液。(7月の目安:600～1,000ml/株/日)
→灌水不足はランナー発生の減少に繋がります。培地が乾かない様に適時灌水して下さい
→培土や灌水チューブの種類によって灌水量や頻度が異なります。

1、育苗圃防除ローテーション(先月号の続き)

時 期		薬 剤	RAC	倍率	主な対象病害虫
7月	第1週 (28日～4日)	デラン(フ)	M9	1,000倍	炭そ
		エコピタ(液)	—	100倍	うどんこ・ハダニ・アブラムシ
	第2週 (5日～11日)	セイビアー(フ)	12	1,000～1,500倍	炭そ
		アグリメック	6	500～1,000倍	ハダニ
	第3週 (12日～18日)	ジマンダイセン(水)	M3	600倍	炭そ
		エコピタ(液)	—	100倍	うどんこ・ハダニ・アブラムシ
	第4週 (29日～25日)	ベルコート(水)	M7	1,000倍	炭そ・うどんこ
		グレース(乳)※	30	2,000倍	ハダニ・ヨトウ・アザミウマ

※グレースは天敵放飼前日数100日以上なので早めに放飼する場合は注意が必要です。
必要に応じて農薬の選定を行ってください。

2、採苗スケジュール ※栽培面積10aで県平均定植数6,500本を定植する場合

作業	時期	計画	必要本数
最終ポット受け	7月中旬	1株当たり15～20本程度採苗	定植本数の1.2倍程度採苗しましょう。
切り離し予定日	8月上旬	最終ポット受けから20日以上	
定植予定日	9月下旬	目標育苗日数:45日程度	7,800本(内予備1,300本)