

茶(広域担当)	深井	茶・果樹	武田	専・そ菜・水稲	宇佐美	そ菜・専・青壮年部	八木	女性部	平野
購買	横山・滝浪・川島			地区担当	瀧田・大石		配送担当	池田・中島	
内牧・美和・足久保地区 大石 080-9772-5227					松野・玉川・井川 瀧田 080-4110-5438				

※ 購買・注文に関するお問い合わせは 上記地区担当携帯か美和購買店 ☎296-2121 まで

土壌診断(茶)の申込受付について

- 提出期日 令和8年8月21日(金)まで
- 提出先 美和支店購買店 武田まで TEL:296-2121
- 料金について 1検体・1,330円(税込み)
※代金は購買代金引落とし口座より翌月引き落としになります。
- 試料について ① 風乾した土を300g程度。土は必ず乾燥し、1mmのフルイにかけて下さい。
② 土を入れた袋には、「氏名」・「電話番号」・「作物名」・「ハウス・露地」などを明記して下さい。

今がお得!!夏の除草剤キャンペーン!! 8月末日まで!!

ザクサ液剤

→かかった部分を素早く枯らす
5ℓ ￥19,877 ⇒ ￥18,500
専用ノズル1個 プレゼント
20ℓ ￥59,037 ⇒ ￥56,000
2ℓを1本 プレゼント!



タッチダウン iQ

→根まで枯らす浸透移行性型除草剤
6ℓ ￥13,893 ⇒ ￥12,800
500ml ボトル1本 プレゼント!



ブリグロックス L

5ℓ ￥9,482 ⇒ ￥8,700
工具入1個 プレゼント!



ラウンドアップマックスロード

→葉から入って根まで枯らす
5.5ℓ ￥15,246 ⇒ ￥13,800
計量カップ1個 プレゼント!
20ℓ ￥44,847 ⇒ ￥41,500
べんりっこバケツ1個 プレゼント!



お盆用品の取り扱いあります!!



茶

《3茶萌芽～1葉開葉期》

フロンサイド SC	2,000 倍	炭そ病・もち病・新梢枯死症・褐色円星病	混 用
コルト顆粒水和剤	2,000 倍	ウンカ・スリップス	14日

☆ フロンサイドは皮膚に付着するとかぶれる可能性があるため、気になる方は、ダニコール [1,000 倍・10 日] を使用してください。

《3茶生育期》

インダーフロアブル	5,000 倍	炭そ病・もち病・褐色円星病	混 用
エクシレル SE	2,000 倍	ウンカ・スリップス・ハマキムシ類	7日

《8月上旬：お盆前（8月10日頃までにハマキ剤を入れましょう）》

ファルコンフロアブル	4,000 倍	ハマキムシ類（ヨモギエダシャク）	単用・7日
------------	---------	------------------	-------

☆ ファルコンフロアブルは脱皮促進剤ですので、若齢幼虫期（体長2cm以下）までの早期防除を。（若齢幼虫・葉に小さな穴をあける）
☆ 防除時期を逃した場合は、アフーム乳剤 [2,000 倍・7 日] を使用する。

※ホコリダニ発生園 ⇒ハチハチ乳剤 ① [1,000 倍・14 日] 【ウカ・スリップス・カガ 同時防除可能】
※今年は、乾燥によるダニの発生が多いと見込まれますので、圃場をよく観察し、防除をお願いします。

【1茶後に中切りした茶園の整枝】

〈時 期〉 再生芽が平均 15 cm程度伸びた時期（葉が5～6枚着いた頃、再生芽が青茎から木化した頃）
・日数の目安 ⇒⇒ 深刈り更新園 更新後50日～60日
中切り更新園 更新後60日～70日
〈位 置〉 更新した位置から5 cm程度上（新葉が2枚程度残る高さ）
※ 但し、生育が遅く、7月末までに再生芽が充分伸びない場合は、秋に整枝を行うようにしてください。

日数より、芽の大きさを優先して下さい。

【土壌改良材】 近年、茶園 pH が低い傾向にあります（pH4以下の場合は改善をお願いします）。土壌の酸性を矯正し、肥料の吸収率を高めるため、必ず施用をお願いします。

（時期）7月下旬～8月中旬 （袋数）苦土セルカ2号(粒)等を5袋/10ア散布

野菜

おすすめ品種紹介

白菜 「黄ごころ85」タキイ、「タイニーシュシュ」サカタ
キャベツ 「金系201号」サカタ、「彩音」タキイ
大根 「おでん大根 味づくり」丸種、「三太郎」タキイ
ブロッコリー「ピクセル」サカタ
小松菜 「わかみ」サカタ、「楽天」タキイ

※ 結球野菜は播種および定植遅れが、生育不良や結球不足につながります。畑の準備は計画的に。
※ 高温時の播種は発芽率低下につながります。軒下や寒冷紗の利用など工夫がPOINT!

冬野菜の準備が始まりました。ゆとりのある栽培計画を!



熱中対策水

汗に近いイオンバランスで体を守ります。
500ml×24 本入り

3,250 円(税込)



ポストニックウォーター

素早く水分補給できます。通常とレモン味の2種類。
500ml×24 本入り

2,500円(税込)




ポカリスエット

水分や電解質をスムーズに補給し体を潤します。
300ml×24 本入り

3,150円(税込)



いちご



1. 紅ほっぺ育苗圃の管理

- (1) 7月下旬～8月上旬にランナー切離しを行う。(最終ポット受けから20日以上空ける)
- (2) 切り離し後には子苗にIB化成S1号を一粒施用する。
※IB化成の場合、灌水回数が増えると肥効が短くなりますので肥切れに注意して下さい。
- (3) 切離後、摘葉を行い、展開葉2～3枚管理とする。(大苗はきつめにかく)
- (4) 温暖化の影響で、平地育苗では10月に入ってから定植となる方が増えています。育苗日数の長期化により根詰まり等(特に小型ポット)が懸念されますので、切離し時期は適宜調整してください。

2. 子苗の肥培管理「肥料はメルコクアント試験紙で測って管理しましょう。」

置き肥の場合、9月上旬に肥効が切れるように管理し、その後は液肥で管理するのが望ましい。葉面散布の場合は3日間隔程度で施用しましょう。

※9月上旬からは硝酸イオン濃度50～100ppm程度になるように管理しましょう

炭疽病対策 育苗期ローテーション散布

	殺菌剤	RAC	殺虫剤	RAC	対象病害虫
8月1週目	コサイド3000	M1	エコピタ(液)	気門	炭・う・ア・ダ
8月2週目	アントラコール(顆水)	M3	モベント(フ)※散布	23	炭・ダ・ア・ス
8月3週目	オーソサイド(水)	M4	エコピタ(液)	気門	炭・う・ア・ダ・
8月4週目	セイビアー(フ)20	12	カスケード(乳)	15	炭・ヨ・ス
8月5週目	アントラコール(顆水)	M3	ニッソラン(水)	10A	炭・ダ

※う＝うどんこ病、炭＝炭そ病、じゃ＝じゃのめ病、灰＝灰色かび病、ア＝アブラムシ、ダ＝ダニ、ヨ＝ヨトウムシ、オ＝オオタバコガ、ス＝スリップス、ホ＝ホコリダニ、コ＝コナジラミ
※病気の蔓延、発生の抑制のため、台風や強風、大雨の前に必ず防除をお願いします。

※うどんこ病 「高温期が防除適期です！」

気温が高くなるとうどんこ病菌は活動しなくなるので一見防除できたように見えますが、細胞の中に菌糸は残っています！摘葉と薬剤散布を徹底しましょう。

⑨エコピタには殺卵効果がないため、ニッソラン等を混用してお使い下さい。

3. コガネムシ対策

ダイアジノンSLソル	ポット育苗期	500倍-1,000ml/m ²	育苗ポット灌注	1回
ベリマークSC	育苗期後半～定植当日	1,000倍-50ml/株	灌注	4回 (灌注は1回 散布は3回以内)

女性部


<行事・会議>

- 8/5(水)本部委員視察【JA遠州夢咲】
8/7(金)13:30～伝統継承講座おはぎ【本店】
8/10(月)10:00～玉川お花引渡し【玉川】
8/18(火)13:30～女性部プロジェクト会議【本店】
8/25(火)10:30～県家の光大会【グランシップ】
8/27(水)13:30～生活講座③防災食【長田】
8/28(金)13:30～常勤役員との意見交換会【本店】

- ピアノ 8/4, 18(火)13:30～【藁科】
フラダンス 8/4, 18(火)19:00～【内牧】
北部料理 8/18(火)9:30～【内牧】
フラワーアレンジ8/24(月)19:30～【美和】



水稻



4. 穂肥の施用

- (1) 水を入れてから穂肥を施用し3～5日間湛水する。
- (2) 出穂18～25日前で葉色3.5～4.0を目安とする。(一発肥料は3日早く入水して肥料を効かせる)
- (3) 時期がきても葉色がさめない場合は減肥する。
- (4) 倒伏が心配される場合は下記の薬剤を散布する。

ビビフル(フ)	75～100ml/10a(水50～150ℓ)	出穂10～2日前に茎葉散布-1回
---------	------------------------	------------------

5. 水管理

- (1) 出穂前25日～10日は、3日おきに湛水と落水を繰り返す。
- (2) 穂ばらみ期～出穂期は3～4cmの深水とする。

※高温障害による白未熟米の発生が懸念されますので、適正な対応をお願いします!!

- ・出穂以降の間断かん水や掛け流しにより、高温・高夜温による稲体の消耗を防ぐ。
- ・早期落水は白未熟粒等の高温障害や胴割粒の発生原因となるので絶対行わない。
- ・胴割粒は収穫が遅れると増加するので適期収穫に努める。

6. 病虫害防除

(1) 液剤体系の場合(散布量150ℓ/10a)

8月上旬	ウンカ、コブノメイガ	トレボン(乳)	1,000倍	14日-3回
	紋枯病	モンカット(フ)	1,000～1,500倍	14日-4回
	いもち病	ダブルカット(フ)	1,000倍	穂揃期まで-2回
8月中旬	ウンカ、カメムシなど	エクシード(フ)	2,000倍	7日-3回
	※カメムシの多い圃場では、スタークル顆粒水溶剤(2,000倍・7日-3回)を散布してください ※ウンカの発生が多い場合は、エミリアフロブル(1,000倍・7日-2回)を散布して下さい			
	穂いもちなど	ブラシン(フ)	1,000倍	7日-2回

※穂揃期・・・全茎数の80～90%の穂が出揃った時期を言います。

(2) 省力体系の場合

8月上旬	紋枯病 穂いもち	ワイドパンチ豆粒	250g/10a	35日-1回
8月下旬～	カメムシ、ウンカ ツマグロヨコバイ	スタークル豆つぶ	250g/10a	7日-3回

ポイント

- ※ 豆つぶ剤は3～5cmの水位で散布し、灌水状態を5日間保つこと。
- ※ ウンカ・カメムシの発生が近年多くなっています!! 適期防除に努めてください!!
- ※ 農薬使用時は必ず倍率・使用回数・日数の確認をお願いします。
- ※ カメムシの防除適期は出穂7～10日後(出穂：穂が5割程度出たころ)
- ※ 水田への農薬散布後7～10日間は落水、かけ流しをしないようにしましょう。

㊦と表記してある毒劇物 指定農薬は、購入の際に必ず印鑑(認印)をご持参ください。