

茶	平野(泰)	野菜・水稻・苺	繁田・内野	購買	市川・岡田・熊川・岡部・小澤・望月
女性部	平野(友)	地区担当	市川肇(服東・服西・南薬科)・大森(清沢・大川)		

土壌診断の申込受付について

- 1・提出期日

令和8年8月21日(金)まで
- 2・提出先

薬科購買店まで TEL279-0772
- 3・料金について

1検体 1,330(税込) ※代金は購買代金引落し口座より引落しです。
- 4・試料について

①風乾した土を 500g程度。土は必ず風乾し、1mmのふるいにかけてください。

②土を入れた袋には「氏名」・「電話番号」・「作物名」・「圃場名」・「ハウス・露地の別」などを明記して下さい。

③圃場内の採土位置・採土方法は下記参照

図1:圃場の平面図



※圃場内5カ所より
採土し混合する

図2:採土場所の断面図



※図のように深さ15cm程度V字型に
掘り、斜面に沿い2cm程度採土する

除草剤キャンペーン

R8.3月1日～9月30日



タッチダウンIQ(6L)
特別価格 12,800円

プリグロックスL(5L)
特別価格 8,700円



ラウンドアップマックスロード(20L・5.5L・2L)

20L 5.5L 2L
特別価格 41,500円 13,800円 6,800円



お得な
この機会に是非
お買い求めくだ
さい!!



ザクサ液剤(2L・5L・20L)

2L 5L 20L
特別価格 7,500円 18,500円 56,000円

バスタ液剤 2.2L 9,800円

サンダーボルト007 500ml 2,002円

作物に影響せず、雑草抑制

トレファノサイド粒剤 3kg 2,150円

非農耕地用 効果は半年
作物の無い土地用、散布先注意

ハイバーX粒剤 1kg 1,950円

暑い夏は
JA飲料で
乗り切ろう!

汗に近いイオンバランス

熱中対策水
24本入 3,250円



農作業やスポーツ後に… 熱中症予防に…

ポカリスエット

ポストニックウォーター

24本入 3,150円

24本入 2,500円



特別価格!

スパークリングみかん
24本入 2,430円



贈答用の包装やのし付けも承っております。

1ケースから配達もしております。お気軽にご注文ください。

【茶】高温干ばつにより、ハマキムシや赤ダニ等が増える可能性があるのでご注意下さい。

病害虫防除

三番茶萌芽期 ～1葉開葉期	炭そ病、もち病 新梢枯死症	フロンサイドSC※1	2000倍	・予防剤 茎葉の表裏 に十分かかるよう散布	混 用 14 日
	ウンカ、スリップス	コルト顆粒水和剤※2	2000倍	・行動制御・浸達性あり	

※1 フロンサイドは皮膚に付着すると、かぶれる可能性があるため、気になる方はダコニール1000を使用。

※2 コルト顆粒水和剤は、チャトゲコナジラミ・クワシロカイガラムシにも効果があります。

三番茶生育期	炭そ病、もち病 褐色円星病	インダーフロアブル	5000倍	・治療、予防効果あり	混 用 7 日
	ウンカ・スリップス ハマキムシ類	エクシレルSE	2000倍	・マダラカサハラムシに効果あり	

8月上旬 (お盆前までに)	ハマキムシ類 ・ヨモギエダシャク	ファルコンフロアブル	4000倍	・食毒、脱皮促進剤(IGR) のため若令幼虫期までの 早期防除	単用 7日
------------------	---------------------	------------	-------	---------------------------------------	----------

※ ハマキムシ類はこの時期に徹底防除することにより、抑制できます。

※ 適期を逃した場合は、アフーム乳剤 [2000倍・7日]を使用してください。

※ 夏場の高温干ばつによりダニの多発生が予定される茶園はミルベノック乳剤(1000倍)7日を散布して下さい。

7月～9月	マダラカサハラムシ	※下記のいずれかを散布 コテツフロアブル [㊟] ハチハチ乳剤 [㊟] ダントツ水溶剤	2000倍 1000倍 2000倍	7日 14日 7日	・この時期3茶芽より、発生しや すいので、注意して下さい。 ・被害葉が分からない場合は、 購買店へ連絡下さい。
-------	-----------	--	-------------------------	-----------------	--

※ 被害症状は成虫が葉の裏側より大小の穴をあけ、ひどい場合は3茶芽が出てこない場合があります。

◎1番茶後中切り更新園の整枝について

●時期……日数よりも芽の大きさを優先して、再生芽が5～6枚になり葉が硬化した頃(60～70日)

※山間地等では更新後の生育が遅く、7月最下旬までに整枝できない場合は
そのままにしておき、秋に整枝を行うようにして下さい。


●位置……更新した位置より葉を1～2枚程度残すよう整枝して下さい。

※今後乾燥等が予想されるので、しっかりと葉層の確保をするようにして下さい。

◎乾燥対策 夏場の茶園の1日当たりの水の消費量は、5～6トン／反です。晴天が7日以上続く場合、幼木園や干ばつの影響を受けやすい茶園へ少量ずつでも灌水することで茶株面の温度上昇を抑えることができ、根のデンプン蓄積量が増えて1茶の品質・収量増に繋がります。有機物を投入し、根張りをよくするのも有効です(乾燥時の深耕は要注意)。幼木園には、敷き草が有効です。

【水稲】

1. 水管理
- 中干し後は間断灌水を実施し、根腐れや下葉の枯れ上がりを防いでください。
穂前は灌水し、施肥後は3～5日間は湛水状態にし、肥料を効かせます。
2. 穂肥
- 穂肥の遅れは食味を低下させるので注意しましょう。
葉色が濃い場合は1/3程度に減肥してください。
穂肥日の目安 6/1田植の場合、あいちのかおりSBL:7月31日、にこまる:8月1日



※イネカメムシについては、出穂直後の稲穂への加害を防ぐ早期防除が重要です。

カメムシの発生が多い場合には、下記の農薬を散布				
農薬名	倍率	散布液量	使用時期	使用回数
スタークル顆粒水溶剤	2,000 倍	60～150ℓ/10a	7 日前まで	3 回以内

3. 病害虫防除

液 剤	早生:7月下旬頃 中晩生:8月上旬頃 (出穂前)	いもち病	ダブルカット(F)	1000倍	穂揃期-2 回
		紋枯病	モンカット(F)	1000倍	14日前-4 回
		ウンカ・カメムシ類	トレボン乳剤	1000倍	14日前-3 回
	早生:8月中旬頃 中晩生:8月下旬頃 (出穂直後)	穂いもち	ブラシン(F)	1000倍	7日前-2 回
		ウンカ・カメムシ類	エクシード(F)	2000倍	7日前-3 回
		ツマグロヨコバイ・イナゴ類			

※水田への農薬散布後7日間は落水、かけ流しをしないようにしましょう。

※出穂時期の農薬散布は開花時間(9 時～13 時)を避けましょう。

省 力 体 系	出穂前	いもち病・紋枯病 ウンカ・カメムシ	ワイドパンチ豆つぶ	250g/10a	35日前-1 回
	出穂後	カメムシ・ウンカ ツマグロヨコバイ	スタークル豆つぶ	250g/10a	7日前-3 回

※粒剤・豆つぶ剤は 3～5cmの水位で散布し、湛水状態を5日間保つこと

【いちご】

- 「作業開始前に炭疽病の恐れがある株は除去することを徹底しましょう。」
- 8 月の育苗圃防除ローテーション(先月号の続き)

時 期	薬 剤	RAC	倍 率	主な対象病害虫
第 1 週 (26 日～1 日)	コサイド 3000	M1	1,000 倍	炭そ
	エコピタ(液)	—	100 倍	ハダニ・うどんこ・アブラムシ
第 2 週 (2 日～8 日)	アントラコール(顆水)	M3	500 倍	炭そ
	モベント(フ)※散布	23	2,000 倍	ハダニ、アブラムシ、アザミウマ
第 3 週 (9 日～15 日)	オーソサイド(フ)	M4	800 倍	炭そ
	エコピタ(液)	—	100 倍	うどんこ・ハダニ・アブラムシ
第 4 週 (16 日～22 日)	セイビアー(フ)	12	1,000～1,500 倍	炭そ
	カスケード(乳)	15	4,000 倍	ハスモンヨトウ・アザミウマ
第 5 週 (23 日～29 日)	アントラコール(顆水)	M3	500 倍	炭そ
	ニッソラン(水)	10A	2,000～3,000 倍	ハダニ

【野菜】

種 類	病 害 虫	農 薬 名	倍 率	使用基準
キュウリ	斑点細菌病	コサイド 3000	2000倍	—
	うどんこ病	プロポーズ顆粒水和剤	1000倍	前日-3回
ナス	ハダニ類	コロマイト水和剤	2000倍	前日-2回
	うどんこ病・灰色かび病	シグナムWDG	1500倍	前日-3回
	灰色かび病	スミレックス水和剤	1000～2000倍	前日-6回

高温時には薬害が生じる恐れがあるため、早朝や夕方の防除を心がけましょう。

【果樹】

ミ カ ン	8月上旬	コナカイガラムシ(発生園のみ)	コルト顆粒水和剤	3000倍	前日-3回
	8月中旬	チャノキイロアザミウマ	アクタラ顆粒水溶剤	2000倍	14 日-2回
		黒点病	ペンコゼブ水和剤	600倍	30日-4回
	※極早生みかんの防除は、収穫日数を考慮して、薬剤を選定して下さい。				
柿	8月上旬	フジコナカイガラムシ カキハタムシガ	モスピラン顆粒水溶剤●	2000倍	前日-3回
いちじく	8月上旬	疫病	ランマンフロアブル	2000倍	前日-3回
		アザミウマ類	スピノエース顆粒水和剤	5000倍	前日-1回
	8月中旬	さび病	ラリー水和剤	2000倍	前日-4回
ブドウ (屋根掛)	8月上旬 (収穫前)	黒かび病	園内清掃に努めるとともに通風、採光を良好に保つ		
		チャノキイロアザミウマ	ダントツ水溶剤	4000倍	前日-3回
		べと病	IC ボルドー66D	50倍	—
		ハダニ類	コロマイト水和剤	2000倍	7日-2回

【女性部】

- <行事・会議>
- 8/ 3(月)13:00～ ひかりの会定例会【薬科】
- 8/ 5(水) 本部委員視察【JA 遠州夢咲】
- 8/ 7(金)13:30～ 伝統継承講座「おはぎ」【本店】
- 8/18(火)13:30～ 女性部プロジェクト会議【本店】
- 8/20(木)18:00～ わらしな交流会【中薬】
- 8/25(火)10:30～ 県家の光大会【グランシップ】
- 8/26(水)13:30～ 生活講座「防災食」【長田】
- 8/28(金)13:30～ 常勤役員との意見交換会【本店】
- <教養講座>
- ピアノ 8/4, 18 (火) 13:30～【薬科】
- 薬科体操 8/4, 18 (火) 19:30～【薬科】
- 清沢フラワー 8/11 (火祝) 19:00～【ふる茶】
- 清沢体操 8/ 6, 27 (木) 19:30～【清沢】
- パッチワーク 8/12, 26 (水) 9:30～【薬科】
- 書道 8/14, 28 (金) 13:30～【薬科】
- 北部料理 8/18(火) 9:30～【内牧】
- 和太鼓 8/ 9, 23 (日) 19:00～【交流C】

【有害鳥獣駆除】

現在、サル・イノシシ・ニホンジカ・アライグマ・ハクビシン・アナグマ・タヌキの野生鳥獣駆除の許可をすべての地域（鳥獣保護区を含む）にて取っています。引き続き、山に入る際には十分気をつけて下さい。駆除のご相談は部農会長 及び 地元の有害駆除従事者を通じて、薬科購買店へご連絡下さい。近年マダニやヒルが増えていますので畑や山に入る際は十分注意してください。