

わらしな川 9月号

J A 静岡市 葦科購買店

指導:279-0772 購買:279-0773 配送:279-0774

茶	平野(泰)	野菜・水稻・苺	繁田・内野	購買	市川学・岡田・熊川・岡部・小澤・望月
女性部	平野(友)	地区担当	市川肇(服東・服西・南葦科)・大森(清沢・大川)		

購買店営業日時変更のお知らせ

9月29日(火) 8:30~12:00 上期決算棚卸のため

9月30日(水) 終日閉店

10月 1日(木) 8:30~16:00 葦科サポート店営業

10月 2日(金) 8:30~16:00 葦科サポート店営業

10月 3日(土) 土曜営業なし。北部アグリセンター土曜営業あり。

10月 5日(月) 北部アグリセンター グランドオープン

ご理解・ご協力
お願いします。



購買から オススメ & お買い得情報

電動ファン付きベスト



首元が涼しい設計で快適！
ファン、バッテリーなど一式
そろったタイプがオススメ！
セットを購入した方には、
ベストをもう1枚プレゼント！

コンプリートセット **24,800 円**

彩輝 2,930 円

各種そ菜に使いやすい
N-P-K=6-6-6。
種まきや苗の定植時
の元肥に便利な
ペレット状！
1袋 約 20 kg 入り



数量限定！

暑い夏におすすめ☆



ポストニックウォーター

1ケース 500ml 24本入り

2,500円



ポストニックウォーター レモン

1ケース 500ml 24本入り

2,500円



ポカリスエット缶 リキャップ

1ケース 300ml 24本入り

3,150円

スパークリングみかん特別値引き中！



子供に大人気！

3,100円⇒

2,430円！

670円引き！

数量限定！

是非お買い求め下さい！！

【茶】 ☆ 本年も、シャクトリ・ハマキの発生が見られますので注意して下さい。

8月中旬以降、ハマキムシ類が発生しています。これからダラダラと発生が予想されますので、まだ防除をしていない方は、早めの防除徹底をお願いします。

ディアナSC 5000倍 前日 または、アフーム乳剤 2000倍7日を散布して下さい。

秋芽開葉期	炭そ病、もち病	クミガードSC	500倍	・予防効果	混用 7日
	ウカ、スリップス	スタークル顆粒水溶剤	2000倍	・浸透移行性有り	

※ チャトゲコナジラミ、又はサビダニ、ホコリダニの発生が予想される茶園はスタークル顆粒水溶剤に代えてハチハチ乳剤● [1000倍・14日] を散布。

※ 組織加入者等で使用する農薬が定められている場合は、それを遵守してください。

※ ハスモンヨトウの発生が見られる茶園では、アフーム乳剤 2,000倍(7日・茶期ごと1回)を使用する。

・秋肥の施用

夏から秋の時期にかけて、茶樹は養分を多く吸収し、根や幹を生育・肥大させます。

また、この時期の茶樹の生育や養分の蓄積は、翌年の新芽の生育や品質・収量に大きく影響しますので窒素・リン酸・加里がバランス良く含まれた有機配合肥料を施用してください。

○9月上中旬 有機配合 6袋/10a

※遅場所は9月上旬までに施用。

※2回施用の場合は、①8月下旬～9月上旬、②9月中旬～9月下旬に分ける。

【野菜】(秋冬アブラナ科野菜)

生育初期のコナガ・ヨトウは定植時の粒剤施用で被害を防ぎましょう。

薬剤名	キャベツ	ハクサイ	ダイコン	ブロッコリー
オルトラン(粒)	1~2g/株	1~2g/株	3~4kg/10a	2g/株
プリロッソ(粒)オメガ	1~2g/株	1~2g/株	6kg/10a	1~2g/株
プレバソン(フ)5	100倍(灌注) 2000倍	100倍(灌注) 2000倍	2000倍	100倍(灌注) 2000倍

※プレバソンの灌注はセルトレイまたはペーパーポットのみです。ポリポットへは使用できません。

【有害鳥獣駆除】

現在、【サル・イノシシ・ニホンジカ・アライグマ・ハクビシン・アナグマ・タヌキ】の野生鳥獣の駆除許可を、管内全域で取っています。

駆除等のご相談は部農会長又は、地元の有害駆除従事者を通し、葦科購買店へご相談下さい。



J A 静岡市 組合員交流 ゴルフ大会 開催のご案内

日程 11月11日(水) 雨天決行
会場 ホロンゴルフ倶楽部
参加者 組合員及び組合員の家族
参加費 1,000円 プレー代 11,000円

キャディを付ける場合には別途 15,400円(先着順)
組合員訪問の申込書に記入かお近くの支店へご連絡下さい。

申込締切

9月11日(金)



【水稲】 散布適期：穂揃い期（粒剤は出穂直前～出穂期）

液剤	穂いもち	ブラシンフロアブル	1000倍	7日前	混用
	ウンカ・カメムシ	エクシードフロアブル	2000倍	7日前	
粒剤	ウンカ・カメムシ ツマグロヨコバイ	スタークル豆粒	250g／10a	7日前	



- ※ カメムシの発生が多い場合はスタークル顆粒水溶剤2000倍-7日前を散布。
- ※ 散布時間は開花中（8時～14時）の防除を避ける。
- ※ 株元をよく観察し、ウンカの発生している場合にはエミリアフロアブルかエクシードフロアブルでの防除をお願いいたします。

【苺】

★今月の管理のポイント★
育苗ラストサポートです。花芽分化に向けた肥培管理、定植を意識した本圃の整備など定植に向けた管理及び作業をお願いします。
育苗：炭疽病など病害虫の防除を徹底し、本圃への持ち込みをなくしましょう。
：花芽分化へ向けて、子苗の施肥管理に注意しましょう。（50～100ppmを推移）
本圃：定植に向けた準備を整えましょう。（植穴の準備、培地の温度抑制など・・・）
：給液装置や暖房機など機械類が正常に動作することを確認しておいてください。

《育苗》 育苗期間も残りわずか、病害虫の防除と花芽促進に向けた管理を。

1、 切り離しからの管理

- ① 育苗中の肥切れは芯止まりにつながります。メルク試験紙を用いて、確認しましょう。
→暑い日が続き地温が高まると、肥料が吸いにくくなり、肥切れになる恐れがあります。
地温を下げる工夫が必要です。寒冷紗などを用いて暑さ対策を！！
- ② 8月30日以降のI・B化成の施用は控えて下さい。
→9月中旬からは低めの管理を心掛けましょう。（硝酸イオン濃度 50ppm～100ppm）
→葉面散布の場合は3日～5間隔で散布。（EC0.5程度）
- ③ ポット育苗の方は適宜灌水を行い、培地の温度を下げる。
- ④ 紙ポットをご利用の方はポットの表面が濡れるように灌水を行い、気化熱を最大限利用するように努めて下さい。
- ⑤ 2～2.5枚になる様に適宜葉かきを実施し、定植10日前に最終葉かきを行い、定植時は4～5枚にする。

2、 炭そ病防除ローテーション（先月号の続き）

時 期		薬 剤	RAC	倍率	主な対象病害虫
9月	第1週 (30日～5日)	ベルコート（水）	M7	1,000倍	炭疽、うどんこ
		コロマイト（水）	6	2,000倍	ハダニ
	第2週 (6日～12日)	オーソサイド（水）	M4	800倍	炭疽、うどんこ
		エコピタ（液）	—	100倍	うどんこ・ハダニ・アブラムシ
	第3週 (13日～19日)	アントラコール（顆水）	M3	500倍	炭疽
		プレオ（フ）	UN	1,000倍	ヨトウ
	第4週 (20～26日)	キノンドー（フ）	M1	500～800倍	炭疽
		マイトコーネ（フ）	20D	1,000倍	ハダニ
10月	定植直前 コガネムシ防除	ベリマーク SC	28	1,000倍※灌注 25～50ml/株	ヨトウ・アブラムシ アザミウマ・コガネムシ
		オーソサイド（水）	M4	800倍	炭疽・うどんこ
	第1週 (27日～3日)	マッチ（乳）	15	1,000～2,000倍	ヨトウ・アブラムシ

「本圃への病害虫の持ち込みがないように定植前はとくに入念な防除を行いましょう。」

【果樹】

果樹名	時期	病害虫		農薬名	倍率	使用基準	
温州みかん 中晩柑	9月中旬	黒点病		ペンコゼブ水和剤	600倍	温州30日 中晩柑90日	4回
		ミカンハダニ		ダニゲッターフロアブル	2000倍	前日-1回	
		チャノキアザミウマ		ロディー乳剤	2000倍	7日-4回	
	※ 仕上げ摘果をし、品質の向上に努めましょう						
柿	9月上旬	うどんこ病・炭そ病		ストロビードライフロアブル	3000倍	14日-3回	
	カメムシ類(発生に注意しましょう。)			テルスターフロアブル	3000倍	3日-2回	
梅	9月上旬	黒星病		サルファーゾル	500倍	—	
	9月中旬	ウメシロカイガラムシ		アプロードフロアブル	1000倍	7日-2回	
キウイフルーツ	8月中旬	レインボーレッド	果実軟腐病	ベルコート水和剤	1000倍	前日-5回	
	9月上旬	ヘイワード		ベルコート水和剤	1000倍	前日-5回	
	9月中下旬	クワシロカイガラムシ		アプロード水和剤	1000倍	前日-2日	
	9月中旬	レインボーレッド	貯蔵病害 (灰色かび病)	ストロビードライフロアブル	2000倍	前日-3日	
ブドウ (簡易ハウス)	9月中旬 (収穫後)	べと病		IC ボルドー66D	50倍	—	
		クワコナカイガラムシ		トランスフォームフロアブル	2000倍	3日-3回	

※カメムシの発生に注意！



病害虫防除所の調査で、今年はカメムシの餌になるスギ、ヒノキ球果が多く、カメムシの寄生も昨年より多いため、9月以降に果樹園への飛来の可能性が高いと予想しています。最初の数匹の防除が重要なので、こまめに園内を見回り、今後の発生に十分注意してください！

防除薬剤：スタークル顆粒水溶剤、テルスターフロアブル等

※対象作物の農薬ラベルを確認し、登録内容に従って使用してください。

【女性部】

＜行事・会議＞

9/ 3(木)12:00～ 県フレミズ交流会【本店】
9/ 4(金)13:30～ 健康講座②【長田】
9/ 7(月)13:00～ ひかりの会定例会【薬科】
9/10(木)10:30～ 助けあい交流会【農業会館】
9/15(火)13:30～ 女性部活性化会議【本店】
9/17(木)10:00～ 就活セミナー【長田】
9/29(火) 助けあいグループ視察【中伊豆】

＜教養講座＞

ピ ア ノ 9/ 1, 15(火)13:30～【薬科】
薬科体操 9/ 1, 15(火)19:30～【薬科】
清沢フラワー 9/ 2(水)19:00～【清沢】
パッチワーク 9/ 9, 30(水)9:30～【薬科】
清沢体操 9/10, 24(木)19:30～【清沢】
北部料理 9/11(金)9:30～【内牧】
書 道 9/11, 25(金)13:30～【薬科】
和太鼓 9/13, 27(日)19:00～【生涯学習C】