




美和地区営農購買だより

JA静岡市

電話 296-2121 ファクシミリ 296-2125

茶(広域担当)	深井	茶・果樹	武田	専・専菜・水稲	宇佐美	専菜・専・青壮年部	八木	女性部	平野
美和営農主張所購買担当			海野	配送担当		池田・川島 080-9772-4164			
内牧・美和・足久保地区 大石 080-9772-5227					松野・玉川・井川地区 滝浪 080-1556-3489				



《 購買店舗営業時間変更のお知らせ 》

9月29日(火) 午前のみ営業 上期棚卸のため
9月30日(水) 閉店 棚卸監査
10月1日(木) 美和購買店閉店 北部アグリセンターオープン



ご迷惑おかけしますが、ご理解ご協力をお願い致します。



美和JAまつり

11月14日(土) 9:00~11:30 会場 JA静岡市美和支店

ご来場お待ちしております！

詳しくは来月のチラシをご覧ください



《10月から年特肥料推進運動実施します！》

肥料を予約注文されると、普段購入される価格よりも安くなります。JAは、皆様方のご要望に
応えられる肥料銘柄を多々取り揃えておりますので、この機会に予約注文をよろしくお願い致します。

詳しくは、近日中に注文書を配布いたしますのでご確認ください。



令和8年度 玉川地区一番茶品評会茶品評会(8月21開催)

優等	内野 了一 様	やぶきた
1等	内野 不二夫 様	やぶきた
2等	佐藤 誠洋 様	やぶきた
3等	平岡 喜芳 様	やぶきた

祝 おめでとうございます！
ご協力ありがとうございました。




令和8年版 幹旋図書のお知らせ

農作業や金銭出納記録の記入など、毎日の記録に便利な幹旋図書の注文を受付ます。

- 農業経営記録簿 … 700円 (すべて税込)
- 継続日記… 4,080円 など 締切 9/18(金)まで

お申込みは部農会回覧または美和購買店 までお願いします！



美和地区営農購買だより 令和8年 9月18日発行

茶 《秋整枝について》

- ① 気象庁の3か月予報では、今後の気温は高めに推移する予報が出ています。
早めの整枝は、再萌芽のリスクがありますので気温に注意して下さい。
※参考 昨年の平均気温(曲金・気象台) 9/下 25.7℃⇒10/上 23.7℃⇒10/中 22.4℃
- ② 2茶後のナラシが遅れた圃場や夏の高温・干ばつ等により、3茶芽が抑えられている圃場があります。生育状態を把握して、時期・深さを決めて下さい。

【目的】・摘採面を均一にし、摘採時の古葉・遅れ芽の混入を防止
・翌年の1番茶の収量構成や摘採時期をコントロール



【時期】・平均気温が19℃以下になった頃

(目安 ⇒ 山間地：10月中旬 平坦地：10月中旬～)

時期が早いと ⇒ 遅れ芽の発生・再萌芽により翌年の1番茶に悪影響を及ぼします。

時期が遅いと ⇒ 翌年1番茶の幼芽の充実が遅れ、摘採時期の遅れに繋がります。

【位置】・2茶整枝面より5cm上(3番茶の葉を2枚程度残す)

※ 葉層は10cm以上を確保して下さい。

※ 秋芽が長く伸びている園では、日焼け防止の為、
整枝の7日前に秋整枝予定位置より2~3節上で一度整枝を行って下さい。

【園相毎の整枝方法】

樹勢の強い園 ⇒ やや深めに整枝し芽数の増加と1茶芽の均一化を図る。

生育不良の園 ⇒ 下位3葉程度が濃緑色に硬化してから、浅整枝。
浅整枝は、再萌芽しやすくなるため整枝時期を注意する。

⇒ 10月下旬までに硬化しない場合は春整枝とする。

寒害や凍霜害を受けやすい園 ⇒ 春整枝とする。(秋整枝より5~10日遅くなる)

《防除》☆ 秋冬番茶の摘採を行う場合は、農薬の摘採前日数にご注意下さい！

【チャトゲコナジラミ】☆ 防除時期：9月下旬~10月上旬(成虫がいなくなった頃)

ハチハチ乳剤(調)	1,000倍	14日
-----------	--------	-----

※ 防除効果を上げるために薬剤が、裾部・葉裏にしっかりかかるように散布してください。

【輪斑病】 ☆ 防除時期：秋整枝後

カスミンボルドー	1,000倍	14日	整枝後24時間以内
----------	--------	-----	-----------

※ 気温が高いと発生しやすくなるので御注意ください。

※ 輪斑病の感染防止のため、雨や露のある時は整枝を避けてください。

【赤焼病】 ☆ 防除時期：10月中旬~下旬

カスミンボルドー	1,000倍	14日	・ドイツボルドーA	500倍	14日
----------	--------	-----	-----------	------	-----


※ 感染期の防除として秋に1回目を行い、

越冬病斑が多い園では、春先(2月中旬~3月中旬)の2回防除が効果的です。


【カンザワハダニ】 ☆ 防除時期：10月下旬~11月上旬(越冬前・秋整枝後)

ダニサラバフロアブル	2,000倍	7日
------------	--------	----

※ チャトゲコナジラミとの同時防除なら、冬期のマシン油散布が有効です。



いちご



1、定植後の注意と定植後の管理

- ① 定植時は葉 4～5 枚でお願いします。(定植後 2 週間は葉かきしないこと)
※病害虫の発生が酷い場合は適宜除去をお願いします。
- ② 定植時の地温はなるべく下げ、根の伸長を促しましょう。(適温は 18～23℃)
- ③ 定植後最低でも 10 日間は株元に手灌水を行い、新しい根を出させる。2 番の分化、根張を考慮し、ハウス内の気温及び地温はできるだけ下げる。
→2 番の花芽分化は営農指導員へご相談下さい、随時検鏡致します。
→保温開始の目安は最低気温が紅ほっぺで 10℃、きらび香で 12℃になったときです。
- ④ ミツバチの導入が遅れないように注意しましょう。
→定着まで 1 週間～10 日程度かかります、1 番花の出蕾が確認出来たら導入しましょう。
- ⑤ 頂果房の摘果は 7～10 果を目安に行いましょう。
- ⑥ 2 番果房は 2 芽にすることで、収量増加を目指しましょう。

2、定植後の防除 「ミツバチ、天敵放飼前までに徹底した防除を行いましょう。」

対象病害虫	お勧め薬剤	RAC	倍率	日数	回数	蜜蜂	天敵
ヨ・ハ	アフーム(乳)	6	2,000 倍	前日	2 回	2 日	7 日
ヨ	プレバソン(フ) 5	28	2,000 倍	前日	2 回	1 日	なし
ホ・ハ	コロマイト(水)	6	2,000 倍	前日	2 回	1 日	7 日
ア・コ	ウララ DF	29	2,000 倍	前日	2 回	1 日	なし
ス・ヨ	マッチ(乳)	15	1,000～2,000 倍	前日	4 回	1 日	なし
ハ・ス・う	ポリオキシ AL(水溶)	19	5,000 倍	14 日前	3 回	2 日	14 日
う・炭・灰	ベルコートフロアブル	M7	2,000 倍	前日	5 回	1 日	1 日
炭・灰	セイビアフロアブル 20	12	1,000 倍	前日	3 回	1 日	1 日

※対象病害虫記号：ヨ→ヨトウ、ハ→ハダニ、ホ→ホコリダニ、ア→アブラムシ、
コ→コナジラミ、ス→スリップス、う→うどんこ病、炭→炭疽病

※上記表における天敵とはミヤコ・チリカブリダニに対する影響日数を示します。

収穫時期が近くなりますので、収穫前日数等、登録内容に十分注意してください

注意が必要な薬剤

① 定植前までしか使用できないもの

キノンドーフロアブル	デランフロアブル	ジマンダイセン水和剤(収穫 76 日前)
アントラコール顆粒水和剤	リドミルゴールド MZ 水和剤	アグリメック

② 収穫前の日にちが長いもの


オーソサイド水和剤 80	収穫 14 日前	ベンレート水和剤	収穫 30 日前
ゲッター水和剤	収穫 21 日前	ポリオキシ AL 水溶剤「科研」	収穫 14 日前
トクチオン乳剤	収穫 75 日前	ランマンフロアブル	収穫 30 日前

③育苗期と本圃で倍率が異なるもの

ベルコート水和剤		ベルコートフロアブル	
育苗期	本圃	育苗期	本圃
1,000 倍	4,000 倍	1,000 倍	2,000 倍

3、生物農薬(ハダニの天敵)使用時のポイント

- ☆ 天敵利用の基本はゼロ放飼です。(農薬散布等で害虫密度を極力抑えてから放飼)
→蜜蜂と天敵の同時放飼(10 月中下旬頃)を目安に、導入前の徹底防除をしましょう。
- ☆ 天敵に影響のある薬剤は使用を控える。
- ☆ エコピタ等気門封鎖剤は天敵放飼後については多発生時のスポット散布にて使用する。
- ☆ 天敵は発注から納品まで 10 日～2 週間かかります。ご了承ください。



水稻

(1) 収穫

下表を目安に籾の 90～95%が黄化したら収穫する。

中生	出穂後 40～45 日	晩生	出穂後 45～50 日
----	-------------	----	-------------


(2) 乾燥

- ① 玄米水分 14.5～15%に調整する
- ② 天日干しは 7 日間を目安とする
- ③ コンバインで収穫した籾は 4 時間以内に乾燥機に張り込む
平均乾減率(乾燥速度)は、1 時間あたり 0.8%以下とする

令和 6 年 水稻農作業標準料金表(税込)

作業名		単位	料金	備考
刈取	コンバイン	10a	59,950 円	刈取・乾燥・籾摺
	バインダー		18,150 円	結束ひも代含む
脱穀			16,060 円	
乾燥	コンバイン		29,920 円	コンバインによる刈取籾
	仕上げ乾燥		6,050 円	玄米水分は 18%未満とし、それ以上は割増とする
籾摺		60kg	1,430 円	乾燥良く収穫した籾
玄米運搬		10a	2,420 円	

※上記金額は目安です。相互の話し合いにて決めてください。



野菜

〇秋冬アブラナ科野菜



コナガ・ヨトウの被害はすぐに広がっていくので早めの防除を行いましょう。

薬剤名	RAC	キャベツ	ハクサイ	ダイコン	ブロッコリー
プレバソン(フ)5	28	2,000 倍 前日・3 回以内	2,000 倍 前日・3 回以内	2,000 倍 前日・3 回以内	2,000 倍 前日・3 回以内
アフーム(乳)	6	1,000～2,000 倍 前日・3 回以内	1,000～2,000 倍 7 日前・3 回以内	1,000～2,000 倍 7 日前・3 回以内	1,000～2,000 倍 3 日前・3 回以内
プレオ(フ)	UN	1,000 倍 7 日前・2 回以内	1,000 倍 7 日前・2 回以内	1,000 倍 14 日前・2 回以内	1,000 倍 7 日前・2 回以内

※各作物の欄は、希釈倍率・使用時期・使用回数の順で記載されています。

※毒劇物に指定されている農薬(劇)は、購入の際に印鑑を必ずご持参ください。

女性部

<行事・会議>

10/ 8(木)13:30～ 加工グループ研修【本店】
10/ 9(金)ブロック合同旅行「鎌倉散策」
10/14(水)13:30～ 美和女性部役員会【美和】
10/16(金)13:30～ かぼちゃ料理教室【本店】
10/19(月)13:30～ 健康講座「歌」【しづはた】
10/22(木)13:00～ ふれあい運動会【北部体育館】

<サークル>

フラダンス 10/6,20(火) 19:00～【内牧】
北部ピアノ 10/6,20(火) 13:30～【薬科】
銭太鼓 10/ 8(木) 19:30～【美和】
北部料理 10/ 8(水) 9:30～【内牧】
フラワーアレンジ 10/26(月) 19:30～【美和】

