



しづはた購買店だより

静岡市葵区下 1459-1 ☎294-9330 FAX294-1635

購買：山下・谷米・竹澤		配送：白鳥	
購買・地区担当	昭府地区担当：海野	大河内地区担当：川嶋	梅ヶ島地区担当：望月 達
北部営農センター（しづはた担当）	茶：折山	蔬菜・苺・水稻：石井	果樹：伊藤 女性部：大越

《お知らせ》

購買店 営業時間の変更について

R8 10/1 からアグリセンター2 拠点化のスタートに伴い、購買店の決算棚卸や、いままでの事務所から新事務所への移転準備等の関係で、営業開始が下の通り変更となります。大変ご迷惑おかけしますが、ご理解 ご協力よろしくお願い致します。

◆決算棚卸のため 9月29日（火）は 8時30分～12時00分まで
（しづはた購買店 営業最終日）

◆購買店の移転準備のため 9月30日（水）は 1日 休業となります。

暑い日が続きます。熱中症予防に水分補給を！

スパークリングみかん【本物果汁入り】（280ml×24本） 3,100円⇒2,430円（税込）
静岡県産 温州みかんの果汁を10%使用し、フレッシュ感の高い柑橘系の炭酸飲料。

《茶園管理》

● 防 除 ☆秋冬番茶の摘採をする園がある場合は十分に注意して防除して下さい。

夏の干ばつにより病害虫が多発することがあるため、ご注意下さい。

赤ダニ、サビダニ、ホコリダニ 多発生の茶園


散布薬剤 … ミルベノック乳剤 1,000 倍 7日

チャトゲコナジラミ・サビダニ・ホコリダニ・マダラカサハラハムシ

防除時期 … 9月下旬くらいまで

散布薬剤 … 劇 ハチハチ乳剤 1,000 倍 14日

※近年、マダラカサハラハムシの被害が拡大しています。
マダラカサハラハムシは、成虫が若葉に1mm前後の穴を開け、また新梢の柔らかい枝や葉柄を食害し、ボキッと折ってしまいます。被害が見られる場合は、防除をお願いします。新成虫が多発すると、越冬成虫の一部（多くは冬に死亡）が翌年、一番茶でも激しい被害を引き起こす場合があります。



体長約4mm

赤焼け病 感染期の防除として秋に1回行い、越冬病斑が多い場合は春先も防除します。

防除時期 … 秋整枝後

散布薬剤 … カスミンボルドー(1,000倍・14日) 又は ドイツボルドーA(500倍・14日)

◆ 秋整枝の時期に注意して下さい。 ◆

世界的に地球温暖化が問題になっておりますが、今年の8、9月も例年より暑い日が続き、生育不良や病害虫の発生が見られます。秋整枝は、気温に注意して3番茶の葉が硬化し黒緑色になるまで充実させてから実施して下さい。秋冬番茶の摘採を行う園が近隣にある場合は、ドリフトにお気を付けください。

● 秋 整 枝

※ 参考： 昨年の平均気温の推移【 気象庁・静岡市 駿河区 】

10月上旬：23.6℃ ⇒ 10月中旬：21.3℃ ⇒ 10月下旬：16.5℃

時 期・・・母枝が充実し葉が濃緑色となり、平均気温が19℃以下になった頃
平坦地・山間地 10月中下旬ころ

※3茶芽の生育、硬化が遅れている園では、10月下旬以降

※例年よりも気温が高いことが予想されますので、ご注意下さい！

深 さ・・・2茶摘採面より、5cm位上(3茶葉が2～3節残る程度)

- ① 秋整枝までに秋芽が硬化できない場合は春整枝に回して下さい。
⇒ 干ばつにより生長不良の茶園があります。被害が大きい場合は春整枝に。
- ② 早場所や整枝の時期が早い場合、遅れ芽の発生や再萌芽することがありますので、整枝時期には十分注意して下さい。(遅場所から始め、最後に早場所)

- ① 葉層10cm以上の確保に努めましょう
- ② 秋芽の生育の良い園、遅れ芽が多い園では、日焼け防止のために整枝の1週間前に秋整枝予定面より5cmくらい上で一度整枝して下さい。
- ③ 寒害や凍霜害を受けやすい園、樹勢の弱い園では春整枝にして下さい。
- ④ 夏季にリンハン病が多発した園では整枝直後に防除を行って下さい。
◎散布薬剤……カスミンボルドー1,000倍 【 整枝後24時間以内 】

第80回 全国茶品評会 普通煎茶4kgの部 『静岡本山茶』

大河内（葵区 横山） 小澤 晃 様 1等1席 入賞

農林水産大臣賞 受賞 【第77回に続き2度目!!】

大変素晴らしい結果です。おめでとうございます!!

《 10月から年特肥料推進運動を実施します 》

肥料を予約注文されると、普段購入される価格よりもお安くなります。

農協は皆様方のご要望に応えられる肥料銘柄を多々取り揃えておりますので、この機会に予約注文をよろしくお願い致します。

いちご

《育苗》

1.花芽分化が遅れている方

- ・予定より定植が遅れている方は、液肥の葉面散布を実施して、硝酸態窒素濃度がゼロになるのを避けましょう。（芯どまりの予防）

（例）クミアイ液肥2号 800～1,000倍 葉面散布 （3日に1回実施）

※農薬混合の際は1,000倍希釈にて使用下さい。

- ・葉が増えすぎた場合は除去し4～5枚になるように管理しましょう

2.この時期注意したい農薬

① 本圃では使用できないもの

キノンドーフロアブル	デランフロアブル●	シマンダイセン水和剤(収穫76日前)
アントラコール顆粒水和剤	リドミルゴールドMZ	アグリメック●

② 収穫前の日にちが長いもの

オーソサイド水和剤80	収穫14日前	ベンレート水和剤	収穫30日前
グッター水和剤	収穫21日前	ポリオキシシンAL水溶剤「科研」	収穫14日前
トクチオン乳剤	収穫75日前	ランマンフロアブル	収穫30日前

③育苗期と本圃で倍率が異なるもの

ベルコート水和剤		ベルコートフロアブル	
育苗期	本圃	育苗期	本圃
1,000倍	4,000倍	1,000倍	2,000倍

《本圃》

1、定植直後の確認事項

- ① 葉4～5枚で定植し、定植後2週間は葉かきをしないようにしましょう。
※病害虫の発生が酷い場合は適宜除去をしましょう。
- ② 根の活着を促すため、遮光資材を被覆し、定植時の地温をなるべく下げましょう。
根の生育適温は18～23℃。高温の限界は25℃。
- ③ 定植後株元に手灌水を行い、活着と発根を促しましょう。（最低でも10日間程度）
→定植が遅れた場合は株の充実を図るためにも手灌水は確実に実施しましょう。

2、定植後の確認事項

- ① 2番の分化、根張を考慮し、ハウス内の気温及び地温はできるだけ下げましょう。
→保温開始の目安は最低気温が紅ほっぺで10℃、きらび香で12℃になったときです。
- ② ミツバチの導入が遅れないように注意しましょう。
→定着まで1週間～10日程度かかります、1番花の出蕾が確認出来たら導入しましょう。
- ③ 頂果房の摘果は7～10果を目安に行いましょう。
- ④ 2番果房は2芽にすることで、収量増加を目指しましょう。

3、定植後の防除 「蜜蜂、天敵放飼前までに徹底した防除を行いましょう。」

対象病害虫	お勧め薬剤	RAC	倍率	日数	回数	蜜蜂	天敵
ヨ・ハ	アファーム(乳)	6	2,000倍	前日	2回	2日	7日
ヨ	プレバソン(フ)5	28	2,000倍	前日	2回	1日	なし
ホ・ハ	コロマイト(水)	6	2,000倍	前日	2回	1日	7日
ア・コ	ウララDF	29	2,000倍	前日	2回	1日	なし
ス・ヨ	マッチ(乳)	15	1,000～2,000倍	前日	4回	1日	なし
ハ・ス・ウ	ポリオキシシンAL(水溶)	19	5,000倍	14日前	3回	2日	14日
う・炭・灰	ベルコートフロアブル	M7	2,000倍	前日	5回	1日	1日
炭・灰	セイビアーフロアブル20	12	1,000倍	前日	3回	1日	1日

※対象病害虫記号：ヨ→ヨトウ、ハ→ハダニ、ホ→ホコリダニ、ア→アブラムシ、

コ→コナジラミ、ス→スリップス、う→うどんこ病、炭→炭疽病

※上記表における天敵とはミヤコ・チリカブリダニに対する影響日数を示します。

農薬購入時には印鑑を！

毒劇物に指定されている農薬は●と表記してあります。購入の際には必ず印鑑（認印）をご持参ください。

水稻

(1) 収穫


下表を目安に粳の90～95%が黄化したら収穫する。

中生	出穂後40～45日	晩生	出穂後45～50日
----	-----------	----	-----------

(2) 乾燥

- ① 玄米水分14～15%に調整する
- ② 天日干しは7日間を目安とする
- ③ コンバインで収穫した粳は、早めに乾燥機に投入する。（4時間以内）
毎時乾燥率（乾燥速度）は、1時間あたり0.8%以下とする

水分測定を希望する方は
玄米を購買店に
持参してください



令和8年 水稻農作業標準料金表（税込）

作業名		単位	料金	備考
刈取	コンバイン	10a	59,950 円	刈取・乾燥・粃摺
	バインダー		18,150 円	結束ひも代含む
脱穀			16,060 円	
乾燥	コンバイン		29,920 円	コンバインによる刈取粃
	仕上げ乾燥		6,050 円	玄米水分は 18%未満とし、それ以上は割増とする
粃摺		60kg	1,430 円	乾燥良く収穫した粃
玄米運搬		10a	2,420 円	

※上記の金額は目安です。

秋冬アブラナ科野菜

コナガ・ヨトウの被害はすぐに広がっていくので早めの防除を行いましょう。

薬剤名	RAC	キャベツ	ハクサイ	ダイコン	ブロッコリー
プレバソン(フ)5	28	2,000倍 前日まで・3回以内	2,000倍 前日まで・3回以内	2,000倍 前日まで・3回以内	2,000倍 前日まで・3回以内
アファーム(乳)	6	1,000～2,000倍 前日まで・3回以内	1,000～2,000倍 7日前まで・3回以内	1,000～2,000倍 7日前まで・3回以内	1,000～2,000倍 3日前まで・3回以内
プレオ(フ)	UN	1,000倍 7日前まで・2回以内	1,000倍 7日前まで・2回以内	1,000倍 14日前まで・2回以内	1,000倍 7日前まで・2回以内

※各作物の欄は、希釈倍率・使用時期・使用回数の順で記載されています。

●野菜類（マイナー野菜）のチョウ目害虫防除

使用できる薬剤が「野菜類」に登録のあるBT剤しかないことが多いので、物理的な防除として防虫ネットなどをうまく利用する。

- ・効果が食毒なので全体にムラなく散布するとともに、発生初期に使用すること
- ・浸透移行性がないため新芽が出た度、散布を行うと効果的

◎散布時は必ずラベル（使用方法等）を確認して下さい。（薬害に注意）

※記載にない商品は取り寄せになります。ご購入をされる方は前もってご連絡をお願い致します。

「令和8年度版 幹旋図書」のお知らせ


農作業や金銭出納記録など、毎日の記録に便利な幹旋図書の注文を受付ます。

- 農業経営記録簿…700円
- 継続日記（3年用ヨコ書き）…4,080円
- 継続日記（5年用タテ書き）…4,080円
- 継続日記（5年用ヨコ書き）…4,080円

※「3年連続日誌」「36ヶ月日記」「野菜づくりノート」などの取り扱いがなくなりました。

締切 10月5日（月）まで

お申し込みはしづはた購買店（営農出張所）までお願いします！



《柑橘》

9月となり天候不順が続き摘果作業が遅れていると思われますが、内裾果や病虫害被害果を中心に摘果をお願いします。病虫害防除についても、なかなか出来ない状況にありますがミカンハダニの発生も多く見受けられます。また、カメムシの発生にも十分に注意し、防除の徹底をお願いします。

○栽培管理

青島温州は、10月に入り樹上選果を実施し外観不良果を落しましょう。また、夏秋梢はカイヨウ病の発生源にもなりますので、10月中旬頃に除去して下さい。

○病虫害防除

温州みかん

- ・カメムシの発生が懸念されます。園地巡回を頻繁に行い、1匹でも見受けられたら速やかに、スタークル顆粒水溶剤 2,000 倍（前日ー3回）または、テルスター水和剤 2,000 倍（前日ー3回）早朝に散布。
- ・ダニの防除は9月末までに必ず行って下さい。10月までダニが残っていると、果実が着色したときにマダラ模様の発生等秀品率低下の原因となります。
- ・長雨、台風等により褐色腐敗病の発生が予想される場合は、ランマンフロアブル 2,000 倍（前日ー3回）を樹の下半分へ散布。

中 晩 柑（年内出荷を予定しているポンカンへは散布しないこと）

防除時期	対 象 病 害 虫	農 薬 名	希 釈 倍 率	防 除 基 準
10 月	カメムシ・ヨコバイ類	テルスター水和剤	2,000 倍	前日ー3回
中 旬	黒点病・赤さび病	オキシンドー水和剤 80	1,000 倍	30日ー3回

- ・中晩柑類では、台風襲来が予想される場合は襲来直前に
コサイド 3000 2,000 倍にバイカルティール 1,000 倍を加用散布

○施肥

10月下旬

早生温州	みかん 50 ペレット	5袋/10a
スルガエレガント	スルガペレット	6袋/10a

《落葉果樹》

○病虫害防除

対象作物 防除時期	対 象 病 害 虫	農 薬 名	希 釈 倍 率	防 除 基 準
梨 10月上旬	黒 星 病	キノンドーフロアブル	1,000 倍	3日ー9回

対象作物 防除時期	対 象 病 害 虫	農 薬 名	希 釈 倍 率	防 除 基 準
イチジク 10 月	さ び 病	アンビルフロアブル	1,000 倍	前日ー2回
梅 10 月	か い よ う 病	I C ボ ル ド ー 6 6 D	50 倍	ー ー ー
桃 10月中旬	せ ん 孔 細 菌 病	I C ボ ル ド ー 4 1 2	30倍	ー ー ー

○施 肥

キ ウ イ	10月中旬	静岡フルーツペレット	7袋/10a
桃	10月上旬	桃 秋 ペ レ ッ ト	3袋/10a
いちじく	10月上旬	静岡フルーツペレット	4袋/10a
梅	10月中旬	静岡フルーツペレット	5袋/10a
土壌改良剤	10月	苦土セルカ2号	10袋/10a

静岡県病害虫防除所の情報を有効活用しよう！

パソコン・スマートフォンを利用して静岡県病害虫防除所を検索すると、発生予察情報、病害虫発生状況関連情報等を見る事が出来ます。それによって、どんな病害虫の発生が多くなるのか等、事前に確認する事によって、的確な防除時期を把握出来ます。

また、情報は毎月末に更新されます。