

東部購買店便い 9月号

J A静岡市あさはた支店 東部購買 TEL: 245-7527 購買店 TEL: 245-7555

茶	苺・水稻・蔬菜	柑橘・果樹	女性部 (しづはた兼任)	購買
松尾	松尾・小柳・奥田	大塚	大越	橋本・萩原・中村 (早)・松下・鈴木 中村 (則)・田山

購買店よりお知らせ

10月から始まる2拠点化に伴い、下記のとおり営業時間を変更させていただきます。

「東部購買店」での営業 ↔ 「北部アグリセンター」での営業

9/29 (火)	9/30 (水)	10/1 (木)	10/2 (金)	10/3 (土)	10/5 (月)
午前営業 (8:00~12:00)	終日閉店	通常営業 開始	通常営業	午前営業 (8:30~12:00)	グランド オープン

幹旋図書のお知らせ

日頃より、農協事業につきましてはご理解とご協力を頂き厚くお礼申し上げます。

農業経営記録簿等図書の注文を受付します。購入希望の方は下記の電話番号までご連絡ください。

予約注文となっていますので、期日を過ぎるとご購入できない場合があります。また、お申込後の取り消しはできませんのでご了承下さい。宜しくお願い致します。

◇ 農業経営記録簿 … 700円

◇ 継続日記 (3年用ヨコ書き) … 4,080円

◇ 継続日記 (5年用タテ書き) … 4,080円

◇ 継続日記 (5年用ヨコ書き) … 4,080円

※ 「3年連続日誌」「36か月日誌」
「野菜づくりノート」「葉茎菜づくりノート」
「果菜・根菜づくりノート」は、取り扱いがなくなりました。

申込締切→10月8日(木)まで

※代金につきましては、口座からの引き落としとさせていただきます。

〈ご注文に関する問い合わせ先〉

9月末まで →054-245-7527

10月1日以降→054-298-6600

お得な
年間予約!

年得肥料推進運動実施中!

肥料の予約注文により、当用価格よりも安価でお買い求めいただけます! また、コスト対策用品として、大幅な予約値引きを設定した肥料もございます。

詳細は後日配布の注文書をご確認ください!

☆この機会に予約注文をよろしくお願い致します☆

農業祭で農産物即売会やります!

農産物出荷のお願い



農業祭にて『農産物即売コーナー』を設け、野菜等の販売を計画しています。是非、出荷して頂きますようお願い申し上げます。

残暑が厳しい中ではありますが、播種、作付けをお願いいたします。

茶

【防除】

◆ カンザワハダニ 防除時期: 10月下旬~11月上旬 (越冬前・秋整枝後)
ダニサラバフロアブル 2,000倍 (7日)

※ 輪斑病・赤焼病の発生が予想される園では、
秋整枝直後にカスミンボルドー1,000倍(14日)を散布してください。

【秋整枝】

(目的) 摘採面を均一にする。園地の生育状況、生産能力にあった芽数に調整する。

(時期) 平均気温が18℃~19℃に下がった頃 (日の最高気温+最低気温÷2)

平地: 10月下旬 山間地: 10月中旬

※ 秋芽が長く伸びている茶園では、日焼け防止の為、本整枝の7~10日前に
秋整枝予定位置より2~3節上で1度整枝して下さい。

※ 高温による再萌芽が見られますので、気温の推移に注意して下さい。

(深さ) 葉層を8cm以上確保する。2茶の整枝位置より約5cm (2~3節) 上で整枝する。
整枝位置が浅いと「芽重型」、深いと「芽数型」になりやすい。


それぞれの圃場の樹勢、園相で判断する。

野菜 秋冬アブラナ科野菜ヨトウムシ・アオムシ等の防除

薬剤名	キャベツ	ハクサイ	ダイコン	ブロッコリー
プレバソン フロアブル5	2,000倍 前日・3回以内	2,000倍 前日・3回以内	2,000倍 前日・3回以内	2,000倍 前日・3回以内
アフーム乳剤	1,000~2,000倍 前日・3回以内	1,000~2,000倍 7日前・3回以内	1,000~2,000倍 7日前・3回以内	1,000~2,000倍 3日前・3回以内
プレオ フロアブル	1,000倍 7日前・2回以内	1,000倍 7日前・2回以内	1,000倍 14日前・2回以内	1,000倍 7日前・2回以内
ディアナSC	2,500~5,000倍 前日・2回以内	2,500~5,000倍 前日・2回以内	2,500~5,000倍 前日・2回以内	2,500~5,000倍 前日・2回以内

☆指導員よりワンポイント☆

本年はヨトウムシをはじめとする、チョウ目害虫の発生が多くなることが予想されます。
不明点や使い方などは、指導員までお問い合わせください!



水稻

営農センターでいつでも水分量が測定できます。穂を数本お持ち下さい。

1、乾燥

- ① 玄米水分 14~15%に調整する
- ② コンバインで収穫した籾は、早めに乾燥機に投入する。(長時間放置しない)
- ③ 水分減少 (毎時乾燥率) は1時間当たり0.8%以下とする。
(0.8%を超えると胴割粒の発生が多くなる)
- ④ バインダー収穫後、はざかけする場合は1週間を目安とする

2、来年のためのジャンボタニシ対策 (収穫後・水が確保できる場合)

- ① 3~4cm水を溜め3~4日放置し、ジャンボタニシを水面へ出す (10月末までに実施)
- ② 石灰窒素 20~30kg/10aを全面散布後、3~4日放置し殺貝する
※石灰窒素 20~30kgは窒素約4kg/10aに相当するため、次作の施肥量に注意
- ③ 自然落水する (用水路に流さない)
コシヒカリや倒伏田でこの方法を行う場合は次作の施肥量に特に注意してください。

㊦の表示のある農薬は購入時に印鑑が必要です。

柑橘

温州、中晩柑類全般の摘果作業も終盤に差し掛かる事かと思われませんが、猛暑による日焼け果が散見されます。2次被害を防ぐためにも日焼け果は最後に摘果しましょう。また、夏秋梢にハモグリガが寄生すると、食害痕からカイヨウ病に罹病しやすくなりますので、再発芽をしない10月中旬以降に不要な夏秋梢は切除してください。

カメムシについて市内でも発生が確認されています。虫尻期以降、昼夜の寒暖差が出てきた頃や台風後に多発生の恐れがあります。そのため、園地をこまめに確認しカメムシを発見した場合は下記農薬を散布してください。

【防除】（年内出荷を予定しているポンカンへは散布しないこと）

品 種	使用時期	対象病害虫	薬剤名	倍 率	使用基準
中晩柑	10 月中旬	カメムシ・ヨコバイ類	テルスター水和剤	2,000 倍	前日-3 回
		黒点病・赤さび病	オキシンドー水和剤 80	1,000 倍	30 日-3 回
早 生	収 穫 前 (混用散布)	貯蔵病害	ベンレート水和剤 ベルコートフロアブル	4,000 倍 2,000 倍	前日-4 回 前日-3 回

※長雨、台風等により褐色腐敗病の発生が予想される場合は、ランマンフロアブル 2,000 倍（前日-3 回）を樹の下半分へ散布

※中晩柑橘類では、台風襲来でかいよう病の発生が予想される場合は襲来直前に、コサイド 3000 2,000 倍にバイカルディー1,000 倍を加用して散布

【秋肥】10月下旬

早 生 温 州 みかん 50 ペレット 5 袋/10a
スルガエレガント スルガ ペレット 6 袋/10a



落葉果樹

【防除】

作物名	使用時期	対象病害虫	薬剤名	倍率	使用基準
柿	発生時	カ メ ム シ 類	ロディー水和剤 ^㉑	1,500 倍	7 日-3 回
梨	10 月上旬	黒 星 病	キノンドーフロアブル	1,000 倍	21 日-9 回
梅	10 月中旬	か い よ う 病	IC ボルドー 66D	50 倍	—

【施肥管理】

【施肥】落葉果樹の元肥時期です。

※土壌改良資材は元肥2週間前までに施しましょう。（柿・梨・梅）苦土セルカ2号 10 袋/10a

作物名	施用時期	肥料銘柄	使用量
いちじく	10月上旬	静岡フルーツペレット	4袋/10a
梅	10月中旬		5袋/10a
キウイ			ハイワード 5袋/10a
			レインボー 7袋/10a
柿	11月上旬		6袋/10a
梨			6袋/10a

いちご

1、定植後の確認事項

- ① 2 番の分化、根張を考慮し、ハウス内の気温及び地温はできるだけ下げましょう。
→2 番の花芽分化は営農指導員へご相談下さい、随時検鏡致します。
→保温開始の日安は最低気温が紅ほっぺで 10℃、きらび香で 12℃になったときです。
- ② ミツバチの導入が遅れないように注意しましょう。
→定着まで 1 週間～10 日程度かかります、1 番花の出蕾が確認出来たら導入しましょう。
- ③ 頂果房の摘果は 7～10 果を目安に行いましょう。
- ④ 2 番果房は 2 芽にすることで、収量増加を目指しましょう。

☆栽培ワンポイント☆ 定植後の根はり向上及び 2 番の花芽分化促進にむけて

- ① 1 番果房の出蕾時にマルチの被覆。（黒でも白でも同じです。）
- ② 2 番果房の花芽分化後に天面のビニール被覆。

2、定植後の防除 「蜜蜂、天敵放飼前までに徹底した防除を行いましょう。」

対象病害虫	お勧め薬剤	RAC	倍率	日数	回数	蜜蜂	天敵
ヨ・ハ	アファーム（乳）	6	2,000 倍	前日	2 回	2 日	7 日
ヨ	ブレバソン（フ）5	28	2,000 倍	前日	2 回	1 日	なし
ホ・ハ	コロマイト（水）	6	2,000 倍	前日	2 回	1 日	7 日
ア・コ	ウララ DF	29	2,000 倍	前日	2 回	1 日	なし
ス・ヨ	マッチ（乳）	15	1,000～ 2,000 倍	前日	4 回	1 日	なし
ハ・ス・ウ	ポリオキシ AL（水溶）	19	5,000 倍	14 日前	3 回	2 日	14 日
う・炭・灰	ベルコートフロアブル	M7	2,000 倍	前日	5 回	1 日	1 日
炭・灰	セイビアーフロアブル 20	12	1,000 倍	前日	3 回	1 日	1 日

※対象病害虫記号：ヨ→ヨトウ、ハ→ハダニ、ホ→ホコリダニ、ア→アブラムシ、
コ→コナジラミ、ス→スリップス、う→うどんこ病、炭→炭疽病

※上記表における天敵とはミヤコ・チリカブリダニに対する影響日数を示します。

使用時期、収穫前日数、使用倍率に十分注意してください。

注意が必要な薬剤

① 本園では使用できないもの

キノンドーフロアブル	デランフロアブル ^㉑	ジマンダイセン水和剤(収穫 76 日前)
アントラコール顆粒水和剤	リドミルゴールドMZ	アグリメック ^㉑

② 収穫前の日にちが長いもの

オーソサイド水和剤 80	収穫 14 日前	ベンレート水和剤	収穫 30 日前
ゲッター水和剤	収穫 21 日前	ポリオキシ AL 水溶剤「科研」	収穫 14 日前
トクチオン乳剤	収穫 75 日前	ランマンフロアブル	収穫 30 日前

③育苗期と本園で倍率が異なるもの

ベルコート水和剤		ベルコートフロアブル	
育苗期	本園	育苗期	本園
1,000 倍	4,000 倍	1,000 倍	2,000 倍

3、天敵の上手な使い方

- ・導入前にはできるだけ害虫の密度をゼロにしてください。
- ・導入前後は天敵へ影響のある薬剤の使用は避けて定着しやすい環境づくりをしましょう。
- ・導入後 2 週間は葉かきや農薬散布を行わないで定着を促してください。