南部営農だより　11月の防除

南部アグリセンター　電話：237-5580　Fax：237-5155
長田営農出張所　電話：259-3233　Fax：258-2867

『お正月用品』 予約受付　始まります♪

JAのお正月用品で楽しい年末年始（o^―^o）詳細は別紙チラシをご参照ください。

高田農具・展示会

◆11月 2日(月)8:30～12:00
　会場　大谷支店前
◆11月 6日(金)8:30～12:00
　会場　長田集荷場前
◆11月 25日(水)8:30～12:00
　会場　南部アグリセンター前
　ご来店お待ちしています。

令和９年 肥料年間特別予約　受付中♪

★年特予約申込で「オリジナル帽子」プレゼント！　→

今年は黒地にnewマークを刺繍したデザインです(^^♪

予約価格は当用価格より安価となっております！

お得な予約注文のご利用をお願い致します！

11月部農会回覧

- JA 飲料のご案内
- お正月用品　注文書
- もち米注文書
- エイブル回覧図書注文書

有害鳥獣情報(直近の捕獲報告)

鳥獣害	長田地区	南部地区
イノシシ	8頭	3頭
ハクビシン	1頭	1頭

～女性部お知らせ～

- ☆ 11/3（火・祝）8:30～ 長田ブロック農業祭
- ☆ 11/10(火)　13:00～ JA静岡市女性部本部委員会(本店)
- ☆ 11/17(火)　13:30～ ブロック合同：みそ作り(旧内牧支店2階)
- ☆ 11/18(水)　13:30～ 大谷地区女性部役員会(旧南部営農経済センター)
- ☆ 11/21(土)　9:00～ 大里農業祭
- ☆ 11/23(月・祝) 9:00～ 東豊田農業祭

有害鳥獣対策で防護資材の設置をしましょう

イノシシ、シカ、サル、ハクビシン、アライグマ、タヌキなどの被害軽減のため、生産者各自での防護対策のご検討をお願いします。 電気柵などの設置に伴う補助金申請の相談がありましたら南部アグリセンターまたは、長田出張所にご相談下さい。(なお、予算には限りがあるので早めにご連絡をお願いします)

そ菜（ 担当:深井･望月･石原 ）

★病害虫発生予察情報(10 月予報) 令和 8 年 9 月29 日 静岡県病害虫防除所
作物全般 ： ハスモンヨトウ発生量:やや多　オオタバコガ発生量:多
防除のポイント… 同じ系統(分類)の薬剤の連用は避け、発生初期の防除に努めてください。
☆☆ ご存じですか？【RAC(ラック)コード】農薬の分類が農薬のラベルに記載されています！

★タマネギ 適期定植と苗選びでトウ立ちを防ぎましょう
植えつけのポイント： 苗は、葉の長さ20～25cm程度、太さ5～6mm程度で、葉が垂直に伸びているものが望ましい。
植付は、深さ2～3cmで植え、白い部分が地上に少し出るよう植え付けをする。

病害虫	農薬名	RAC	倍率	使用基準
ネギアザミウマ	ウララDF	29	2,000倍	7日-2回
ハスモンヨトウ	プレオフロアブル	UN	1,000倍	3日-2回
べと病･灰色かび病	ダコニール1000	M5	1,000倍	7日-6回

★キャベツ、ハクサイ、ダイコン
追肥の目安 （生育状況に応じて加減してください）

	追肥 肥料	施肥量	1回目	2回目	3回目以降
キャベツ ハクサイ	有機化成10号	4kg/1a	定植後15～20日後	1回目の追肥の20日後	10～15日に1回
ダイコン	粒状固形080	6kg/1a	本葉3、4枚頃	本葉6、7枚頃	2回目の15日後

防除薬剤

病害虫	薬剤名	RAC	倍率	ハクサイ	キャベツ	ダイコン
アブラムシ類	ウララDF	29	2,000倍	前日-2回		
	スタークル顆粒水溶剤	4A	2,000倍	3日-2回	3日-2回	7日-2回
アオムシ･コナガ	プレバソンフロアブル5	28	2,000倍	前日-3回		
	アファーム乳剤	6	2,000倍	7日-3回	前日-3回	7日-3回
白さび･軟腐病	ジーファイン水和剤	NC	1,000倍	前日-回数の制限なし		

土壌診断のお知らせ

【受付締切】　11月19日(木)まで に 南部アグリセンター又は長田営農出張所へ提出
【分析料金】　1検体 1,330 円 ※分析料金は購買代金として翌月引落です
【圃場内の採土位置･採土方法】
(1) 圃場内の5ヶ所(図1)からから採土、混合してから必ず風乾する
(2) 深さ15cm程度V字型に堀り、斜面に沿い2cmを採土する(図2)
(3) 乾燥させた土は、1mmのふるいにかけ、1検体500g以上を紙袋に入れる
(4) 「支店名」･「氏名」･「電話番号」･「作物名」･「施設･露地の別」などを明記する

図1:圃場の平面図



図2:採土場所の断面図

JA静岡市 耕種委員会主催 玄米品評会のお知らせ

令和8年産の玄米を用いて、下記の通り品評会を実施します。多くの方の出品をよろしくお願いいたします。
開催日時:11月24日(火)
出 品 物:11月18日(水)までに最寄りの南部アグリセンター又は長田営農出張所へお持ちください
審査方法:食味検査及び外観審査を行います。
要　領:1点500gのうるち玄米。複数の品種の出品が可能です(1品種1点までとします)

㊟注意:農薬購入の際は印鑑をご持参ください

落葉果樹 〔 担当:森 〕

作　物	使用時期	病　害　虫	薬　剤　名	倍　率	使用基準
キウイ（ヘイワード）	11月上旬	貯蔵病害	ストロビードライフロアブル	2，000倍	前日－3回
	ヘイワード収穫・・・糖度 7 度以上（目安は11月中旬位～）				
東京ゴールドヘイワード	収穫直後	かいよう病	コサイド 3000（バイカルティ 1,000 倍加用）	2，000倍	―
ナシ	11 月中旬	黒星病、うどんこ病	落葉処理（土中すきこみ）		

施肥　翌年の初期生育促進のため、樹の養分吸収力に余裕がある時期に施用します。

11 月上旬　静岡フルーツペレット　カキ（収穫後）…6 袋　ナシ…6 袋

落葉果樹は秋肥が重要です。10 月号掲載の施肥がまだの方は必ず実施しましょう。

柑　橘 〔 担当:新出 〕

品種	使用時期	病害虫	薬剤名	倍率	使用基準
青島温州	収穫前	貯蔵病害	ベンレート水和剤	4,000 倍	前日－4 回
			ベルクート水和剤	2,000 倍	前日－3 回

※ハダニが発生した場合は、カネマイトフロアブル 1,500 倍（7 日－1 回）を散布する。

☆施肥

青島温州・ポンカン　みかん50ペレット　6袋/10a　（11 月上～中旬）
はるみ・不知火　　みかん50ペレット　4袋/10a
早生温州　　みかん50ペレット　5 袋/10a　（収穫70%終了時）

☆青島温州の管理・収穫

・樹上選果（青島温州）：果皮の粗い果実、大玉果（3L　以上）の摘果を収穫までに行いましょう。上向きの天成り果は結果枝ごと除去をしましょう。
・収穫（早生・青島温州）：収穫前に必ず防腐剤を散布し、早生みかんは完全着色で収穫をしましょう。青島温州では年明けに出荷するものは7～8分着色で収穫をしましょう（浮皮果の発生防止、鳥獣被害軽減）。
・枝吊りや・枝の添え木：裾枝果の着色促進・品質向上の為に、10月下旬から実施しましょう。

☆浮皮対策・・・少しでも浮皮を軽減するために対策資材を散布しましょう！

・クレント：有効成分の炭酸カルシウムが薄く均一付着することにより、雨や朝露で濡れた果皮表面の乾燥を促進する効果もあります。（クレントは取寄せです、早めの注文をおねがいします！）
温州ミカン：100倍　1 回目 ⇒ 着色初期　2 回目 ⇒ 4～5分着色
（詳細な使用方法については、長田営農出張所へお問い合わせください。）

カメムシ情報　11 月も目前となりましたが、カメムシは現在も活動中です。引き続き警戒し、必要に応じ防除をお願いします。



茶 （ 担当:森・岩田 ）

時　期	病　害　虫	薬　剤　名	倍　率	使用基準	使用方法
秋整枝後	カンザワハダニ	ダニサラバフロアブル	2,000 倍	7 日－2 回	単　用

・ハダニは茶株の裾葉で冬を越します。防除する際は裾葉の裏へ散布してください
・輪斑病・赤焼病の発生が予想される場合は秋整枝直後にカスミンボルドー1,000 倍（14 日-2 回）を散布してください

いちご （苺班）

《本圃》 株の整理とハウスの環境制御を意識しましょう。

1、　株管理
（1）　摘葉は出蕾時 5 枚以上になるように実施する。（収穫時期は 7～8 枚管理とする。）
（2）　2 芽になるよう、わき芽を整理する。（ドロ芽は除去する。）
（3）　頂果房の摘果は 7～10 果を目安に。
※　株出来が悪い状態で、出蕾してしまった場合はきつめに摘果する。
（4）　少量多頻度灌水を基本とする。（給液量は吸水量の 1.5 倍を目安に）
（5）　定期的に給液及び排液の確認をしてください。（EC、PH、排液量）
※　適当な容器に入れ営農指導員にお持ち込頂ければ、無料で測定致します。
※　排液はバケツなどに 1 日分を溜めておいたものを持って来てください。

2、　ミツバチ管理
（1）　導入のタイミングは 1 番の出蕾を確認した時点です。
（2）　到着後すぐには解放せず、蜜蜂が落ち着いたら夕方か夜、早朝に開放してください。
※解放までは、網窓にしておき通気性を確保する。
（3）　蜜蜂は導入後すぐに訪花せず、2～7 日ほど偵察バチがハウス環境を確認してから、働きバチが訪花活動を行います。



3、　温度管理　基本の温度 25℃～27℃（日中）を意識して、管理しましょう。
（1）　保温開始目安：最低気温が 10℃を下回ってから（きらぴ香の場合は 12℃です。）
※基本は保温開始の目安のため、2 番の検鏡を実施しましょう！！

☆栽培ワンポイント☆

「定植後の根はり向上及び 2 番の花芽分化促進にむけて適期に被覆を行いましょう。
作業は大変ですが、収量向上に向けて実施をお勧めします。」

①　1 番果房の出蕾時にマルチの被覆。（黒でも白でも同じです。）
②　2 番果房の花芽分化時に天面のビニール被覆。

4、　病害虫防除　「収穫開始前に徹底した防除をお願いします。」

対象病害虫	お勧め薬剤	RAC	倍率	日数	回数	蜜蜂	天敵
うどんこ病	クロスアウト（フ）	50	3,000～4,000 倍	前日	3 回	1 日	なし
うどんこ病	パレード20（フ）	7	2,000～4,000 倍	前日	3 回	1 日	なし
灰色カビ病	ファンタジスタ顆粒（水）	11	2,000～3,000 倍	前日	3 回	1 日	なし
ハダニ	マイトコーネ（フ）	20D	1,000 倍	前日	2 回	1 日	なし
ハスモンヨトウ	プレバソン 5（フ）	28	2,000 倍	前日	2 回	1 日	なし
ハスモンヨトウアザミウマ類	マッチ（乳）	15	1,000～3,000 倍	前日	4 回	1 日	なし
アブラムシ類コナジラミ類	ウララ DF	29	2,000 倍	前日	2 回	1 日	なし
アブラムシ類コナジラミ類	チェス顆粒（水）	9B	5,000 倍	前日	3 回	1 日	なし