北部アグリセンター便り（東部版）



10月号

東部購買店だより　令和８年10月20日発行

TEL：指導･販売 054-298-6600　　購買 298-6605

茶	苺・水稲・蔬菜	柑橘・果樹	女性部（しづはた兼任）	購買
折山	山森･石原･奥田	内野	大越	鈴木･熊川･田山･中村

北部アグリセンター　稼働のお知らせ

令和８年１０月に北部アグリセンターがオープンしました。
購買店舗、指導・販売の新たな拠点です。是非お越しください。
場所は、旧あさはた北支店跡地、柑橘共撰場前（葵区北 1-8-54）です。




千代田ふれあい農協祭

日時：11月3日（火･祝）
時間：9：00～11：00
会場：千代田支店駐車場

あさはた・西奈・安東合同農業祭

日時：11月21日（土）
時間：9：00～11：00
会場：あさはた支店駐車場



みなさまのご来場
お待ちしています！

令和９年度　肥料年間特別予約　始まります!!

お得

予約価格は当用価格より安価となっていますので、申込書にてご確認ください！

下記の銘柄は特別に「コスト対策用品」として、大幅な予約値引を設定しました！

銘柄	当用価格	値引額	予約価格
粒状固形 080	4,120 円	▲660 円	3,460 円
苦土セルカ２号(粒)	2,140 円	▲380 円	1,760 円
JA ナイス配合	2,820 円	▲500 円	2,320 円
デルトップ win	5,570 円	▲860 円	4,710 円
果菜配合３号	4,420 円	▲700 円	3,720 円
ナイスワンパワー823	6,940 円	▲1,000 円	5,940 円
柑橘ペレット頂	4,560 円	▲730 円	3,830 円
与作いちご専用培土	3,960 円	▲540 円	3,420 円

ぜひ、お得なこの機会に予約注文をご利用ください！

※　情勢により、価格変更の場合が有ります。



柑橘

極早生品種の収穫も大詰めを迎え、早生品種の収穫へと移り変わる時期です。今年度は９月中旬以降カメムシの発生が急増している状況です。カメムシに吸汁されると、果実が黄色くなり落果します。こまめに園地を確認し被害果やカメムシの発生があった場合には早急に防除を行ってください。早朝に農薬散布を行うと、カメムシの羽に露が残り飛び立たないため、効果的な防除ができます。

（カメムシ防除…スタークル顆粒水溶剤　2000倍　前日―3回　等）

収穫期の近い品種では、農薬の収穫前日数に注意してもらうとともに、収穫の際には果実を丁寧に扱い、傷みによる腐敗果の発生を抑えるようにしましょう。

【防　　除】　温州みかん

散布時期	病害虫名	農薬名	希釈倍率	使用基準
発生時	ミカンハダニ	カネマイトフロアブル	1,500倍	7日―1回
収穫前	貯蔵病害（混用散布）	ベルクート水和剤	2,000倍	前日―3回
		ベンレート水和剤	4,000倍	前日―4回

【防　　除】　中晩柑

散布時期	病害虫名	農薬名	希釈倍率	使用基準
発生時	ミカンハダニ	カネマイトフロアブル	1,500倍	7日―1回

【秋　　肥】

品種	施肥時期	肥料名	施肥量
スルガエレガント	10月下旬	スルガペレット	6袋／10a
早生温州		みかん50ペレット	5袋／10a
青島温州	11月上旬		6袋／10a
ポンカン			6袋／10a
不知火・はるみ			4袋／10a

落葉果樹

【秋　　肥】　落葉果樹の元肥時期となります。

作物名	施肥時期	肥料名	施肥量
柿	11月上旬	静岡フルーツペレット	6袋／10a
梨			

茶

【カンザワハダニ】秋整枝後　　ダニサラバフロアブル 2,000倍 （７日）
【赤焼病の防除】　秋整枝直後　　カスミンボルドー　　1,000倍 （14日）



【再整枝（化粧ナラシ）】
＜時　期＞ 年内に行う場合は１１月中下旬（２月下旬～３月上旬でも結構です。）
＜深　さ＞ 秋整枝位置より絶対に深くしない。
＜目　的＞ 秋整枝後に発生する遅れ芽や立ち葉など、整枝面から上に出ているものを除去する。
※ できるだけ逆刃のナラシ機を使用する。


廃プラ・ビニール回収日程

廃プラスチック回収	令和８年11月中下旬	※委任状をいただいている方に、
廃ビニール回収	令和８年12月上旬	後日詳細をお知らせいたします

水稲

1、　貯蔵時の病害虫対策

品名	使い方
ネルパック	真空貯蔵袋、３０ｋｇ用。（コクゾウ虫やカビを防ぐ）
エージレス	ネルパックに入っている脱酸素剤で、詰め替え用 効果の切れた物と入れ替えて使用する（効果１年間）



※ 保管場所にクズ米やヌカが落ちていないようきれいに掃除しておくこと。
※ 15℃以下で保存すること（病害虫が活動を停止する温度）

2、　土づくり資材

品　　名	施用量/10ａ	特　　徴
けい酸加里プレミア34	2～3袋	・水に溶けにくく流亡しにくい ・根から直接吸収される



ケイ酸の効果
- 不稔実米を減少させ、粒張りを良くする。
- 葉をピンと立たせ、光環境を良くし光合成を促進させる。
- ケイ化細胞を強化し茎葉を硬化させ、倒伏・病害に強い稲を作る。

玄米品評会のお知らせ

多くの方の出品をよろしくお願いいたします。

開催日：11月24日（火）　　締　切：11月19日（木）
規　格：玄米500g（うるち米、１品種１点まで）袋へ氏名・連絡先・品種名を明記
提出先：北部アグリセンター　　（担当：石原・奥田）

土壌分析のお知らせ

詳しい採取の方法は年特施肥設計の『土壌診断のススメ』をご覧ください。

1. 受付期間と提出先
   締切：11月13日（金）　提出先：北部アグリセンター
2. 試料について
   （1） 風乾した土を500ｇ（紙袋へ入れてください）
   （2） 袋に「氏名」・「連絡先」・「作物名」・「施設・露地の別」などを明記して下さい。
3. 料　　金：税込 1,330円（購買代金として請求）

いちご

★今月の管理のポイント★
２番の分化を確認したら保温を開始してください。収穫に向けて株の整理を行い、天敵導入、蜜蜂導入を計画的に進めましょう。
本圃：１番果房の出蕾を確認したら蜜蜂を導入しましょう。
：天敵導入に向けて農薬散布や葉かき等準備を整えましょう。
：暖房機の稼働が正常か本格始動前に動作確認をお願いします。
：高設栽培の方は、給液排液の確認を随時行

1、　株管理
（1） 摘葉は出蕾時５枚以上になるように実施する。（収穫時期は7～8枚管理とする。）
（2） ２芽になるよう、わき芽を整理する。（ドロ芽は除去する。）
（3） 頂果房の摘果は7～10果を目安に。
※　株出来が悪い状態で、出蕾してしまった場合はきつめに摘果する。
（4） 少量多頻度灌水を基本とする。（給液量は吸水量の1.5倍を目安に）
（5） 定期的に給液及び排液の確認をしてください。（EC、PH、排液量）
※　適当な容器に入れ営農指導員にお持ち込頂ければ、無料で測定致します。
※　排液はバケツなどに１日分を溜めておいたものを持って来てください。

2、　ミツバチ管理



（1）　導入のタイミングは１番の出蕾を確認した時点です。
（2）　到着後すぐには解放せず、蜜蜂が落ち着いたら夕方か夜、早朝に開放してください。
※解放までは、網窓にしておき通気性を確保する。
（3）　蜜蜂は導入後すぐに訪花せず、2～7日ほど偵察バチがハウス環境を確認してから、働きバチが訪花活動を行います。
（4）　エサの蜜をあげすぎると、蜜を巣穴にため込みすぎて次の子孫を残せなくなってしまいます。訪花活動も鈍りますので、基準量を守りましょう。（納品直後の巣箱の重さが概ね蜜の入っている適正重。）
目安（どれどれ）：納品１週間後、その後7～10日間隔で給餌。150～200ml/回施用。
※日中のハウス内気温が18度以下になるハウスは2～3週間に１回。
（5）　厳寒期は毛布などを巣箱にかぶせ保温してあげましょう。
（6）　ミツバチの定着が悪い場合は、誘引剤を使いましょう。（ビーセントルアーやカモンビービー等）

3、　温度管理　　基本の温度25℃～27℃（日中）を意識して、管理しましょう。
保温開始目安：最低気温が10℃を下回ってから（きらぴ香の場合は12℃です。）
→保温開始の目安のため、２番の検鏡を実施しましょう。

4、　病害虫防除　『被害が大きくならない様に、早めの発見と早めの防除を心掛けましょう。』

☆天敵の導入のポイント☆
①ミヤコの生育零点は8.6℃、チリの生育零点は11.6℃です。
②放飼前にハダニの防除を徹底しておきましょう。（極力ゼロ放飼でお願いします。）
③天敵放飼後２週間は薬剤散布と葉かきを控え、定着をうながしましょう。
④定着をうながす為、ハウス内湿度を上げましょう。（目標６０%以上）
⑤放飼後にハダニが発生した場合は気門封鎖剤をスポット散布し、チリの追加放飼も有効です。

注意したい薬剤　※一部抜粋です。この他にもありますので十分に調べてから散布してください。

薬剤名	RAC	収獲前日数	天敵（ミヤコ・チリ）	蜜蜂	マルハナバチ
グレーシア（乳）	30	前日	100日以上	1日	1日
サンマイト（フ）	21A	収獲開始3日前	30日	4日	1～4日
ポリオキシンAL（水溶）	19	収穫開始14日前	14日	1～2日	0日
モスピラン顆粒（水溶）	4A	前日	14日	1日	1～3日
カスケード（乳）	15	前日	ミヤコ（7日）	1～2日	2日
コロマイト（水）	6	前日	7日	1日	1日
アファーム（乳）	6	前日	7日	2日	2日

※㊧の表示のある農薬は購入時に印鑑が必要となります。