

2021 **2月** 美和営農経済センターだより

美和営農経済センターだより 令和3年2月20日発行

JA静岡市

電話 296-2121 ファクシミリ 296-2125

| | | | | | | | | | | | |
|-------|----|---------|-----|--------------|----|-------------|----|-------------|----|----|----|
| センター長 | 大沼 | お茶・果樹 | 村田 | TAC | 武田 | 購買 | 渡辺 | 購買 | 渥美 | 購買 | 青島 |
| 女性部 | 市川 | 苺・野菜・水稲 | 宇佐美 | 野菜・苺 青壮年部 | 望月 | 購買・ 地区担当 | 滝浪 | 購買・ 地区担当 | 山田 | | |

★確定申告【ソリマチ農業簿記利用者の方へ】★

下記にて受付を致します。都合の悪い方は個別に対応しますので事前にご連絡下さい。
一般の方（ソリマチ以外の方）は下記での受付はできませんのでご了承ください。
当日は申告書作成まで行いますので、各種源泉徴収票、マイナンバーカード、医療費控除、保険の
証明書など必要なものは全てご持参下さい（先月号の営農便り参照）。

【ソリマチ農業簿記 申告受付】

| 日 | 時間 | 対象地区 | 会場 |
|---------|--------|------------|--------|
| 3月3日（水） | 9:00~ | 内牧地区 | 美和支店2階 |
| | 13:30~ | 美和地区（内牧以外） | |
| 3月4日（木） | 9:00~ | 松野・油山地区 | |
| | 13:30~ | 足久保・その他の地域 | |

農協購買店をぜひご利用ください！

静岡産100%

べにふうき

春まき野菜のタネ
続々、入荷中！！

😊 ペットボトル 2,470円
(350ml × 24本)



飲み続けて花粉症の季節をスッキリ乗り切る！
花粉症への効果は？詳しくはWebで「べにふうき 花粉症」で検索

春の除草剤キャンペーン 3月末日まで！！

お買い得商品の一例

- ・タッチダウン 6ℓ 通常 11,748円 ⇒ 10,800円！
- ・ラウンドアップ 20ℓ 通常 37,719円 ⇒ 35,980円！さらに2ℓ1本プレゼント！！
- ・バスタ液剤 10ℓ 通常 34,969円 ⇒ 32,800円！オリジナルバケツプレゼント！！
- ・カソロン粒剤 3kg 通常 2,849円 ⇒ 2,680円！

※価格は全て税込です。

※その他にもお買得品を多数用意しています。詳細は別添のチラシをご覧ください。



茶【春 肥】 1回目：2月中下旬 茶配合（5袋） 2回目：3月上旬 茶配合（5袋）
【防 除】 今後気温が高くなると、ダニの多発生が予想されます。

3月中旬（萌芽前）カンザワハダニ

| | | | |
|-----------|--------|----|-----|
| バロックフロアブル | 2,000倍 | 単用 | 14日 |
|-----------|--------|----|-----|

※ チャトゲコナジラミの同時防除は、ダニゲッターフロアブル [2,000倍] を
3月上旬に散布してください。（バロックよりも早め）

※ 赤焼病、もち病の同時防除には、ドイツボルドーA [500倍] を加えて下さい。

【化粧ならし】 摘採面を揃える程度にごく浅く、1番茶芽に刃が掛からない様に実施。

【春 整 枝】 ◎ 時期 2月下旬～3月中旬（井川地区は、3月下旬）

※ 寒害の心配が無くなってから出来るだけ早い時期

◎ 位置 2茶摘採面より5cm上。（三番茶の葉を2～3枚残す）

【改植（幼木の植付）】

定植の時期 … 3月中下旬

定植時の剪定 … 地表面から15cm程の高さで10枚以上の葉を残すように剪定。

【防霜ファンの点検】 設置経過年数がたっているものは特に注意して下さい。

- ◇ ファンの支柱は傾いていないか
- ◇ 電気配線に損傷はないか
- ◇ ファンの回転や首振り是否正常か
- ◇ サーモスタットの感度は正常か

【防霜ファンの稼働】 3月中旬を目安に電源オン。（萌芽2週間前より）

設定温度の例 3月中旬～下旬 3℃ ⇒ 4月上旬～ 4～5℃

◇ JA 茶共販ご利用者へのお知らせ ◇

茶栽培日誌（防除・施肥）の回収について

茶履歴管理システム利用者は、1番茶摘採前に栽培記録の提出が必要になります。
提出がないと共販出荷ができませんので、ご協力よろしくお願い致します。

- ◎ 対象者：荒茶共販出荷者
- ◎ 提出物：茶栽培日誌（1防除・2施肥の記録用紙）
- ◎ 提出先：美和営農経済センター

または 最寄りの農協支店窓口に営農センター宛てで提出

- ◎ 提出日：1番茶摘採前、最後の作業（防除・施肥）を行った後、
できるだけ速やかにご提出願います。

注意：農業を散布していない場合でも「無散布」として履歴を提出する必要があります。

◇ 茶樹粉碎機の利用を随時、受け付けております ◇

粉碎機は、茶樹の地上部を粉碎することができ、茶の改植や転作に役立ちます。

お申込みは、美和営農経済センターまでお願い致します。

【利用料金】 実質の稼働時間 1時間当り 15,000円

ただし稼働時間が1時間未満の場合は、一律15,000円いただきます。

◎ 作業時間の目安は、10a当り2～3時間です。

※ 急傾斜 や 幅2m以上の道が無い場合はお引き受けできない事もあります。

※ 4月中旬～5月下旬は茶期のため、受付できませんのでご注意ください。



いちご

ダニ・スリップスの発生や多湿による病気発生が心配されます。早期防除を心掛けてください。

1. 今後の管理

- (1) 灌水量に注意しましょう。高設栽培の方は排液量のチェックを！
- (2) 株の整理（摘果・り病部の除去・下葉かき・収穫終了した果房の除去）
- (3) 病害防止の為、取忘れの過熟果、老化した葉、感染した部位を取り除き圃場外に持ち出す。

うどんこ病・灰色カビ病防除薬剤（灰色カビ病は薬剤散布だけでなく十分に換気を行う）

| 薬剤名 | 倍率等 | 使用基準 | RAC | 入峰 | 天敵 | 備考 |
|-------------|-----------------|-------|------|----|----|-----------|
| シグナムWDG | 2,000倍 | 前日-2回 | 11・7 | 0日 | ○ | カンタスを含む |
| アフェット(F) | 2,000倍 | 前日-3回 | 7 | 1日 | ○ | |
| パレード20(F) | 2000~4000倍 | 前日-3回 | 7 | 1日 | ○ | |
| ファンタジスタ(顆水) | 2,000~3,000倍 | 前日-3回 | 11 | - | ○ | |
| ピクシオDF | 2,000倍 | 前日-4回 | 17 | 1日 | ○ | 臭気が残る場合あり |
| ロブラールくん煙 | 300~400立方m/100g | 前日-4回 | 2 | 3日 | ○ | |

アザミウマ防除薬剤

| 薬剤 | 倍率 | 使用基準 | RAC | 入峰 | 天敵 | 備考 |
|--------|--------------|-------|-----|----|-----|--------|
| マッチ(乳) | 1,000~2,000倍 | 前日-4回 | 15 | 1日 | ◎ | ミカンキイロ |
| ベネビアOD | 2,000倍 | 前日-3回 | 28 | 1日 | ◎ | |
| ディアナSC | 2,500~5,000倍 | 前日-2回 | 5 | - | 14日 | |

※ベネビアODは展着剤を入れずに使用して下さい。(OD・・・油性懸濁剤)

ポタニガードES（微生物殺虫剤） ※基本的に殺菌剤との混用はしないでください。

| | | | | |
|------------------|----------|------------|------------------|---------------|
| アザミウマ類 コナジラミ類 | ポタニガードES | 500~1,000倍 | 発生初期 使用回数制限なし | ハチ、天敵 影響なし |
|------------------|----------|------------|------------------|---------------|

コナジラミやアザミウマへ寄生するカビの仲間です。化学殺虫剤との混用で効果が上がります。

2. 親株管理

充実した子苗を得るために、3月下旬までに親株を定植しましょう！！資材はイチバンで消毒を！
きらび香の場合、気温が低い時期はランナー発生が悪く、特に露地育苗ではほとんど出ないので、親株定植後発生したランナーは残して置いて下さい。
春季は20日間隔でIB化成を株あたり6~8粒施用。気温や草勢をみて加減してください。
肥料切れに注意して下さい。

令和2年度JA静岡市いちご果実品評会

令和3年1月22日 開催

- 1等 4席 松永一雄
2等 市川尊雄 九藤吉夫
3等 柴山秀一 鈴木範之 前田文廣 平野政喜 海野勇生

(敬称略)



水稻

スクミリンゴガイ（ジャンボタニシ）

- ① ロータリーでできるだけ細かく耕起し、越冬貝を破碎する。
- ② 周辺水路内に泥が残っているとその中でも越冬するので、水路から泥を上げ、貝を破碎する。

タマネギ

- ① 追肥は2月下旬~3月上旬までに行なう（肥料が残ると病害を助長、貯蔵性が劣る）
- ② ベと病は春先の雨による感染が多いので雨前後の予防を

| | | | | |
|-----|------------|----------|-------|------------|
| ベと病 | ジマンダイセン(水) | 400~600倍 | 3日-5回 | RAC MO3 |
|-----|------------|----------|-------|------------|

サヤエンドウ（キヌサヤ・スナック）

- ① 3月上旬には燐加安14号、4kg(1a)を追肥する。除草を兼ねて中耕・土寄せも実施
- ② 気温の上昇とともに3月頃から病害虫が発生するので早めの防除を心がけること

| | | | | |
|--------|---------------|--------------|-------|------------|
| うどんこ病 | サンヨール | 500倍 | 前日-4回 | RAC MO1 |
| ナモグリバエ | パダンSG(水溶) (劇) | 1,500~3,000倍 | 前日-3回 | RAC 14 |

ソラマメ（未成熟）

- ① 追肥は3月上旬に燐加安14号を6~10kg/1a
- ② 放任しておくと倒れやすくなるので分枝は5~7本に整理し追肥したあと中耕・土寄せする

| | | | | |
|---------|------------|-------------|--------|------------|
| 輪紋病・さび病 | ジマンダイセン(水) | 400~600倍 | 30日-3回 | RAC MO3 |
| アブラムシ | スミチオン(乳) | 1,000~2000倍 | 3日-3回 | RAC 1B |

★展着剤紹介★

| 分類 | 展着剤名 | 添加量 ml/10ℓ | 湿展性 | 浸透性 | 固着性 | 特徴 |
|----|---------|---------------|-----|-----|-----|---------------------------|
| A | クミテン | 0.5~3 | ◎ | ○ | ○ | 付着性により量を加減 |
| | ブレイクスルー | 1~2 | ◎ | ○ | | 薬液が大きく広がり、濡れやすくなる。汚れ軽減効果。 |
| | まくぴか | 1~2 | ◎ | ○ | | |
| B | ミックスパワー | 3.3~10 | ◎ | ◎ | ○ | 浸透性が高く、薬剤を均一に付着させる。 |
| | ニーズ | 5~10 | ◎ | ◎ | ◎ | 殺菌力が強化され、薬剤の効果を高める。 |
| | アプローチBI | 5~10 | ○ | ◎ | ○ | 治療剤の浸透力を高め、効果の増強、残効の強化。 |
| | スカッシュ | 5~10 | ◎ | ◎ | ○ | 殺虫剤(ダニ剤等)への加用で、効果を安定・向上 |
| C | アピオンE | 10~20 | | | ◎ | 作物表面へ固着し、残効性を高める。蒸散を抑える。 |

※湿展性：濡れ広がる性質 浸透性：薬剤が浸透する性質 固着性：作物体にくっつく性質
アミスター(F)、カンタス(DF)、シグナムWDGは分類Bと混用×
展着剤の加用しすぎには注意してください。効果の低下だけでなく薬害の恐れがあります。