



しづはた営農経済センターだより 静岡市葵区下1459-1 ☎ 054-294-9330

センター長	女性部	購 買	茶	茶・有害鳥獣	野菜・草・水稻	果樹
高橋	漆畠	橋本・中村・正八	佐藤	平野	稻葉	伊藤
配送	加藤	昭府町担当・配送	長谷川	大河内担当	大石	梅ヶ島担当

## 《茶》1番茶に向けて大事な管理のスタートです。



1番茶前の大事な管理が始まります。生葉品質は日々の栽培管理に左右され、結果として茶価の相場にも影響します。その為にも、1番茶前の肥培管理などの徹底をお願い致します。茶園の状態については、気象条件によっては3月からの芽の動きが活発になることも考えられますので、1番茶の摘採開始時期を逆算し計画的に早めの作業を行って下さい。

### 〔春 月巴〕

2回目 3月上旬 静岡茶配合（有機質肥料） 5～7袋／10a  
(山間地) 3月下旬 静岡茶配合（有機質肥料） 5～7袋／10a

### 〔春寒警報〕 寒さが厳しい所・干ばつの影響が大きい茶園では十分注意する事！！

時 期 2月下旬から3月中旬にかけて、寒害をうける恐れのなくなった頃。  
(山間地) 3月中旬

深 さ 昨年の二番茶摘採面から4～5cm（三番茶葉2～3枚残す）の位置。

### 〔再寒警報〕 (ヒビキ) 芽に掛からないように注意しましょう！！

時 期 2月中旬から寒害をうける恐れのなくなった頃。  
秋整枝面より深くならないよう注意し、摘採面を揃える程度にごく浅く、芽が動いた後の立葉の除去は手バサミで丁寧に行って下さい。

### 〔病害虫防除〕

赤 焼 病 2月下旬 ドイツボルドーA 500倍 14日 単用

◎カンザフハダニ 3月中旬～下旬 バロックフロアブル 2,000倍 14日 单用

※バロックフロアブルは殺卵・殺幼虫効果主体であり、成虫には効果がないが

その成虫が産んだ卵はふ化しない。

※ オマイト乳剤1,500倍14日单用を散布の時は新芽に対して薬害があるので注意する。

## 《茶防霜ファン修繕の補助事業のお知らせ》

補助対象 設置後12年を経過した防霜ファンの修繕 補助率 2割(上限10万/台)

※令和3年1月以降の修繕が対象となります。

事前着工は、対象外なので防霜ファンの修繕をする前に必ず農協へ連絡ください。

問い合わせ：しづはた営農経済センター 茶担当 054-294-9330

### 〔防霜ファンの点検〕

防霜ファンの運転開始は通常の場合、萌芽期の2週間前(3月上旬)から開始する。

#### ◆断線の有無

ファンの回転は正常かどうか？

ファンは三相電源で1本切っていても回転するが、断線していると回転や首振り運動が不安定になる。

#### ◆サーモスタット

設定温度で始動するかどうか？

氷水の中にサーモスタットを入れて作動するか確認する。またサーモスタットの設置位置は防霜ファンの影響を受けない、茶園の最も低温になりやすい位置の茶株面に設置します。その際、茶株内部に感知部が入らないように注意する。設定温度は通常3℃とする。

#### ◆効果範囲の点検

柱の傾き、ファンの首振り状態



◎ 防霜ファンで不明な点ありましたら、茶担当まで（佐藤・平野）

## 《茶生産履歴システムについて》

JA 静岡市茶生産履歴システムにご登録されている組合員の方へ（防除・施肥・製造記録）

#### ★1番茶前提出について

1番茶前の施肥・防除管理が済み次第、最寄りの支店までご提出お願いします。

※ 独自システムを導入されている共同工場につきましては従来通りの対応をお願いします。

※ 履歴を提出されない方については、共販出荷できませんので必ず提出お願いします。

## 《HACCP（ハサップ）に沿った衛生管理が義務化されました》

### 加工品の製造販売を行っている方はご注意ください！

HACCPとは、衛生管理を「見える化」することです。下記の方は、期限内までにHACCPの考え方を取り入れた衛生管理をする必要がありますのでご注意ください。

- ・農産物を消費者に販売する場合（無人販売や有人販売など）
- ・食品を製造・加工する営業者で、製造・加工施設に併設した店舗でその食品を小売販売する場合
- ・乾し椎茸、こんにゃく、干しレイモ、梅干し、味噌、漬物、ジャム、仕上げ茶など今まで保健所の許可が不要だった加工品も届出が必要になります。

※ 対象者は、食品衛生責任者の講習会受講 及び

保健所への届出(R3/6/1まで)又は許可(R6/5/31まで)が必要になります。

詳細は、「HACCP」「手引書」で検索ください。不明な点は、静岡市保健所食品衛生課へ。

(054) 249-3167

# 《いちご》

## ～灰色カビ・うどんこ病の防除～

これから気温が上がり始めると、湿度とともにカビが出始めます。

既に一部出始めたところもあるので、注意して防除してください。

どうしても出てしまった場合は、スミレックスくん煙剤を使用してください。



病気名		薬剤名	倍率	使用基準	備考
うどんこ	灰カビ				
○	○	ハーモメイト	800倍	前日-制限なし	
○	○	サンヨール	500倍	前日-6回	※銅剤含む
○	○	フルピカフロアブル	2,000~3,000倍	前日-3回	
○	○	アフェットフロアブル	2,000倍	前日-3回	
○		プロパティフロアブル	3,000~4,000倍	前日-3回	
	○	ピクシオDF	2,000倍	前日-4回	

※ダニオーテが銅成分との混和・近接散布で効果が大幅に減少してしまうため注意。

## ～ハダニ類、アザミウマ類、アブラムシ類の防除～

① 芽欠きや下葉の処理を怠ると、害虫の蔓延を招きやすいです。



被害がひどい場合(クモの巣が張ってしまった等)は、その葉をかいてから薬剤の散布をしてください。

天敵がいても、蜘蛛の巣が見える場合は、薬剤での防除をお願いします。

※迷った時は、営農センターまでご連絡ください。(054-294-9330)

② いつも発生しやすい場所を観察し、早期発見に努めましょう。

(循環扇の風の当たる場所や、入り口付近など、乾燥しやすい場所に発生しやすいです。)

ハダニが発生してしまった圃場は、成虫に効く薬剤だけではなく、必ず卵にも効く薬剤と混用で散布してください。天敵を導入する予定の方は、影響日数に気をつけて散布してください。

例) エコピタ(200倍 幼虫、成虫) + ニッソラン(卵)

※ダニサラバ、スターマイトは同系統の薬剤のため、連用すると効果がない場合があります。

アザミウマ類は、ハチへの影響が考えられますので、マッチ乳剤等を予防的に散布してください。

対象害虫	薬剤名	倍率	使用基準	入蜂	天敵	備考
ハダニ	コロマイト水和剤	2,000倍	前日-2回	1日	7日	卵～成虫
	バロックフロアブル	2,000倍	前日-1回	1日	30日	卵～若幼虫
	マイトコーネフロアブル	1,000倍	前日-2回	1日	1日	幼虫～成虫
	スターマイトフロアブル	2,000倍	前日-2回	1日	1日	卵～成虫
アザミウマ類	マッチ乳剤	3,000倍	前日-4回	1日	1日	
	スピノエース顆粒水和剤	5,000倍	前日-2回	3日	14日	成分が同じため連用を避ける
	ディアナSC	5,000倍	前日-2回	3日	14日	
アブラムシ	モスピラン顆粒水溶剤	3,000倍	前日-2回	1日	14日	コナジラミ アザミウマ類
	チエス顆粒水和剤	5,000倍	前日-3回	1日	1日	コナジラミ
	ウララDF	3,000倍	前日-2回	1日	1日	

## ボタニガードES(生物農薬につき、注文後生産)

ボタニガードはカビの仲間ですが、天敵や蜂に対して影響がほぼありません。

また、その他の殺虫剤と混用することで殺虫効果が向上します。

アザミウマ類 コナジラミ類	ボタニガードES	1,000倍	発生初期 使用回数制限なし	ハチ、天敵に 影響なし
------------------	----------	--------	------------------	----------------

下記の農薬には混用が可能です。

殺菌剤		殺虫剤	
スターマイトフロアブル	マッチ乳剤	アフェットフロアブル	フルピカフロアブル
スピノエース顆粒水和剤	コロマイト乳剤	イオウフロアブル	プロパティフロアブル
マイトコーネフロアブル	チエス顆粒水和剤	スミレックス水和剤	カリグリーン

※薬害がでる可能性はあるため高温時には散布を避け、乾きやすいようにしてください。



## 《水稻》

### 1. 圃場管理

モグラ、ねずみの穴を塞ぎ、アゼの整備をして水もちを良くする。

### 2. 硅酸資材の投入

下記のいずれかを投入する。(袋数は10aあたりの投入量)

珪力燐	6~8袋	混合りん肥	珪カル・リン酸の補給
農力アップ	5袋	けい酸質肥料、鉄、マンガン、苦土、リン酸を含む	
P K グッ士	5袋	主要6成分(リン酸・ケイ酸・石灰・苦土・鉄・マンガン)をバランスよく含む	
どれ太郎	3袋	省力型土作り肥料。リン酸・苦土・ケイ酸・石灰を含む。	

## 《アスパラガス》

アスパラ栽培に大切なのは地力です！堆肥を多めに投入し、疲れた地面を復活させましょう。

春どり収穫中でも、少しずつ肥料を吸うことがわかっていますので、10aにつき10kg程度の緩効性の肥料を取れはじめ頃から施用すると、後半のスタミナ切れに効果的です。

### <水分>

芽が出始めたら、水分を十分に与えてから保温(蒸し込み)を開始します。保温開始時に土が乾燥していると、春芽収穫までに時間がかかり、収穫期間中の灌水量も多くなるため、地温が下がりやすくなります。なので、あらかじめ十分に灌水を行ったあと、保温するようにしましょう。

水温で株が冷えてしまう場合がありますので、灌水は、しっかり日が当たってから行なうようにします。また、夕方の灌水は避けましょう。

## 《やさい》

作物	対象病害	薬剤	倍率	使用基準
タマネギ	灰色腐敗病	スミレックス水和剤	1,000倍	前日-5回
	ネギアザミウマ	プレオフロアブル	1,000倍	3日-2回
ほうれん草	アブラムシ	ウララDF	4,000倍	前日-2回
	ベと病	アリエッティ水和剤	1,500倍	前日-2回

## 《柑橘》

2月に入り中晩柑の出荷が本格化してきました。今年は1月の寒波の襲来で「スルガエレガント」、「不知火」はコハン症などの果皮障害の発生が心配されますので選果の徹底をお願いします。

### ● 防除管理

この時期の病害虫防除は今後の発生に影響してくるので必ず行うこと

作物名	散布時期	対象病害虫	農薬名	希釈倍率	使用基準
温州みかん	発芽前	ミカンハダニ	マシン油乳剤97%	60倍	—
	発芽後	カイガラムシ類		100倍	—
中晩柑	発芽直前	かいよう病	ICボルドー66D	60倍	—

※ボルドー剤とマシン油を散布する場合は2週間間隔をあける。また、マシン油乳剤を先に散布した場合は薬剤が弾かれてしまうため1ヶ月以上間隔をあける。

### ● 春肥の施用 (3月中旬)

青島温州	みかん80ペレット	7袋/10a
不知火・はるみ	みかん80ペレット	6袋/10a
早生温州	みかん80ペレット	5袋/10a

## 《落葉果樹》

### ● 防除管理

作物名	散布時期	対象病害虫	農薬名	希釈倍率	使用基準
いちじく	発芽前	越冬病害虫	石灰硫黄合剤	7倍	発芽前
	3月中旬				
梅	葉芽発芽前	かいよう病	Zボルドー又はICボルドー66D	500倍 50倍	— —
	3月中旬	灰色カビ病	ロブラー水和剤	1,500倍	45日-2回
ぶどう	3月下旬	ケムシ類 アブラムシ類	ダントツ水溶剤	2,000倍	前日-3回
	3月上旬	黒とう病 晚腐病	ベフラン液剤25 または ベンレート水和剤	250倍 200倍	休眠期-1回
桃	3月上旬	ハダニ類 カイガラムシ類	石灰硫黄合剤	7倍	発芽前
		縮葉病	ICボルドー412	50倍	開花前-3回

※ぶどうで上記を混用する場合は、まずベフラン液剤又はベンレート水和剤を溶かしてから、石灰硫黄合剤を加えて薬剤を調整する。また、石灰硫黄合剤を使用する場合は周囲に十分気を付けて使用して下さい。車に付着した場合汚れが非常にとりにくく、また残った農薬は河川に流さず必ず圃場内で処理するようにしてください。

### ● 春肥の施用 (3月中旬)

いちじく	静岡フルーツペレット	6袋/10a
柿	静岡フルーツペレット	3袋/10a



JA静岡市女性部しづはたブロック

## 女性部コーナー令和3年2月号



2/5にしづはたブロックでは、三役のみで役員会を行い、令和2年度の総会について協議しました。令和2年度役員の皆様1年間ご苦労様でした。なかなか思うように活動のできない中、1円玉募金21,760円、書き損じはがき243枚、ウエス（ごみ袋）8袋集まりました。

コロナが原因で、働き場所を失った方々、特に子どものいる家庭が生活困窮者となっており、そこで、JA静岡市女性部として食べ物を寄附するという取り組み内容がありました。今回、しづはたには、梅ヶ島の女性部様、大河内の女性部様、しづはたの女性部様と、本当に大勢の方々から、びっくりするくらいの多くのお心をいただきました。せっかくなので、ふじのくにへ、朝比奈初枝女性部長と行ってきます。皆様から受け取るたびに、心が温かくなり涙が出てきそうでした。本当に皆様のご協力ありがとうございました。

令和3年度しづはたブロック部長 朝比奈 初枝 様が、もう一年引き受けてくださる事になりました。皆様、応援を何卒よろしくお願い致します。

### 行事予定

63月11日(木) JA静岡市女性部 新、旧 本部委員会 13:30～  
3月16日(火) 令和2年度しづはたブロック女性部役員会 12:00～  
4月 2日(金) 令和2年度しづはたブロック女性部総会 しづはた支店 13:30  
【対象者】 令和2年度 各地区役員21名 & 令和3年度 三役5名

HACCPについての研修会を加工グループ対象に開催予定！後日、連絡します

### 教養講座&サークル

3/ 8(月) 健康体操教室 19:30～ しづはた支店

#### ☆お知らせ☆

令和3年度 しづはたブロック総会は、4月2日です！出席対象者以外の方も欠席の欄へ全員お名前をご記入ください。記念品の数を把握するためです。

免疫アップ  
「特集」「あいうべ体操」で  
口と舌を動かし舌筋を鍛え  
ることで、感染症のもどなる  
空気中のウイルスや雑菌を防  
ぎやすい鼻呼吸を促します。  
災地で前を向いて生きる人た  
ちの声を伝えてきました  
東日本大震災から十年。連  
載企画「きずなのか」では、被  
害地で前を向いて生きる人た  
ちの声を伝えてきました  
ごうこれからも  
十年 きずなのか語り継  
「特集」東日本大震災から

読み同鳴家の光  
3