

長田宮農経済センターだより



発行：令和3年3月17日 電話：259-3233 Fax：259-3164 No248

センター長	TAC	柑橘	苺・水稻・蔬菜・青壮年部	落葉果樹・茶・有害鳥獣
畑澤	山森	高橋	大塚・山森	森
女性部	購 買			
山本	岡田 ・ 富永 ・ 石原 ・ 糟屋 ・ 田中			

いちご (担当：山森・大塚)

[今後の管理]

- (1) アブラムシが多発！早期発見をし、防除に努めましょう
- (2) 根の更新、病害虫防除のため下葉を除去しましょう
- (3) 灰色カビ病の対策として換気を適宜おこない、雨の続いた日は灌水を控えましょう

[親株管理]

- (1) 充実したランナーを発生させるために、4月上旬には親株の定植を完了しましょう
- (2) 育苗資材はイチバン（500～1000倍）で消毒してから使用しましょう
- (3) 肥切れを防ぐため、施肥管理に気をつけましょう

(元肥タイプ) 新エコロング413（140日）10g/株
エコロングトータル（140日）※微量要素入り
(追肥タイプ) IB化成 4～6粒/株（2週間間隔）


病害虫	薬剤名	倍数	使用基準	蜜蜂	天敵	備考
ハダニ類	マイトコーネフロアブル	1000倍	前日-2回	1日	○	卵・幼・成
	ダニオーテフロアブル	2000倍	前日-2回	1日	○	卵・幼・成
アザミウマ	カウンター乳剤	2000倍	前日-4回	1日	○	遅効性
	ファインセーブフロアブル【印】	1000倍	前日-3回	1日	○	遅効性
うどんこ病 灰色カビ病	パレード20フロアブル	2000倍	前日-3回	1日	○	予防
	スミレックスくん煙顆粒	6g/100m ³	前日-3回	1日	○	予防
	フルピカくん煙剤【印】	50g/500m ³	前日-3回	1日	○	予防



サトイモ (担当：山森 大塚)

① 種の準備

- ・種芋を6kg/1aを準備しましょう
- ・芽出しをする場合、日当たりの良い畑に苗床（催芽床）を作り、トンネル被覆をしましょう



② 畑作り・元肥施用

- ・植付け2週間前…みのり堆肥 100kg、苦土セルカ2号 10kgを施用しましょう（1a当たり）
- ・植付け1週間前…果菜配合3号を 15kgを施用しましょう（1a当たり）

柑橘 (担当：高橋)

品 種	時 期	病害虫名	薬 剤 名	倍 数	使用基準
温州みかん	4月上中旬 (3種混用可)	ミカンハダニ	マシン油（97%）	100倍	—
		カイガラムシ類	アプロードフロアブル	1000倍	14日-3回
		そうか病	デランフロアブル【印】	1000倍	30日-3回
中 晩 柑 類	4月中旬 (2種混用可)	ミカンハダニ	マシン油（97%）	100倍	—
		カイガラムシ類	アプロードフロアブル	1000倍	45日-3回

＊そうか病多発園は上記以外でマネージDF・フロンサイドSCFL・ファンタジスタを散布しましょう。

＊マシン油とICボルドー66Dの近接散布は14日以上あけましょう。

＊緑化促進・花芽充実・・・リンクエース（葉面散布剤）1000倍（単用で散布）

落葉果樹 (担当：森)

作物	使用時期	病害虫名	薬 剤 名	倍 数	使用基準
桃	4月中旬	モモハモグリガとシンクイムシの防除に交信攪乱剤を設置しましょう コンフューザーMM ⇒10aあたり100～120本			
	4月中旬	タンソ病・灰星病 アブラムシ類 せん孔細菌病	フリントフロアブル25 モスピラン顆粒水溶剤【印】 マイコシールド（混用可）	2000倍 2000倍 2000倍	前日-3回 前日-3回 21日-5回
梨	4月上旬 (鱗片脱落期)	黒星病／赤星病 アブラムシ類 シンクイムシ	ベルコート水和剤 モスピラン顆粒水溶剤【印】 (混用可)	1500倍 4000倍	14日-5回 前日-3回
	4月中旬 (開花期)	黒星病	スコア顆粒水和剤	4000倍	14日-3回
	4月下旬 (落弁期)	黒星病・赤星病 アブラムシ類	アンビルフロアブル オリオン水和剤40【印】 (混用可)	2000倍 1000倍	7日-3回 3日-2回
ハイワード	開花前まで	かいよう病	コサイド3000 バイカルティ（必ず混用）	2000倍 1000倍	— —
	4月下旬	花腐細菌病	主幹部に環状剥皮処理（幅0.5～1cm）		
東京 コールド レーン ボー	開花前まで	かいよう病	コサイド3000 バイカルティ（必ず混用）	2000倍 1000倍	— —
	3月下旬	灰色カビ病 果実軟腐病	ベルコート水和剤	1000倍	前日-5回
イチ ジク	発芽期	アブラムシ	アディオン乳剤	2000倍	前日-2回
梅	4月上中旬	黒星病 アブラムシ	ベルコート水和剤 アクタラ顆粒水溶剤	2000倍 3000倍	30日-3回 7日-2回
	4月下旬	黒星病 カイヨウ病	スコア顆粒水和剤 スターナ水和剤	3000倍 1000倍	前日-3回 7日-3回

水稻（担当：山森・大塚）

～水稻種子の芽出しについて～

近年、猛暑の影響で休眠が深くなっている種子があるので、確実に芽出しをしましょう

- ① 種子消毒を確実にいきましょう
- ② 浸種時の水温は10℃以上を確保しましょう
- ③ 浸種積算温度の目安100℃が目安になります
- ④ 種子の発芽を確認し、確実に発芽させましょう

水稻の準備は計画的に！

- ① 苗箱などの資材はイチバン（1000倍）に浸漬し、消毒しておきましょう
- ② 田植えに向けて荒起こしをし、田植えの準備を進めましょう
- ③ 土壌改良資材を投与し、土作りをしましょう
オススメ資材：ケイ酸加里プレミアム34 2～3袋/10a



★ジャンボタニシによる水稻の被害を防ぐために★

① 水口網の設置（水路に発生している場合に実施）

田植え前の入水時から田植え後3週間までに取水口・排水口に9mm目合い程度のネットや金網を設置

② 薬剤散布

薬 剤 名	使 用 量	使 用 時 期	使 用 回 数
スクミノン	1～4kg/10a	収穫60日前まで	2回以内

移植栽培の場合は移植直後～約2週間後の防除が重要。

水口周辺や深水になる場所は被害が多い傾向にあるので、所定の範囲内で多めに散布する。

③ 田植後の浅水管理

水深が浅いと貝の活動が抑制されるため、田植え後3週間水深を4cm以下に維持
水田内を均等に保ち、水深が深くなる場所を減らすことが重要！

茶（担当：森）

【施肥】 1茶芽出し肥 1回目…3月下旬～萌芽期 ニューほんやま 3袋/10a
2回目…摘採14～20日前 あさつゆ 3袋/10a



令和3年茶期が近づいております。茶製造前の工場内掃除は丁寧に行ってください。特に粗揉機や揉捻機の中・火炉の部分・棚の乾燥機の中の部分は念入りに行ってください。

◎農薬ごとの使用基準・摘採前日数に、ご注意ください。



茶生産に対する「援農ボランティア」事業 受入れ農家を募集しています。

（ボランティア希望の市民を募り、農繁期に人手の確保が困難な生産者に対して派遣する事業）
詳細は、長田営農経済センター 森まで（3月31日（水）まで）

購買店からのお知らせ

＜購買店舗 営業日程のご案内＞
決算棚卸のため

3月31日（水） 12時閉店

ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解ご協力をお願い致します。



＜人気のお徳用「お茶詰め放題」を実施致します！＞

日時：4月15日（木）・16日（金）

また、飲料も多く取り揃えてありますので、ぜひご利用ください！

有害鳥獣駆除実施について

- ・カラス・ヒヨドリ捕獲期間 3月1日～5月31日まで（長田西・南猟友会）
 - ・2月捕獲報告 イノシシ2頭 農産物被害報告 0件
- 今後、被害・目撃情報がありましたら担当 森までお知らせください。

実施期間中の事故がないよう皆様の協力をよろしくお願いします

令和3年水稻講習会について

日 時：令和3年4月21日（水） 15時00分～

会 場：JA 静岡市 長田支店2階

内 容：①ウンカの生態と防除対策について ②おすすめ農薬の紹介

★ 参加希望の方は、4/14（水）までに長田営農経済センター へご連絡ください

【印】マークのある農薬は、購入時に印鑑が必要です