


長田営農経済センターだより



発行：令和3年2月19日 電話：259-3233 Fax：259-3164 No.247

センター長	TAC	柑橘	苺・水稲・蔬菜・青年部	落葉果樹・茶・有害鳥獣	女性部
畑澤	山森	高橋	山森・大塚	森	山本
購 買					
岡田・富永・石原・糟屋・田中					

いちご〔担当：山森・大塚〕



〔株の整理〕

- 果 梗・・・収穫が終了したら株に余計な負担をかけないように早急に除去しましょう
- 摘 葉・・・有効な葉面積を確保するため、老化した葉や花房にかかっている葉を摘葉して下さい
- 摘 果・・・大玉果を収穫するため、株のできに合った果数にして下さい
春先は株疲れ防止のため、少し強めの摘花の管理を行って下さい
- 肥培管理・・・春先の温度に伴って、株の生育も旺盛になり給液量を多く必要としてきます
高設栽培では、排液量を確認しながら注入率を低く適宜灌水量を設定して下さい
なり疲れ防止のために、液肥の葉面散布を行うのも有効です

〔病害虫防除〕

- 天敵を放飼し、天敵に影響のない薬剤の散布をしましょう
- 日射量が多くなり、温度・湿度とも高くなり、株が急激に成育するため、ハウスが高温・多湿にならないようにこまめに換気をしましょう（灰色カビ病対策）
- 晴れた日は十分換気を行い、株元等に空気が停滞しないように管理して下さい
- スリップスの発生が一部で見られます！ 予防のため、薬剤散布を行いましょ

病 害 虫	薬 剤 名	倍 率	使用基準	蜜 蜂	天 敵	備 考
ハダニ類	マイトコーネフロアブル	1000 倍	前日-2回	1日	○	卵・幼・成
	ダニサラバフロアブル	1000 倍	前日-2回		○	卵・幼・成
アザミウマ	カウンター乳剤	2000 倍	前日-4回		○	幼
	ベネビアOD	2000 倍	前日-3回		○	幼・成
	ファインセーブフロアブル【印】	1000 倍	前日-3回		○	幼・成
灰色カビ病	スミレックスくん煙顆粒	6g/100㎡	前日-3回		○	予防・治療
灰色カビ病 うどんこ病	フルピカフロアブル	2000 倍	前日-3回		-	予防
うどんこ病	ジーファイン水和剤	1000 倍	前日-なし	○	予防	

〔親株の準備〕

- 3月末までには親株を定植できるよう計画的に準備を行いましょ
- 肥料切れをしないよう、IB化成等の置き肥を行いましょ

【印】マークのある農薬は、購入時に印鑑が必要です




タマネギ〔担当：山森・大塚〕

- 2月下旬～3月上旬までに追肥をおこないましょ（4月まで肥料が残ると貯蔵性が劣る）
- べと病は春先の雨による感染が多いため、雨の前後に防除をおこないましょ

対象病害	薬剤名	倍率	使用基準
べと病・白色疫病	ランマンフロアブル	2000倍	7日-4回
アザミウマ類	ディアナSC	2500倍	前日-2回

さやえんどう・実えんどう〔担当：山森・大塚〕

- 3月上旬に畝の肩の部分に化成肥料を4kg/a追肥し、除草も兼ねて中耕し、その後畝の形を戻すように整えてください
- 気温の上昇とともに3月頃から病害虫が発生しやすくなるので早めの防除を心がけましょ



対象病害	薬剤名	倍率	使用基準
うどんこ病	サンヨール	500倍	前日-4回
	ラリー水和剤	4000倍	前日-3回
ハモグリハエ類	ディアナSC	2500倍	前日-2回

※さやえんどうと実えんどうは登録のある農薬、使用基準が異なるものもあるので注意して下さい

未成熟そらまめ〔担当：山森・大塚〕

- アブラムシがウイルスを媒介するため、初期より防除を行いましょ
- 草丈が50～60cmで6～7本に整枝し、開花が始まったら株間に追肥をましょ。

対象病害	薬剤名	倍率	使用基準
アブラムシ類	スタークル顆粒水溶剤	2000倍	7日-2回

茶〔担当：森〕

防除時期	対象病害虫	薬剤名	倍数	使用基準
3月中旬	カンザワハダニ	バロックフロアブル	2000倍	14日-1回


バロックフロアブルは殺卵、殺幼虫への効果が主体です。
赤焼病・もち病の同時防除には、ドイツボルド-A500倍（14日）を加用して下さい。

水 稲〔担当：山森・大塚〕

- 圃場の整備（アゼの点検）
モグラ・ネズミの穴などが無いか点検をし、水持ちがよくなるようにしましょ
- ジャンボタニシ対策
寒さに弱いので、寒冷期に1～2回ロータリーで細かく耕起して下さい
- 土作り資材
春に田んぼを起こす時に、土壌改良資材を投入し、品質・収量向上、倒伏防止にもなります
〈例〉 とれ太郎 3袋 / 10a



柑橘 (担当:高橋)



防除 (暖冬により例年より発芽が早いと予想されます、早期の防除に心掛けて下さい)

作物	使用時期	病虫害	薬剤名	倍率	使用基準
中晩柑	3月下旬 (発芽直前)	かいよう病	ICボルドー66D	60倍	注意事項 : マシン油乳剤の散布は、前後14日開けましょう
	温州みかん (発芽直前)	着花促進	リンクエース	1000倍	

施肥

品 種	時期	肥料名	10a 当りの施肥量
早生温州	3月中旬	みかん80ペレット	5 袋
青島温州・ポンカン はるみ・不知火			6 袋
スルガ・ネーブル		スルガペレット	6 袋
青島マルチ		柑橘ペレット 頂	5 袋

落葉果樹 (担当:森)



防除 (気温の上昇が早いと発芽も早まります。早期の防除に心掛けて下さい)

作物	使用時期	病虫害	薬剤名	倍率	使用基準
桃	3月上旬	せん孔細菌病 縮葉病	ICボルドー412又は カスミンボルドー	30倍 500倍	— 開花前-3回
	3月中下旬 (開花前)	縮葉病	トレノックスフロアブル *銅剤との散布間隔は10日以上	500倍	7日前-5回
梨	3月下旬 (発芽期)	黒星病	オーソサイド水和剤80	800倍	3日前-9回
		アブラムシ	モスピラン顆粒水溶剤【印】	4000倍	前日-3回
梅	発芽前	かいよう病	Zボルドー	500倍	満開期は避ける
	3月中下旬	灰色カビ病 アブラムシ	ロブラール水和剤 ダントツ水溶剤	1500倍 2000倍	45日前-2回 前日-3回
いちじく 柿	3月中旬 (発芽前)	越冬病害虫	石灰硫黄合剤	7~10倍	10a 当り散布量 150 ㍓
キウイ	発芽前	かいよう病	ICボルドー66D	25~50倍	—
	3月下旬		コサイド3000 (クレフノン200倍加用)	2000倍	果実肥大期まで

施肥

作物	使用時期	肥料	10a 当りの施肥量
梅	3月下旬	新FTE S280	2 袋
梨	3月上中旬	静岡フルーツペレット	3 袋
キウイ			4 袋
いちじく			6 袋
柿			3 袋

入賞
おめでとう
ございます!

品評会受賞者 (長田ブロック管内)

《令和2年度 JA静岡市いちご果実品評会》 (敬称略)



1等2席	鷲巣 忠芳	
2等	河口 稔	和田 佳子
3等	梅木 憲昭	

《令和2年度 JA静岡市いちご園地共進会》 (敬称略)

3等 和田 佳子

お知らせ

☆有害鳥獣対策 近況報告 (担当:森)

- ・2月の捕獲はありませんでした。1月位からイノシシの被害報告は少ないですが、シカの日撃情報はありました。引き続き注意をお願いします。
- ・3月~5月、猟友会へカラスの駆除申請を行う予定です。



☆令和2年 春季の予約農薬購入 注文書を配布いたします!

農薬の注文は、お得な予約注文を是非ご利用ください

申し込み期限: 3月5日(木)までに長田営農経済センターまでご提出ください

購買営業時間の変更について

新型コロナウイルス感染防止策および経済事業の事務改善に向け平日の営業時間を原則、下記内容に変更させていただきます。

○令和3年2月1日より 午前8時30分~午後4時まで
大変ご迷惑をお掛け致しますがご理解、ご協力を宜しくお願いいたします。

☆JA静岡市グリーンティフォーラム2021は、今年は新型コロナウイルス感染防止のため中止です。

☆令和2年度 確定申告 納期限及び振替日

納付期限 4月15日

振替日 5月31日(所得税) 5月24日(消費税)