くじらがいけ

5月19日

しづはた営農経済センターだより　　静岡市葵区下1459-1　☎294－9330

センター長	茶	茶・有害鳥獣	蔬菜・苺・水稲	果樹	女性部・購買	購　買
高橋	佐藤	平野	美和営農経済センター 宇佐美・望月	伊藤・久留（ひさどめ）	漆畑	橋本・正込
配送	加藤・増井		大河内地区担当	大石	梅ヶ島地区担当	望月

≪お茶≫

◎今年は寒さの害も少なく例年になく早い茶期となりましたが、夜温が低い日が続き生育が進まず収量が伸びない茶期となりました。

◎今年は、荒茶の生産量が極端に減り、荒茶単価は傾向として例年よりも高く推移しました。

来年１番茶の品質・収量は、今後の管理がカギとなります。来年に向けての準備に備えましょう。

茶栽培のポイント２点に意識してください。

☆更新作業を行い、力強い芽重型の内容が濃い生葉生産に努める。

☆お礼肥・母枝肥・秋肥をしっかりと施肥する。施肥管理の徹底。

【１番茶後　整　枝】

２番茶を摘採する茶園

時　　期　遅れ芽がほぼ出揃った頃　１番茶摘採から１０日～１４日

整枝位置　１番茶摘採面を揃える程度にごく浅く
１番茶が伸びて、浅く摘採した園は一葉（一節）残した位置で整枝

２番茶を摘採しない茶園　２茶摘採と同じように整枝を行って下さい！！
翌年の１番茶の芽が不揃いになる可能性がありますので、母枝の太さと芽数の均一化を図る為に１番茶後に通常の整枝を行って下さい。

１回目整枝
時　　期　１番茶終了後　（通常の２茶摘採の整枝と同じ頃）
整枝位置　１番茶摘採位置（通常の２茶摘採の整枝と同じ位置）

２回目整枝
時　　期　６月中下旬　２番茶が充実して葉色が濃くなった頃
（深めに整枝するので、出芽を良くするので降雨にさらす）
整枝位置　平　地…昨年の秋整枝位置から一番茶摘採面の間で、やや深めに行う。
山間地…葉層を１０㎝確保する為に２番茶摘採の様に２茶を一節残す。

【更　新】来年に向けて力強い芽を作ろう

枝が細く小葉や葉層が薄く樹勢が弱い茶園については、１番茶摘採後ただちに更新を行って下さい。深さを決めるには、枝の構成（枝の太さ、本数）をよく観察し、樹勢にあった更新（浅刈り、深刈り、中切り）をして下さい。

【施　肥】樹勢回復に施肥が効果的です。

２茶肥　　２茶摘採30日前　化成肥料　３～４袋／１０ａ当たり

【防　除】１茶後にダニ類の発生が目立ちます。

カンザワハダニ・サビダニ等の発生が古葉に確認されています。
茶樹の樹勢が落ちている時期ですので、しっかりと２茶前に防除をお願いします。

チャトゲコナジラミ
チャトゲコナジラミは、茶園スソ部に『すす病』を誘発させます。
多発生すると樹冠部まで『すす病』が発生し、収量・品質に悪影響を及ぼします。

時　　期　５月下旬　茶園での成虫の飛散が終わった頃にスソ部を中心に薬剤散布
・２番茶を摘採する園　劇 コテツフロアブル　2,000倍　７日
劇 ハチハチ乳剤　1,000倍　１４日

・２番茶を摘採しない園　アプロードエースフロアブル　1,000倍　１４日
※　深刈更新等と組合せて薬剤防除すると、より効果的になります。

１番茶整枝後

カンザワハダニ
チャノナガサビダニ
ウンカ・スリップス
チャノコカクモンハマキ
} 劇アグリメック　1,000倍　7日

クワシロカイガラムシ
５月末頃から防除適期なので丁寧にしっかりと幹・枝まで届く様に散布をお願いします。

平　地　５月下旬～６月上旬
山間地　６月上旬～６月中旬
} 劇 スプラサイド乳剤　1,500倍　１４日　単用
または、
アプロードエースF　1,000倍　１４日　単用

◎ふ化幼虫期の判定は、営農経済センターで行いますので、
最寄りの事業所へ被害枝を持って来て下さい。

◎気温が高く、乾燥した日が続くと、発生が早まることが予想されますので注意して下さい。
◎２番茶の摘採時期と防除時期が接近していますので、使用基準を守って防除して下さい。

２番茶萌芽期～１葉期

炭そ病・もち病　オンリーワンフロアブル　2,000倍
ウンカ・スリップス　ウララＤＦ　1,500倍

◎カンザワハダニ発生園は、劇 コテツフロアブル　2,000倍　７日
（※ウンカ・スリップス・サビダニ同時防除）
◎ツマグロアオカスミカメ発生が予測される園は、
スタークル顆粒水溶剤　2,000倍　７日（ｵﾝﾘｰﾜﾝと混用）
※ 2茶期は降雨が続くと考えられます。「もち病」の発生が予想されるので、防除を徹底して下さい。

◎ 静 岡 市 の 茶 ・ 補 助 事 業 紹 介 （ 抜 粋 ） ◎

① **茶園改良整備事業**　対象 茶園平坦化、防霜ファン整備など　補助率 2～5割
② **茶園共同管理推進事業**（5戸以上の団体のみ）　対象 乗用型摘採機等の導入　補助率 5割
③ **防霜ファン修繕事業**　対象 設置後12年を経過した防霜ファンの修繕　補助率 2割

各補助事業に要綱があり、補助対象とならない場合がありますので、まずは農協へご相談ください。

JA 飲料のご紹介　暑い夏はこれでのりきろう！！

香りすっきり、味わいしっかり

静岡茶ボトル缶
(400g×24 本)2,592 円(税込)
静岡市のお茶を使用！！
農作業のお供に、毎日の健康維持向上にオススメです！

夏場の水分補給はコレ！！

ポストニックウォーター
（500ml×24 本入り）1,944 円（税込）
※1 本当り 81 円！
素早い水分補給が可能なスポーツドリンクです。熱中症の対策にどうぞ！
通常タイプとレモン味の２種類あります。

いちご

育苗圃の管理ポイント

- 水と肥料は切らさない。
  →露地育苗では梅雨時期、肥料の流亡に注意。
  IBS１号を 10 日間隔で３粒/株施用。1 ヶ月で株あたり８粒目安(株の草勢により加減する。)
- わき芽や古葉、ぜに葉などは天気の良い日に整理する。
- ランナー受けは５月下旬～6 月中旬を目安に行う。（紅ほっぺ・章姫の場合）
- 親株 1 株からの採苗は 20～25 本を目安に行う。
- 切り離し時期は７月下旬を目標に行う。育苗期間 45～50 日を確保する。

育苗期防除ローテーション

	殺菌剤	RAC	殺虫剤	RAC	対象病害虫
６月５週目	ベルクート（水）	M7	コテツ（フ）	13	炭、う、ス、ヨ、ダ
７月２週目	アントラコール（顆水）	M3	エコピタ液剤	気門	炭、う、ア、コ、ダ
７月３週目	オーソサイド（水）	M4	テデオン（乳）	12D	炭、灰、ダ
７月４週目	ゲッター（水）	1・10	サンマイト（フ）	21A	炭、ア、コ、ダ
７月５週目	ベルクート（水）	M7	モベント（フ）	23	炭、う、ア、ス、コ、ダ

※炭→炭そ病　う→うどんこ病　灰→灰色かび病　ア→アブラムシ　コ→コナジラミ　ス→スリップス　ヨ→ヨトウ　ダ→ダニ

必ず使用倍率・回数の確認をお願いします！！

- 梅雨時期には耐雨性の展着剤「アビオンＥ」で防除効果が安定。（屋外）
- 抵抗性の付かないエコピタ・サフオイル等の物理的効果の農薬もおすすめ。
- 気門封鎖剤は他剤と混用しないでください。
- ローテーション及び混用は例になりますので、各圃場の状況に合わせた防除を行って下さい。

稲

1．育　苗

① 育苗期間 20 日で草丈 10～15cm、本葉 2～2.5 枚を目標
② 育苗には水道水などのきれいな水を使うこと

育苗箱の消毒	イチバン　1,000 倍	瞬間浸漬・またはジョロ散布
培土	宇部培土	４袋／10ａ
	粒状ぱーるまっと３号	３袋／10ａ

③ カビには下記薬剤を 1 箱当たり 500ml かん注すると効果的。ただし、ダコレートとタチガレンは混用不可。近接散布の場合でも間隔を 10 日以上あけること

苗立枯病	ダコレート(水)	500 倍	は種時～は種後２週間まで
	タチガレン(液)		は種時～発芽後

④ もみ枯細菌病予防のため発芽時には 30℃以上にならないように注意する

シルバーポリトウでトンネルする場合
- 昨年病気が発生したポリトウを使用すると同じ病気が発生するので使わないこと
- ポリは葉数１.５葉（は種後７～８日後）を目安に除去する

2．元肥の施用（10ａ）
元肥は田植え予定日の 1 週間以内に施用すること

品種／コース	ひとめぼれ キヌヒカリ	コシヒカリ	きぬむすめ ヒノヒカリ	あいちのかおり にこまる、葵美人
化成	マップ 202			
	２袋	1.5 袋	２袋	２袋
省力	エココシ 18 号	エココシ 18 号	ナイスワンパワー	にこ・モチー発 244
	2.5 袋	２袋	2.5 袋	２袋

3．田植時育苗箱処理

① 箱粒剤　どの薬剤も効き目長持ち２ヶ月間！

低コスト	ピカピカ粒剤	50ｇ/箱	移植３日前～移植当日
いもち病　重点	Dr.オリゼパディート粒剤		緑化期～移植当日
紋枯病　重点	フルターボ箱粒剤		移植３日前～移植当日
省力化　重点	ツインターボ箱粒剤 08		播種時～移植当日（覆土前使用可能）

② 除草剤（10ａ）　→　水もちの悪い水田には粒剤を使用する。

エンペラー１キロ粒剤	１ｋｇ	田植直後～30 日まで	ヒエ 3.0 葉まで
ガンガン豆つぶ 250	250ｇ	３日～30 日まで	ヒエ 2.5 葉まで

① **水の管理**　田植後～活着　水深 4～6cm 程度の深水とし、活着を促す。
② 活着後　水深 2～4cm 程度の浅水とする。ガス抜きする場合、1～2 日間落水する。

4. スクミリンゴガイ（ジャンボタニシ）の防除

スクミノン	1～4kg/１０a	移植後　但し、収穫６０日前まで ― ２回

農薬散布後の止水期間は７日間です！
水田用除草剤や本田粒剤の散布後７日間は落水やかけ流しをしないように注意しましょう

アスパラガス

10ｃm間隔で薬指くらいの太さのものを立茎させてください(3～4 本/株)
太すぎると茎割れを起こし、細いと栄養貯蔵不足になります。
そして、立茎させる茎の脇から生えてくる芽は、まだまだ収穫できますよ♪
しっかり立茎させ、しっかり転流させることで、来年の良い春芽につながります！
また、６月末までは二次分枝を除去し、７月以降は残すようにすると秀品率が向上します。

≪柑橘≫

樹毎にばらつきはありますが、本年産は着花量が多い樹が多々見受けられます。摘花・摘果を行い、隔年結果の抑制、樹勢の維持に努めましょう。

また、いよいよ梅雨に突入いたします。降雨量が増加するにつれて、病虫害の動きも活発になるため徹底した防除を行いましょう。

●温州みかん

防除時期	対象病害虫	農薬名	希釈倍数	使用基準
6月上中旬	ミカンハダニ チャノキイロアザミウマ カイガラムシ類 黒点病	マシン油乳剤97% 劇アグリメック ペンコゼブ水和剤	150倍 2,000倍 600倍	3回 7日−3回 30日−4回

●中晩柑

防除時期	対象病害虫	農薬名	希釈倍数	使用基準
6月上旬	カイヨウ病	ICボルドー412	50倍	—
6月中旬	ミカンハダニ チャノキイロアザミウマ 黒点病	マシン油乳剤97% 劇アグリメック ペンコゼブ水和剤	150倍 2,000倍 600倍	3回 7日−3回 30日−4回

※生理落果が激しい園地では、尿素500倍と硫酸マグネシウム500倍の葉面散布を行うことで、生理落果を抑制できます。

＜夏肥について＞

6月は養分吸収率が高くなるため、夏肥を施用してください。施肥の時期が遅れ、肥料が遅効きすると、着色の遅れや浮皮の発生に繋がります。6月上旬までに施肥を完了させてください。

《落葉果樹》

対象作物 防除時期	対象病害虫	農薬名	希釈倍数	使用基準
ハウスいちじく 6月上旬	黒かび病 アザミウマ類	ロブラール500アクア アクタラ顆粒水溶剤	1,000倍 2,000倍	3日−3回 前日−2回
6月中旬	疫病	ランマンフロアブル	2,000倍	前日−3回
露地いちじく 6月上・下旬	疫病	Zボルドー クレフノン	1,000倍 200倍	—
6月中旬	アザミウマ類 カミキリムシ類	アクタラ顆粒水和剤	2,000倍	前日−2回
6月下旬	カンザワハダニ	バロックフロアブル	2,000倍	前日−1回
柿 6月上旬	落葉病 カイガラムシ類	ベンレート水和剤	2,000倍	前日−6回
6月中下旬	カキノヘタムシガ チャノキイロアザミウマ	アクタラ顆粒水和剤	2,000倍	3日−3回
ぶどう 落果直後	チャノキイロアザミウマ 晩腐病・灰色カビ病・べと病	コルト顆粒水和剤 ストロビードライフロアブル	3,000倍 3,000倍	前日−3回 14日−3回
袋掛け直前	チャノキイロアザミウマ	劇アドマイヤー顆粒水和剤	5,000倍	21日−2回

JA静岡市女性部しづはたブロック

女性部コーナー5月

お茶狩りに、野菜の植え付けにと、大忙しの毎日ですね。
昼間は、暑い日差しで，夜はまだまだ肌寒く、体調を崩しやすい季節ですね。

行事予定

6月16日（水）しづはた支部三役会　【三役 18:30～】しづはた支店２階
6月16日（水）しづはた支部役員会　【役員 19:00～】しづはた支店２階
6月　2日（水）組合員特定健診　昭府町支店２階
6月30日（水）組合員特定検診報告会　13：30～昭府町支店２階
6月　未定　　梅ケ島梅園　梅取り　☆予定☆

教養講座＆サークル

教養講座については、状況を見て、文書にてご連絡致しますので、それまでお待ちください。

今年度より、女性部担当者が購買も兼務となり、購買職員が、１名減る形になり、皆様には大変ご迷惑をおかけしております。
申し訳ございません。
ですが、女性部活動は今まで通りですので、どんなことでも（ケガのことや、嫁姑問題や、ちょっとした出来事など）なんでもお話しくださいね。
購買についても、今まで通り、女性部の皆様のご協力をお願い致します。

6月号の読みどころ　家の光

特集
『最高の味わい　最強の健康食　令和の絶品漬け物全国みそマップ！』
毎日の食卓に欠かせない漬け物ですが、手間がかかるといった理由で自宅で作る機会が少なくなっていませんか？　おいしいだけでなく、腸内環境を整え、免疫力を高めるなど、効果も期待できる優れモノ。

「家族関係のモヤモヤ解消！性格タイプ別「伝え方」のコツ」
家族とのやりとりで「伝えたつもりが、きちんと伝わっていなかった