

東部営農経済センター一便り 5月号

JA静岡市東部営農経済センター TEL: 245-7527

センター長	茶	苺・水稲・蔬菜	果樹	営農生活支援購買	購買
瀧口信也	折山	深井・片井	榮	大越	酒井・萩原・森川・鷲巣

肥料価格改定についてお知らせ(重要)

皆様にご利用頂いております肥料年特予約品につきまして、市況の大きな変動のため注文書にありまます通り、価格改定を実施させていただきます。

これまで、情勢により可能な場合は注文書の記載価格よりも安価でのご提供をさせていただきましたが、この度の原料・輸送費の大幅な高騰に伴い、6月より値上げせざるを得ない状況となっていました。

誠に恐縮ですが、ご利用者様には情勢を踏まえご理解頂きたく、お願い申し上げます。

茶

【二番茶摘採準備】

一番茶後の遅れ芽を除く程度に浅く摘採面を整える。時期としては一番茶摘採後7~10日程度である。(但し、みる芽摘採をした場合は、遅れ芽が出揃った時点を見極めて実施する)

【更新】1番茶摘採後なるべく早く行う。

- ・浅刈り：摘採面から3~5cmの深さで剪枝する。更新効果は、一年程度。
- ・深刈り：摘採面から10~20cmの深さで剪枝する。更新効果は、二年程度。
- ・中切り：地上30~50cmの高さで、幹の太い所で行う。剪枝する枝の太さは、7mm程度である。更新効果は、4~5年程度。

【二番茶不摘採園の管理】

一番茶摘採後、秋整枝まで放任すると翌年の一番茶収量に大きく影響するので上記の更新作業又は、二番茶目が完全に開いた状態で二番茶芽の基部から新梢をすべて刈落として下さい。

【防除】被害園では、病害虫多発生が予想されますので茶園状況を確認しましょう!

時期	病害虫名	薬剤名	倍数	日数	使用方法
1番茶摘採後	カンザワハダニ チャノナガサビダニ ウンカ、スリップス	アグリメック(劇)	1,000倍	7日	単
7月~9月	マダラ カサハラムシ	コテツフロアブル(劇)	2,000倍	7日	単
		ハチハチ乳剤(劇)	1,000倍	14日	単
		エクシレルSE	2,000倍	7日	単
2番茶萌芽期	炭そ病、もち病 ウンカ、スリップス	オンリーワンフロアブル	2,000倍	7日	混
		ウララDF	1,500倍		
5月中旬 ~6月初旬	クワシロ カイガラムシ	アブロードエースフロアブル	1,000倍	14日	単
		スプラサイド乳剤(劇)	1,500倍	14日	単
2番茶整枝後	ハマキムシ類	サムコルフロアブル10	2,000倍	3日	単

【2茶肥】(時期) 1茶摘採後~10日 (施肥量) 化成肥料3~4袋/10a

(劇) の記載のある農薬は購入時に印鑑が必要となります

東部営農経済センターだより 令和3年5月20日発行

柑橘

令和3年度産みかんの開花は例年よりも早く生育状況も前進傾向となっています。今年度産の着花状況は、全体では昨年に比べやや多い状況です。東部地区内では、着花量は並~やや少ない状況になります。今後梅雨時期となりますので天気予報を確認しながら作業に当たるようにしてください。

【防除】

時期	病害虫名	農薬名	使用倍率	使用基準
6月上中旬	ミカンハダニ	マシン油乳剤(97%)	150倍	3回
	チャノキイロアザミウマ	アグリメック(劇)	2,000倍	7日-3回
	黒点病	ペンコゼブ水和剤	600倍	30日-4回

◆ そうか病発生園ではペンコゼブ水和剤を400倍で散布する。

時期	病害虫名	農薬名	使用倍率	使用基準
6月上旬	かいよう病	ICポルドー412	50倍	—
6月中旬	ミカンハダニ	マシン油乳剤(97%)	150倍	3回
	アザミウマ	アグリメック(劇)	2,000倍	7日-3回
	黒点病	ペンコゼブ水和剤	600倍	90日-4回

◆ スルガエレガントでホウ素欠乏症が出ている園では『ヨーヒB5 800倍』を混用散布して下さい

◆ マシン油の散布後3日間は雨にあたらぬように、天気予報に注意し散布する。

【施肥】夏肥の施用・・・6月10日までに施用

柑橘類にとって一番肥料の吸収が良い時期であり、新梢を充実させ根も発生し伸長に多量の養分を必要とする時期でもあるので、この時期の施用は重要となります。また、施用が遅れると酸高、着色遅れの原因となりますので施用時期は遅れないように実施しましょう。

品種	肥料名
青島	みかん化成1号: 6袋/10a
早生	みかん化成1号: 4袋/10a
スルガエレガント	新FTE S604: 4袋/10a または スルガペレット: 8袋/10a
ポンカン	みかん化成1号: 4袋/10a または みかん50ペレット: 6袋/10a
不知火・はるみ	みかん80ペレット: 6袋/10a

落葉果樹

作物名	散布時期	対象病害虫	使用農薬	倍率
梨	6月上旬	黒星病・輪紋病・うどんこ病	ナリアWDG	2,000倍
	6月中旬	ハダニ類	コロマイト水和剤	2,000倍
	6月下旬	ツクイムシ類・クワシロカイガラムシ	バリアード顆粒水和剤(劇)	4,000倍
柿	6月上旬	うどんこ病・落葉病・灰色かび病	オンリーワンフロアブル	2,000倍
		アザミウマ・カメムシ類	スタークル顆粒水溶剤	2,000倍
	6月中旬	落葉病・炭疽病	ベンレート水和剤	2,000倍
キウイ	6月上旬	カキノハタムシガ・チャノキイロアザミウマ	アクタラ顆粒水溶剤	2,000倍
		落葉病・うどんこ病	ベルコート水和剤	1,500倍
	6月中旬	果実軟腐病	ダコニール1000	1,000倍
キウイ	6月上旬	キイロマイカ・キウイハメヨコバエ	アグロスリン乳剤(劇)	2,000倍
	6月中旬	果実軟腐病	ベルコート水和剤	1,000倍
	6月下旬	果実軟腐病	ベンレート水和剤	2,000倍

いちご



5/16日に東海地方の梅雨入りが発表され、平年より21日早い梅雨入りとなりました。防除等管理のタイミングが難しい日々が続きます。循環扇の活用や微生物農薬（タフパール等）の利用など工夫をしながらの管理を行ってください。また、長期の降雨後に急激な晴天があると、ランナー焼けやしおれを発生させる恐れがあります。遮光ネット等の準備をお願いします。

親株管理（炭そ病対策）

- 資材は必ずイチバン（500～1,000倍、瞬時浸漬）等で消毒したものをを用いる。
※ハサミなどの作業道具も消毒しましょう。
- 雨よけ下の管理を基本とし、風通しの良い環境をつくる。（ハウスのツマ、サイドを外す等）
- ランナーが密植とならないように誘引する。
※親株の古葉やわき芽の整理をし、風通しを良くする。またランナーの側枝は除去する。
- 怪しい株は見つけ次第、近くの株とともに除去する。
※毎日1回は圃場を一周し、全部の株を確認する。（早めの除去を徹底しましょう。）
- 苗の管理は晴天時に行う。管理後は傷口を乾かしてから薬剤の予防散布をする。
※雨天、曇天が続く際は循環扇や扇風機等を使用し、傷口の乾燥を促しましょう。

育苗圃病害虫防除ローテーション（先月号の続きです。）

時期	薬剤	RAC	倍率	回数	主な対象病害虫
5月5週目	ベルコート（水）	M7	1000倍	1/5	炭疽・うどんこ
	エコピタ（液）	—	100倍	—	うどんこ・ハダニ
6月1週目	ジマンダイセン（水）	M3	600倍	2/6	炭疽
	プレオ（フ）	UN	1000倍	1/4	ヨトウ
6月2週目	サンヨール	M1	500倍	2/6	うどんこ・ハダニ
	エコピタ（液）	—	100倍	—	うどんこ・ハダニ
6月3週目	オーソサイド（水）	M4	800倍	1/3	炭疽
	ニッソラン（水）	10A	2000倍	1/2	ハダニ
6月4週目	デラン（フ） ^劇	M9	1000倍	1/2	炭疽
	エコピタ（液）	—	100倍	—	うどんこ・ハダニ

土壌分析のお知らせ ※詳細は別紙をご確認ください。

分析料金：600円/1検体（1,210円のお支払いを頂き、助成金は来年3月末に入金します。）
 提出方法：風乾した土を200g程度用意して頂き、袋に入れてご持参ください。
 袋へは「氏名」「地区」「連絡先」「栽培作物」「施設・露地の別」を記入下さい。
 提出〆切：令和3年6月11日（金）までに東部営農経済センター（野菜担当）へ。

☆JA健康サロン☆ ~relaxation park~

会場：JA 静岡市安東支店 2階
 開催日：4/12～6/中旬（土・日・祝は休みです）
 時間：10:00～13:00 14:00～17:00

交流磁気治療器で
体のコリと血流改善を
しましょう！！

無料

除草剤を上手に
効かせるポイント！

- ① 代かきはていねいに行ない、田面を均一にする
- ② 処理後は田に入らない！（一週間）
- ③ 処理後は田面が露出しないように水管理。（ガス抜きは1～2日行う）
1kg・フロアブル剤は水深3～5cm/ジャンボ・豆つぶ剤は水深5～7cm
- ④ 薬剤の処理時から、必ず7日間は水尻を閉じ、かけ流しをしない！

新商品 JAのおすすめドリンク

熱中症対策に最適
ポストニックウォーター
¥1,944

爽やかスッキリ～
とした飲み心地！
レモンフレーバーも♪

おいしいよ



- ☆ ノモモン…山梨県産もも ¥3,240
 ☆ 無塩トマトジュース…北海道トマト ¥2,592
 ☆ ぶどうジュース…長野県産ぶどう ¥3,240
 ☆ ラ・フランス…山形県産ラ・フランス ¥4,860

水稻

- 1、初期防除（箱粒剤） 処理すれば7月末ごろまで防除不要！

コース	薬剤名	50g/箱
いもち重点	Dr.オリゼパディート粒剤（緑化期～移植当日）	
紋枯重点	フルターボ箱粒剤（移植3日前～移植当日）	
省力化	ツインターボ箱粒剤08（播種時～移植当日）	
ウンカ重点	フルスロトル箱粒剤（播種時～移植当日）	

※ 移植数日前に均一散布し、灌水を行って薬剤成分を十分に吸わせる。
 ※ 50g/1箱を均一に散布する。
 ※ コブノメイガ、ウンカは初期防除が肝心です。効果のある箱粒剤を使用してください。

- 2、ジャンボタニシ対策（スクミリンゴガイ）
 スクミノン 1～4kg/10a（移植後 収穫60日前まで2回）
 ※ 発生の多い圃場では水深3～5cmにし、全面処理、7日間落水、かけ流ししない。



- 3、水管理
 ・田植後～活着 … 水深4～6cm程度の深水とし、活着をうながす
 ・活着後 … 水深2～4cm程度の浅水（ガス抜きは1～2日間落水する）

- 4、除草剤
 (1) 除草剤一発処理剤（10aあたり）

キマリテ1キロ粒剤	1kg	移植直後～30日（ノビエ3.0葉まで）
エンパー1キロ粒剤		田植直後～12日頃（ノビエ3.0葉まで）
ミスターホームランLジャンボ	500g	移植後3～10日（ノビエ2.0葉まで）
ガンガン豆つぶ250	250g	移植後3日～30日（ノビエ2.5葉まで）

水持の悪い田んぼでは体系処理を行ってください。

田植前	サキドリEW	500ml	代かき後、田植えまで7日間あける
-----	--------	-------	------------------