



JA静岡市

電話 296-2121 ファクシミリ 296-2125

センター長	大沼	お茶・果樹	村田	茶	武田	女性部 購買	市川	購買	青島
専務	宇佐美	野菜・莓 青壮年部	望月	購買・ 地区担当	滝浪	購買・ 地区担当	山田		

【注意！】致死率20% マダニの感染症(SFTS)が市内で初めて発生！



「SFTS」は、マダニが媒介する感染症で、有効な薬が無く、感染すると10人に2人が死亡する大変恐ろしい病です。この病は数年前に国内で感染者が発生した後、徐々に感染範囲が広がっているもので、すでに国内でも70人以上が感染して亡くなり、感染者は増加傾向にあります。そして今月(令和3年6月)初めて静岡市内での感染者が発生してしまいました。新型コロナのように、これまでになかった感染症の危険が身近に迫っているのです。もしマダニに噛まれた場合、決して「マダニなんて今までも噛まれたことがあるけど大丈夫」といった軽い認識で済ませず、特に、発熱や吐き気等、体調不良があった際は感染の疑いがあるので必ず病院に行き、マダニに刺されたことを伝えて下さい。くれぐれもこの感染症は、これまで存在しなかったものであること、対応を誤ると本人のみならず家族の命にも関わるものをご理解願います。また、このウィルスは人だけでなく犬や猫などのペット、シカなどの鳥獣類にも感染し拡大します。飼っている猫がマダニに噛まれて感染し、その猫に濃厚接触した人が感染した例などもありますのでペットを飼っている方は注意して下さい。

青色専従者 源泉徴収簿 作成事務説明会

青色専従者がいる方は、上半期分の源泉徴収についての説明等を行います。なお、納入期限は7月12日ですので、自身で納入等される方は期日までにお願いします(ゼロの方も期日までに税務署等に書類をする必要がありますが、下記にご出席の方は、農協でまとめて提出等をさせていただきます)。

日 時 7月 5日(月) 9時00分~10時30分 場 所 美和支店2階会議室
(時間内で随時受付ます)

持ち物 ①源泉徴収簿 ②納付書 ③貯金の印鑑 ④計算機及び筆記用具 ⑤前年度の控え

熱中症 予防

夏場の水分補給はコレ！！

ポストニックウォーター

素早い水分補給が可能なスポーツドリンクです。通常タイプとレモン味の2種類があります。水分補給に是非ご利用下さい。

(1ケース 500ml×24本)
1,944円(税込)
※1本当り81円!

暑い時期がやってきます。体調管理・事故に十分注意してお過ごしください。

【2番茶後の整枝】

☆ 1番茶以降、ハサミを入れずに秋整枝のみにすると翌年の1番茶芽が不揃いになり収量も減少するため、必ず整枝を行ってください。

時期 2番茶摘採 10~14日後

※ 2番茶を摘採しない園では6月下旬~7月最上旬まで(2茶芽が出揃った頃)

位置 2パターンあります。茶園の状態を見て判断しましょう。

① 2茶の摘採面を揃える程度 ⇒ 葉層を確保し、樹勢回復を目指します。

※ 例年、リハ病が多発する園では感染した枝を落すために摘採面より2cm落として防除をお願いします。

② 1茶の摘採面~昨年の秋整枝面の間 ⇒ 芽数を確保しつつ芽重型茶園を目指します。

☆ 整枝位置が深いと夏場の干害を受けやすくなり、来年の1番茶の品質に影響します。

また、枝数が少なくなり、秋整枝面の着葉密度が小さくなります。

※遅い時期の更新作業は避けてください⇒ 3番茶の生育に影響します。

【1茶後に更新をした茶園の整枝】

<時 期> 再生芽が平均 15cm程度伸びた時期(葉が5~6枚着いた頃、再生芽が青茎から木化した頃)
・日数の目安 ⇒⇒ 深刈り更新園 更新後50日~60日

中切り更新園 更新後60日~70日

<位 置> 更新した位置から5cm程度上(新葉が2枚程度残る高さ)

※ 但し、生育が遅く、7月末までに再生芽が充分伸びない場合は、秋に整枝を行うようにしてください。

日数より、芽の大きさを優先して下さい

【防 除】

[2茶整枝後]

サムコルフロアブル	2,000倍	ハマキムシ類(シャクトリ,チャハマキ,コカクモン)	3日・単用
-----------	--------	---------------------------	-------

①リンハン病は、サムコルに以下を混用散布

整枝後2,3日以内:アミスター20フロアブル[2,000倍・14日]

整枝後24時間以内:カスミンポルドー[1,000倍・30日]

②サムコルフロアブルに代えてマッチ乳剤にする場合、

アミスターとの混用可能ですが、混用後はその日のうちに散布して下さい。

[3茶萌芽~1葉開葉期]

フロンサイド SC	2,000倍	炭そ病,もち病,新梢枯死症,褐色円星病	混 用
コルト顆粒水和剤	2,000倍	ウンカ,スリップス,チャトゲコナジラミ	14日

※フロンサイドは皮膚に付着するとかぶれる可能性があるため注意ください。

気になる方は、ダコニール 1,000倍で使用して下さい。

[クワシロカイガラムシ] (第2回目の防除適期 7月上中旬頃) ※例年より早めです!
スプラサイド乳剤[1,500倍・14日] 又は、アプロドエースフロアブル[1,000倍・14日] など

いちご



本圃の準備

1. 病害虫防除（スリップス）
収穫終了後、10日間程度45℃を目安にハウスを蒸しこむ。
害虫がハウスの外へ飛び出さないように処理を行い、地域の虫の密度を下げましょう！
2. 本圃除塩
土耕栽培：ビニールを外し、雨にあてる。又は、水田転作地ではたん水状態にする。
高設栽培：液肥を切り、水のみ流し、いちごに養分を吸わせた後、株を処分する。
3. 本圃土壌消毒
土耕栽培：バスアミド 20~30kg/10a
または クロールピクリン錠剤 約10錠/1㎡（畝面処理の場合6割）
※適正土壌水分が農薬ごと異なります。バスアミドは土を手で握って崩れない程度、クロールピクリンは2~3つに崩れる程度の土壌水分時に使用して下さい。
高設栽培：たっぷり灌水しビニールをかけ太陽熱消毒を行う。
水を溜めたままだと根が腐りにくいので水を抜いて行う。
4. 土壌改良
土耕栽培：物理的改善に スーパーベラボン（ヤシがら）…90袋/10a（3年）
あく抜きと無処理のものがあります。導入する量にもよりますが、あく抜きのものをオススメ致します。
高設栽培：7年以上の培土は排水等が悪くなってきますので、5年以上使用している場合は少しずつでも、プランター内培土の総入れ替えをおすすめします。

育苗圃の管理（紅ほっぺ）

1. 親株の施肥：IB化成S1を10日間隔で3粒/株施用。1ヶ月で株あたり8粒目安（草勢を見ながら加減する）
：ロング肥料を使用する場合の施肥目安
・長い肥効のもの 20g/株 ・短い肥効のもの 10g/株
2. 切り離しは7月下旬を目標とする。育苗日数45~50日を目標に充実した苗づくりを行う。
3. 梅雨時期は病害の発生に注意し、降雨前後の農薬散布や発病株の早期発見に努めてください
※ 台風等の強風・大雨を伴う場合は特に株が傷みやすいので必ず農薬散布を行って下さい。
農薬散布時は必ず使用倍率・回数を確認をお願いします。
油系農薬は高温時、葉害に注意して下さい。
ローテーション及び混用は例になりますので、各圃場の状況に合わせた防除を行って下さい。

紅ほっぺ暗黒夜冷（株冷）処理をお考えの皆様へ…



☆株冷処理をするには苗づくりが肝心です！
45日以上育苗し葉かきを行い苗の生育を揃え、徒長の無い苗作りをお願いします。

水稻

1. ガス抜き
・特にどぶどぶした水田やレンゲ、雑草、ワラ等をすき込んだ水田で実施
・翌日が晴れの日の前日に落水して次の日の夕方に入水する
2. 中干し
・田植え後30~35日頃に1株18~20本の分けつが確保できたら開始する
・表面がヒビ割れする程度に7~10日間を目安に実施（乾田・やせ地は短く実施する）
3. 除草剤
・雑草が残っている場合に中干し時に下記のいずれかの薬剤を散布する
・いずれの薬剤も雑草が大きくなると効果が劣るので葉枚数5枚までに散布すること
(10aあたり)

ヒエ専用	クリンチャーEW	100ml/10a	混用可
広葉雑草	MCP ソーダ塩	200g/10a	
ヒエ&広葉	アトトリ1キロ粒剤	1kg/10a	展着剤不要
	クリンチャーバスME液剤	1000ml/10a	

ジャンボタニシ対策

今年も発生が見られます！

スクミノン	1~4kg/10a	60日前-2回
-------	-----------	---------

- ・田植え後2~3週間は浅水管理（水深4cm）
- ・例年発生が多い水田は下記の薬剤を処理



～トビイロウンカR3年飛来状況～

静岡県西部では平年より早く飛来が確認されています！！
発生初期の防除が効果的！適期の防除を心掛けましょう。

野菜

梅雨時期には病害の発生が多くなります。雨の翌日には薬剤散布を心がけましょう。

作物	病害虫	農薬	使用基準	
キュウリ	べと病、褐斑病 うどんこ病	ダコニール1000	1000倍	前日-8回
		アミスター20(フ)	1500~2000倍	前日-4回
ナス	灰色かび病	ゲッター(水)	1000~1500倍	前日-5回
	ハダニ	アーデント(水)	1000倍	前日-4回

スイートコーン

アワノメイガの防除適期は①雄穂出穂初期②雌肥大期です。防除適期を逃さず防除を！

アワノメイガ	トレボン(乳)	1000倍	7日前-4回
	デナボン(粒)5	4~6kg/10a	21日前-2回
	プレバソン(フ)5	2000倍	前日-3回
	フェニックス(顆水)	2000~4000倍	前日-2回
アブラムシ	モスピラン(顆水溶)㊟	2000~4000倍	前日-3回

農薬購入時には印鑑を！

毒劇物に指定されている農薬は㊟と表記してあります。購入の際には必ず印鑑（認印）をご持参ください。