

2021

7月

美和営農経済センターだより

JA静岡市

電話 296-2121 ファクシミリ 296-2125



センター長	大沼	お茶・果樹	村田	茶	武田	購買	瀧田	購買	青島
女性部 購買	市川	苺・蔬菜・水稻	宇佐美	蔬菜・苺 青壮年部	望月	購買・ 地区担当	滝浪	購買・ 地区担当	山田

お知らせ

『営農実態調査』にご協力をお願いします！

本年度も管内組合員の経営規模に把握するために営農実態調査（作物別面積調査）を実施致します。本調査は様々な補助金や、災害発生支援時等の基礎資料等となりますので、ご多忙中と存じますが是非ご協力をお願い致します。

また、アンケート用紙も同封させていただきますので下記の通りご提出をお願い致します。

締め切り：8月20日（金）まで

提出場所：最寄りの支店 または 美和営農経済センター



鮎釣り大会 中止のお知らせ

新型コロナウイルスの影響を考慮し、鮎釣り大会は中止としますのでご了承願います。

熱中症
予防

夏場の水分補給はコレ！！

ポストニックウォーター

素早い水分補給が可能なスポーツドリンクです。通常タイプとレモン味の2種類があります。

水分補給に是非ご利用下さい。

（1ケース 500ml×24本）

1,944 円(税込)

※1本当り 81 円！



茶・クワシロカイガラムシ専用剤「フルートMC」新規会員登録について

フルートMCは、1～2月の散布で長期間、クワシロカイガラムシの発生を抑える茶用薬剤です。

予約注文・購入・使用には会員登録が必要になります。

☆ 会員登録は無料です。 ★すでに会員になっている方は連絡の必要はありません。

☆ 加入希望の方は8月18（水）までに美和営農経済センター 村田・武田へご連絡下さい。

美和営農経済センターだより 令和3年7月20日発行

茶【防 除】① 来年の1番茶の土台になる3茶芽をしっかりと育てましょう

② 共同茶工場に出荷している方は、工場の農薬基準を守りましょう

《3茶萌芽～1葉開葉期》

フロンサイドSC	2,000 倍	炭そ病・もち病・新梢枯死症・褐色円星病	混 用
コルト顆粒水和剤	2,000 倍	ウンカ・スリップス	14日

☆ フロンサイドは皮膚に付着するとかぶれる可能性があるため、気になる方は、ダニコール [1,000 倍・10 日] を使用してください。

《3茶生育期》

インダーフロアブル	5,000 倍	炭そ病・もち病・褐色円星病	混 用
ディアナSC	5,000 倍	スリップス・ハマキムシ類	7日

☆ ウンカの発生が懸念される園は、ディアナSCに代えてリーズン顆粒水和剤 [2,000 倍・7 日] を散布してください。

《8月上旬：お盆前（8月10日頃までにハマキ剤を入れましょう）》

ファルコンフロアブル	4,000 倍	ハマキムシ類（ヨモギエダシヤク）	単用・7日
------------	---------	------------------	-------

☆ ファルコンフロアブルは脱皮促進剤ですので、若齢幼虫期（体長2cm以下）までの早期防除を。（若齢幼虫・葉に小さな穴をあける）

☆ 防除時期を逃した場合は、アフーム乳剤 [2,000 倍・7 日] を使用する。

※ホコリダニ発生園 ⇒ハチハチ乳剤(劇) [1,000 倍・14 日] 【ウカ・スリップス・カガ 同時防除可能】

《チャトゲコナジラミ》

適 期：成虫の発生が収まった頃（若齢幼虫期）

薬 剤：アプロードE-スロアブル [1,000 倍・14 日] 又は ハチハチ乳剤 (劇) [1,000 倍・14 日]

又は コルト顆粒水和剤 [2,000 倍・7 日] 等

※ すそ部の葉裏にしっかりとかかるように散布してください（目安：400ℓ / 10㍍）。

【1茶後に中切りした茶園の整枝】

〈時 期〉 再生芽が平均 15 cm程度伸びた時期（葉が5～6枚着いた頃、再生芽が青茎から木化した頃）

・日数の目安 ⇒⇒ 深刈り更新園 更新後50日～60日

中切り更新園 更新後60日～70日

〈位 置〉 更新した位置から 5 cm程度上（新葉が2枚程度残る高さ）

※ 但し、生育が遅く、7月末までに再生芽が充分伸びない場合は、秋に整枝を行うようにしてください。

日数より、芽の大きさを優先して下さい

【土壌改良材】 近年、茶園 pH が低い傾向にあります（pH4以下の場合は改善をお願いします）。土壌の酸性を矯正し、肥料の吸収率を高めるため、必ず施用をお願いします。

（時期）7月下旬～8月中旬 （袋数）苦土セルカ2号(粒) 等を5袋/10㍍散布

【干ばつ対策】 夏場に 10 日程度、雨が降らないと生育不良になる場合があります。

〈灌 水〉 天気予報で雨が1週間以上、降らない場合に数日に分けて灌水する。

〈敷き草〉 土壌表面からの蒸散量を減らすことが出来ます。

※ 排水不良園、幼木園は干害を受けやすいので、ご注意ください。



いちご

1. 紅ほっぺ育苗圃の管理

- (1) 7月下旬～8月上旬にランナー切離しを行う。（最終ポット受けから2週間空ける）
- (2) 切り離し前には子苗にIB化成S1号を一粒施用する。
※IB化成の場合、灌水回数が増えると肥効が短くなりますので肥切れに注意して下さい。
- (3) 切離後、摘葉を行い、展開葉2～3枚管理とする。（大苗はきつめにかく）

炭疽病対策 育苗期ローテーション散布

	殺菌剤	RAC	殺虫剤	RAC	対象病害虫
8月1週目	ジマンダイセン（水）	M3	エコピタ（液）	気門	炭・じゃ・う・ア・コ・ダ
8月2週目	オーソサイド（水）80	M4	バロック（フ）	10B	炭・灰・ダ
8月3週目	セイビアー（フ）20	12	エコピタ（液）	気門	炭・灰・う・ア・コ・ダ
8月4週目	ベルコート（水）	M7	ファルコン（フ）	18	炭・う・ヨ
8月5週目	ファンタジスタ（顆水）	11	ピラニカEW	21A	炭・灰・う・ア・ダ

※う＝うどんこ病、炭＝炭そ病、じゃ＝じゃのめ病、灰＝灰色かび病、ア＝アブラムシ、ヨ＝ヨトウムシ、オ＝オオタバコガ、ダ＝ダニ、コ＝コナジラミ、ス＝スリップス、ホ＝ホコリダニ

※病気の蔓延、発生の抑制のため、台風や強風、大雨の前に必ず防除をお願いします。

㊟エコピタには殺卵効果がないため、ニッソラン等を混用してお使い下さい。

2. コガネムシ対策

ダイアジノンSLゾル	500倍-1000L/10a	育苗ポット灌注	1回
------------	----------------	---------	----

3. 本圃の準備（土耕）

(1) 土壌消毒：下記いずれかの方法で行う

太陽熱消毒	稲わら 石灰窒素	1,000kg/10a 100kg/10a	①混和→②畝立→③たん水→④マルチ 夏季20日間以上ハウス密閉する
バスアミド微粒剤(㊟)		30kg/10a	土壌水分不足で薬害があるので注意
クロルピクリン錠剤(㊟)		10,000錠/10a	土は乾燥気味で使用する。

※ 太陽熱消毒とバスアミドは併用可能で、その場合、石灰窒素は80kg/10aとする

(2) 土壌改良（10aあたり）

フカフカの土作りに！⇒スーパーベラボン（ヤシガラ） 1年に30袋/10aを3年掛けて施用
病気に強い土作りに！⇒ハイフミンデルマハイブリットG 有効微生物 10袋/10a

野菜 冬野菜の準備が始まりました、ゆとりのある栽培計画を！！

品目	おすすめ品種	備考
白菜	黄ごころ85	タキイ
キャベツ	金系201号	サカタ
大根	三太郎	タキイ
ホウレンソウ	寒兵衛	タキイ

※結球野菜は播種および定植遅れが、生育不良や結球不足につながります。畑の準備は計画的に。
※高温時の播種は発芽率低下につながります。軒下や寒冷紗の利用など工夫がPOINT！

農薬購入時には印鑑を！

毒劇物に指定されている農薬は㊟と表記してあります。購入の際には必ず印鑑（認印）をご持参ください。

水稻



美和営農経済センターだより 令和3年7月20日発行

品種別特性一覧 普通栽培 6/1 田植え

1. 穂肥の施用

- ① 水を入れてから穂肥を施用し3～5日間湛水する
- ② 出穂18日～25日前で葉色3.5～4.0を目安とする（一発肥料では3日早く入水して肥料を効かせる）
- ③ 時期がきても葉色がさめない場合は減肥する
- ④ 倒伏が心配される場合は下記の薬剤を散布する

品種	穂肥時期	出穂時期
きぬむすめ	7/27・8/3	8/21
ヒノヒカリ	8/1・8/11	8/22
あいちのかおりSBL	8/3	8/24
にこまる	8/1・8/10	8/26
葵美人（もち）	7/28・8/4	8/22

ビビフル(フ)	75～100ml/10a（水50～150ℓ）	出穂10～2日前に茎葉散布-1回
---------	------------------------	------------------

2. 水管理

- ① 出穂前25日～10日は、3日おきに湛水と落水を繰り返す
- ② 穂ばらみ期～出穂期は3～4cmの深水とする

※高温障害による白未熟米の発生が懸念されますので、適正な対応をお願いします!!

- ・出穂以降の間断かん水や掛け流しにより、高温・高夜温による稲体の消耗を防ぐ
- ・早期落水は白未熟粒等の高温障害や胴割粒の発生原因となるので、絶対行わない
- ・胴割粒は収穫が遅れると増加するので、適期収穫に努める

3. 病害虫防除

(1) 液剤体系の場合（散布量150ℓ/10a）

8月上旬	ウンカ、コブノメイガ	トレボン（乳）	1,000倍	14日-3回
	紋枯病	モンカット(フ)	1000～1500倍	14日-3回
	穂いもち	ダブルカット(フ)	1,000～2000倍	穂揃期-2回
8月中旬	ウンカ、カメムシなど	キラップジョーカー（フ）	1,000倍	14日-2回
	※カメムシの多い圃場では、キラップジョーカー(フ)に代えてスタークル顆粒水溶剤（2000倍・7日-3回）を散布してください			
	穂枯れなど	ブラシン（フ）	1,000倍	7日-2回

(2) 粒剤体系の場合

8月上旬	紋枯病 穂いもち	オリブライト1キロ(粒)	1kg/10a	出穂10日-1回
8月上中旬	ウンカ、ニカメイチ ユウ、コブノメイガ	パダントレボン(粒)L(㊟)	3kg/10a	30日-3回
8月下旬～	カメムシ、ウンカ ツマグロヨコバイ	スタークル(粒)		7日-3回

※ 粒剤は先に水をためてから散布する。また、液剤より3日ほど早めに散布すること

おすすめの新剤 ～ウンカ対策～

エミリアフロアブ
新規有効成分（フルピリミン）
☆残効1～2週間程度
☆ウンカ、カメムシ防除

エクシードフロアブル
新規有効成分（スルホキサフロル）
☆残効2週間程度
☆ウンカ、カメムシ防除

県害虫発生予報ではウンカの発生が多い予報です。

すでに県西部でもウンカの発生が確認されています。 適期防除に努めてください！

農薬使用時は必ず倍率・使用回数・日数の確認をお願いします。