



# 長田営農経済センターだより

No.252

発行：令和3年7月19日 電話：259-3233 Fax：259-3164



センター長	柑橘	苺・水稻・蔬菜・青壮年部	落葉果樹・茶・有害鳥獣	女性部・購買
畑澤	高橋・大塚	山森・大塚	森	山本
購 買				
石原・糟屋・田中・田山				

## 水稻（担当：山森・大塚）

中後期の除草剤

薬剂名	10a当り	使用時期	備考
アトトリ1キロ粒剤	1kg	移植後20日（稲5葉期以降） ～ベィ4葉期（但し、収穫45日前まで）	水がある状態で使用する

病害虫防除（中生・晩生品種の場合）

使用時期	病害虫	薬剂	倍率	使用基準
出穂前 (8月上中旬)	いもち病	ダブルカットフロアブル	1,000倍	穂揃期まで2回
	コブノメイガ・ニカメイ チュウ・イネツトムシ	ロムダンゾル	1,000倍	21日前2回
	カメムシ・コブノメイガ	キラップジョーカーフロアブル	1,000倍	14日前2回
出穂後 (8月下旬～)	穂枯れ	ブラシンフロアブル	1,000倍	7日前2回
	ウンカ・カメムシ	スタークル顆粒水溶剤 エミリアフロアブル	2,000倍 1,000倍	7日前3回 7日前2回

省力体系

使用時期	病害虫	薬剂	使用量	使用基準
出穂10日前 (8月上中旬)	いもち病・紋枯病 ウンカ・カメムシ	ワイドパンチ豆つぶ	250g/10a	35日前1回
出穂後 (8月下旬～)	カメムシ・ウンカ ツマグロヨコバイ	スタークル豆つぶ	250g/10a	7日前3回

※豆つぶ剤→湛水状態（5cm程度）で散布し、4～5日間は湛水状態を保ち、7日間は落水やかけ流しをしない。  
※トビイロウンカ・コブノメイガの発生が多い予報となっています。株元にかかるよう丁寧に防除してください

## いちご（担当：山森・大塚）

時期	薬剂	RAC	倍率	回数	主な対象病害虫
8月1週目	ジマンダイセン水和剤	M3	600倍	3/6	じゃのめ・炭疽
	エコピタ液剤	—	100倍	—	ハダニ・うどんこ・アブラムシ
8月2週目	オーソサイド水和剤80	M4	800倍	3/3	炭疽
	パロックフロアブル	10B	2000倍	1/1	ハダニ
8月3週目	セイビアーフロアブル	12	1000倍	2/3	炭疽
	エコピタ液剤	—	100倍	—	ハダニ・うどんこ・アブラムシ
8月4週目	ベルコート水和剤	M7	1000倍	4/5	うどんこ・炭疽
	ファルコンフロアブル	18	4000倍	2/3	オオタバコガ・ハスモンヨトウ
8月5週目	サンリット水和剤	3	2000倍	1/3	炭疽・うどんこ
	ポリオキシシAL水和剤	19	5000倍	1/3	ハダニ・うどんこ・アザミウマ

## 落葉果樹（担当：森）【印】の箇所は、劇物となりますので購入の際にはハンコをご持参ください。

作物	使用時期	病害虫	薬剂名	倍率	使用基準
桃	8月	シンクイムシ類 アブラムシ・ハモグリガ	モスピラン顆粒水溶剤【印】	2,000倍	前日3回
梨	8月上旬	ハマキ、シンクイ類・ カメムシ類	アグロスリン水和剤【印】	1,000倍	前日3回
キウイ	8月	果実軟腐症	トップジンM水和剤	1,000倍	前日5回
		キウイは乾燥に弱いので、降雨のない時は灌水を3日に1回位行う。			
イチジク	8月上旬	疫病	ランマンフロアブル	2,000倍	前日3回
	8月中旬	さび病	ラリー水和剤	2,000倍	前日4回
	7～8月は雨が多く湿気やすい傾向にあります。通風・採光に努め、園内を清潔にしてください。 ショウジョウバエが発生する場合は、アーデント水和剤1,000倍（前日2回）を散布してください。				
柿	8月上旬	カキヘタムシガ アゾナカイラムシ	モスピラン顆粒水溶剤【印】	2,000倍	前日3回

## 柑橘（担当：高橋・大塚）

品種	時期	病害虫	薬剂名	倍率	使用基準
温州みかん	8月中旬 混用可	チャノキアザミウマ 黒点病	アクタラ顆粒水溶剤 又は エクシレル SE ベンコゼブ水和剤	2,000倍 5,000倍 600倍	14日3回 前日3回 30日4回
	8月下旬	ヤノネカイラムシ	スプラサイド乳剤40【印】	1,500倍	14日4回
中晩柑 (スルガエレガント ・不知火等)	8月中旬	黒点病 チャノキアザミウマ	ベンコゼブ水和剤 エクシレル SE	600倍 5,000倍	90日4回 前日3回
	8月下旬	ヤノネカイラムシ	スプラサイド乳剤40【印】	1,500倍	90日4回

【施肥】 8月下旬 スルガエレガント スルガペレット 3袋/10a  
不知火・はるみ 新FTE S604 2袋/10a

【摘果】 早生みかんは、着果量が多いため早期の摘果を小玉にならない管理をしてください。  
青島みかんは、着果量が多い樹でも摘果作業は9月中旬以降に実施して下さい。

\*不知火・はるみ⇒ **葉果比・1果/100葉**、スルガエレガント⇒ **葉果比・1果/90葉**

8月の内に仕上げ摘果をして、樹勢維持・大玉生産に努めましょう。

翌年の着花確保と、着果部への養分補給・品質向上の為、立枝の上部摘果をして下さい。

立枝の先端に1～2個果実を残して、秋芽の発生を減らす。（最後は摘果する）

【農薬紹介】 日焼け防止（カルシウム資材） ホワイトコート 25～50倍 7月中旬 青島：8月上旬  
極早生で散布する場合は、**薬斑が残る可能性があるため使用する際は営農センター  
高橋・大塚までお問い合わせください**（長田営農経済センター 259-3233）

《青島マルチ栽培》 暑い中大変ですが、高糖度・高品質・高単価みかん生産のためにマルチ栽培に  
取組みましょう！！ ★被覆時期が重要です ⇒ ⇒ **8月上旬**

茶（担当：森）

時期	病害虫名	薬剤名	倍率	使用方法	摘採迄の日数
三番茶生育期	炭そ病・もち病 褐色円星病	インダーフロアブル	5,000倍	混用可	7日
	スリップス ハマキムシ類	ディアナ SC	5,000倍		
8月上旬	ハマキムシ類 (ヨモギエダシャク)	ファルコンフロアブル	4,000倍	単用	7日

◎ウンカ発生園は、ディアナ SC に代えて、リーズン顆粒水和剤 2,000 倍（7日-1回）を散布する。

◎雨が多い場合は、耐雨性に優れる展着剤アピオン E（2,000 倍）を加えると防除効果を高める。

◎ 土壌改良剤の施用について

土壌の酸性を矯正し、肥料の吸収率を高めるために施用してください。

苦土セルカ 2 号（4袋/10a） 7月下旬頃、深耕する前に施用するのが、効果的です。

☆購買からのお知らせ☆

部農会回覧・購買窓口にて予約注文承り中！

●秋植え野菜苗 ●玉ねぎ苗 ●馬鈴薯種芋

すべて申込み切 8/12（木）厳守でお願いします。

「お茶詰め放題・ドリンク」の販売を行います。

会場 長田営農経済センター

日時 8月13日（金） 8：30 ～ 15：00

8月16日（月） 8：30 ～ 15：00

「AFC」の化粧品・シャンプーの販売会もやります。ご来店おまちしております。

～組合員の皆様へ～

暑い中の農作業、本当にお疲れ様です。

毎日暑い日が続く、新型コロナウイルス対策も大変ですが、

熱中症にならないようお体には十分注意して、水分を沢山とってください！

農協の飲料品で熱中症を予防して下さいね！

農業用廃プラスチック・廃ビニール・不要農薬回収申し込み

ご希望の方は申込み用紙、『委任状』に記入の上ご提出をお願いします

用紙は、購買窓口にご用意しております

提出先 長田営農経済センター及び各支店窓口へ

提出期限 令和3年8月31日 まで

～ お知らせ ～

☆イベントの中止について

新型コロナウイルス感染拡大防止のため

下記の行事を **中止** とさせていただきます。

■「組合員鮎釣り大会」

■長田ブロック「納涼祭」

■生活事業「夏っ得フェア」

皆様のご理解・ご協力をお願いいたします



◎営農実態調査提出のお願いについて

今年度も、営農実態調査にご協力をお願い致します。

この調査のデータは農業振興の基礎資料として、補助金の対象資料や栽培暦の配布・振興費の徴収等に利用させていただきますので正確な数字をご記入ください。

つきましては、別途封筒の調査票にご記入いただき各営農経済センター・支店まで提出をお願い申し上げます。

■経営者の住所や名前が変わった場合は修正して下さい。

■耕作面積等に変更がない場合もご提出お願いします。

変更がある箇所は赤字で修正後、

8月20日（金）までに最寄りの支店までご提出ください。

※配布資料のご氏名について、前回ご提出時のご氏名で作成しています。失礼がございましたらお詫び申し上げます。修正の為に御手数ですが変更後のお名前をご提出をお願いします。

長田ブロック有害鳥獣対策協議会より



柵設置補助受付中！

・令和2年度 総会を書面決議にて実施。

令和2年度の捕獲実績（協議会報告分のみ） イノシシ 5頭 ハクビシン 5頭

・近況状況

イノシシ、小動物ともに数は少ないですが、園地を掘られた等の報告があります。注意をお願いします。

・豚熱情報 令和3年1月～7月 県豚熱検査結果

静岡県全体 検査 926 件 内 33 件陽性（JA 静岡市管内 0 件）