

くじらがし、い、な

令和3年7月17日発行

しづはた営農経済センターだより 静岡県葵区下1459-1 ☎294-9330						
センター長	茶	茶・有害鳥獣	野菜・水稻・苺	果樹	女性部・購買	購 買
高橋	佐藤	平野	美和営農センター 宇佐美・望月	伊藤・久留	漆畑	橋本・正込
配送	加藤・増井		大河内地区担当	大石	梅ヶ島地区担当	望月

《茶》 ☆天候不順のため病気の防除を徹底して下さい。☆
来年の1番茶の為に充実した3茶（母葉）を作しましょう！！
ハマキ・シャクトリムシ類の発生に注意し、早めの防除を！！

☆来年の1番茶品質向上へのポイント☆

- ① 葉層を10cm確保するように意識 → 越冬対策・寒さに強い
- ② 適期防除・適期施肥に心掛けましょう → 樹勢回復・養分蓄積・葉数確保
- ③ 時期外れの整枝・浅刈りはやめましょう → 貧弱で、すぐ出開芽になる

《整枝》 更新園の整枝は木茎となった充実した頃

★1番茶後更新園の整枝 ※日数より芽の大きさを優先して下さい。

時 期 再生芽が平均15cm(5～6枚)になり葉色が濃くなり茎が茶色で木化した頃、更新後60日。
(7月末日までをめどとする)

位 置 更新した位置より5cm程度(2～3枚残す)上で整枝して下さい。

注意

整枝時期の遅れ・整枝位置が深いなど関係し、葉焼けの被害が多い
茶園が見受けられます。

対 策 … 樹勢を充実させる為に秋整枝作業を10月下旬とし、葉層が確保でき着葉密度がある位置で整枝を行う。

《防 除》

もち病や枝の輪斑病が発生すると来年度の収量に影響しますので防除の徹底をお願いします！また、お盆前にはハマキムシ類の防除をお勧めます。

◎3茶萌芽期～1葉期 コルト顆粒水和剤でチャトゲコナジラミの同時防除を

炭そ病・もち病・新梢枯死症	フロンサイドSC	2,000倍	混用	14日
ウンカ・スリップス・(クワシロ)	コルト顆粒水和剤	2,000倍		

◎3茶2葉～3葉期 ハマキ類の発生に要注意！

炭そ病・もち病・褐色円星病	インダーフロアブル	5,000倍	混用	7日
スリップス・ハマキ類	ディアナSC	5,000倍		

※1番茶期に葉層の表面に落葉が見える症状は褐色円星病ですので、この時期は必ず褐色円星病に効果がある薬剤を使用ください。

◎クワシロカイガラムシ（第2回目発生）しっかりと対策しましょう

時 期 7月下旬（営農センターに枝を持ってきていただければ、防除適期を確認いたします）

散 布 スノから樹幹部防がしっかりかかる程（1,000ℓ/10a）

薬 剤 アプロードエースフロアブル 1,000倍 または、劇スプラサイド乳剤 1,500倍

※5・6月の1回目に発生が多かった園は、2回目の発生も多いと予想されるので必ず防除をして下さい。

◎チャトゲコナジラミ（成虫飛散後）

被 害 幼虫の排泄物が古葉に付着し『すす病』が発生させ、収量に甚大な被害があります。

時 期 成虫飛散が終わった頃（7月下旬）

コルト顆粒水和剤	2,000倍	単用	7日
----------	--------	----	----

◎ハマキムシ類 8月お盆前にまずは1回必ず防除！！

ハマキムシ類 (ヨモギエダシャク)	ファルコンフロアブル	4,000倍	単用	7日
----------------------	------------	--------	----	----

※防除適期を逃した場合は、アフアーム乳剤 2,000倍 7日を使用して下さい。

※若齢幼虫は葉の裏面から表皮を残すように食害するので、防除の目安にして下さい。

※ファルコンは脱皮促進剤なので若齢幼虫期までの早期防除に努めて下さい。

※8月下旬～9月上旬にもう1度ハマキムシ類の防除を行うと、より効果的です。

☆組合員大会の中止について☆

新型コロナウイルス感染拡大防止のため下記の行事を中止させていただきます。

■組合員鮎釣り大会 皆様のご理解・ご協力をお願いいたします。

コロナ対策給付金の申請を農協で支援いたします

☆緊急事態措置・まん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金

4～7月に宣言地域内の飲食店に間接又は直接、出荷している方で、2019年又は2020年の平均月収と比べ、2021年の4月、5月、6月又は7月の農業収入が50%以上減少した農業者が対象となります。

※ 2019年・2020年の平均月収は、（給付金を除く）年間の事業収入÷12 となります。

※ 諸要件がありますので、対象にならない場合がありますのでご了承ください。

※ 相談される方は、事前に連絡をして受付予約をお願いします。（294-9330）

締め切り：4月・5月分…8月12日(木) 6月分…8月30日(木) 7月分も受付を予定しています。

営農実態調査にご協力ください。

7月の訪問日で、毎年、農協で実施している営農実態調査をお配りします。

表面が農地面積の調査・裏面が営農実態の調査となります。

本年度より、しっかりと現状を把握したいため、面積など変更がない場合でも提出をお願いします。
ご協力よろしくお願いします。

締め切り：8月20日(金)までに しづはた営農経済センター又は最寄りの支店・事務所へご提出ください。

農業用 廃プラスチック回収予定です

訪問日にて「農業用廃プラスチック回収予定、及び回収方法について」という通知をお配りします。

下記のとおり、廃プラ回収を実施予定ですのでご利用ください。

日時：11月中下旬頃 品目：農業用ポリ…肥料袋、マルチ、農P0マーク有、農業の空ポリ・空袋など

日時：12月初旬頃 品目：農業用塩化ビニール（塩ビ）…農業用ハウスビニール、農ビマーク有り

回収には委任状が必要です。詳細は、別紙の通知をご覧ください。

いちご

1. 紅ほっぺ育苗圃の管理

- (1) 7 月下旬～8 月上旬にランナー切離しを行う。
- (2) 切り離し前には子苗に IB 化成 S1 号を一粒施用する。
※IB 化成の場合、灌水回数が増えると肥効が短くなりますので肥切れに注意して下さい。
- (3) 切離後、摘葉を行い、展開葉 4 枚管理とする。(大苗はきつめにかく)

炭疽病対策 育苗期ローテーション散布

	殺菌剤	RAC	殺虫剤	RAC	対象病害虫
8 月 1 週目	ジマンダイセン (水)	M3	エコピタ (液)	気門	炭・じゃ・う・ア・コ・ダ
8 月 2 週目	オーソサイド (水) 80	M4	バロック (フ)	10B	炭・灰・ダ
8 月 3 週目	セイビアー (フ) 20	12	エコピタ (液)	気門	炭・灰・う・ア・コ・ダ
8 月 4 週目	ベルコート (水)	M7	ファルコン (フ)	18	炭・う・ヨ
8 月 5 週目	ファンタジスタ (顆水)	11	ピラニカEW	21A	炭・灰・う・ア・ダ

※う＝うどんこ病、炭＝炭そ病、じゃ＝じゃのめ病、灰＝灰色かび病、ア＝アブラムシ、ヨ＝ヨトウムシ、オ＝オオタバコガ、ダ＝ダニ、コ＝コナジラミ、ス＝スリップス、ホ＝ホコリダニ
※病気の蔓延、発生の抑制のため、台風や強風、大雨の前に必ず防除をお願いします。

⑨エコピタには殺卵効果がないため、ニッソラン等を混用してお使い下さい。

2. コガネムシ対策

ダイアジノンS L ゾル	500 倍-1000L / 10a	育苗ポット灌注	1 回
--------------	-------------------	---------	-----

3. 本圃の準備 (土耕)

(1) 土壌消毒：下記いずれかの方法で行う

太陽熱消毒	稲わら	1,000kg/10a	①混和→②畝立→③たん水→④マルチ 夏季 20 日間以上ハウス密閉する
	石灰窒素	100kg/10a	
バスアミド微粒剤(劇)		30kg/10a	土壌水分不足で薬害があるので注意
クロルピクリン錠剤(劇)		10,000 錠/10a	土は乾燥気味で使用する。

※ 太陽熱消毒とバスアミドは併用可能で、その場合、石灰窒素は 80kg/10a とする

(2) 土壌改良 (10a あたり)
フカフカの土作りに！⇒スーパーベラボン (ヤシガラ) 1 年に 30 袋/10a を 3 年掛けて施用
病気に強い土作りに！⇒ハイフミンデルマハイブリットG 有効微生物 10 袋/10a

野菜 冬野菜の準備が始まりました、ゆとりのある栽培計画を！！

品目	おすすめ品種	備考
白菜	黄ごころ 85	タキイ
キャベツ	金系 201 号	サカタ
大根	三太郎	タキイ
ホウレンソウ	寒兵衛	タキイ

※結球野菜は播種および定植遅れが、生育不良や結球不足につながります。畑の準備は計画的に。
※高温時の播種は発芽率低下につながります。軒下や寒冷紗の利用など工夫が P O I N T ！

水稻



品種別特性一覧 普通栽培 6/1 田植え

品種	穂肥時期	出穂時期
きぬむすめ	7/27・8/3	8/21
ヒノヒカリ	8/1・8/11	8/22
あいちのかおりSBL	8/3	8/24
にこまる	8/1・8/10	8/26
葵美人 (もち)	7/28・8/4	8/22

1. 穂肥の施用

- ① 水を入れてから穂肥を施用し 3～5 日間湛水する
- ② 出穂 18 日～25 日前で葉色 3.5～4.0 を目安とする (一発肥料では 3 日早く入水して肥料を効かせる)
- ③ 時期がきても葉色がさめない場合は減肥する
- ④ 倒伏が心配される場合は下記の薬剤を散布する

ビビフル(フ)	75～100ml / 10a (水 50～150ℓ)	出穂 10～2 日前に茎葉散布-1 回
---------	----------------------------	---------------------

2. 水管理

- ① 出穂前 25 日～10 日は、3 日おきに湛水と落水を繰り返す
- ② 穂ばらみ期～出穂期は 3～4cm の深水とする

※高温障害による白未熟米の発生が懸念されますので、適正な対応をお願いします!!

- ・出穂以降の間断かん水や掛け流しにより、高温・高夜温による稲体の消耗を防ぐ
- ・早期落水は白未熟粒等の高温障害や胴割粒の発生原因となるので、絶対行わない
- ・胴割粒は収穫が遅れると増加するので、適期収穫に努める

3. 病虫害防除

(1) 液剤体系の場合 (散布量 150 ㍓/10a)

8 月上旬	ウンカ、コブノメイガ	トレボン (乳)	1,000 倍	14 日-3 回
	紋枯病	モンカット(フ)	1000～1500 倍	14 日-3 回
	穂いもち	ダブルカット(フ)	1,000～2000 倍	穂揃期-2 回
8 月中旬	ウンカ、カメムシなど	キラップジョーカー (フ)	1,000 倍	14 日-2 回
	※カメムシの多い圃場では、キラップジョーカー(フ)に代えてスタークル顆粒水溶剤 (2000 倍・7 日-3 回) を散布してください			
	穂枯れなど	ブラシン (フ)	1,000 倍	7 日-2 回

(2) 粒剤体系の場合

8 月上旬	紋枯病 穂いもち	オリブライト 1 キロ(粒)	1kg/10a	出穂 10 日-1 回
8 月上中旬	ウンカ、ニカメイチュウ、コブノメイガ	パダントレボン(粒) L (劇)	3kg/10a	30 日-3 回
8 月下旬～	カメムシ、ウンカ ツマグロヨコバイ	スタークル(粒)		7 日-3 回

※ 粒剤は先に水をためてから散布する。また、液剤より 3 日ほど早めに散布すること

おすすめの薬剤 ～ウンカ対策～

エミリアフロアブ
新規有効成分 (フルピリミン)
☆残効 1～2 週間程度
☆ウンカ、カメムシ防除

エクシードフロアブル
新規有効成分 (スルホキサフロル)
☆残効 2 週間程度
☆ウンカ、カメムシ防除

県害虫発生予報ではウンカの発生が多い予報です。

すでに県西部でもウンカの発生が確認されています。 適期防除に努めてください！

農薬使用時は必ず倍率・使用回数・日数の確認をお願いします。

農薬購入時には印鑑を！

毒劇物に指定されている農薬は劇と表記してあります。購入の際には必ず印鑑 (認印) をご持参ください。

《柑橘》

不知火・はるみは 8 月上旬、スルガエレガント・極早生品種は 8 月中旬頃までを目安に、下記に記載した品種別葉果比表を基準に仕上げ摘果を行ってください。中晩柑類は、大玉生産にするため内裾なり果・小玉果・傷果・奇形果を中心に摘果しましょう。

☆品種別葉果比表

極 早 生	葉果比 20 枚に 1 果	内裾なり果・小玉果・傷果・奇形果を中心に摘果を行ってください。 特に中晩柑類は、直花果の肥大が鈍いので、摘果してください。
ス ル ガ	葉果比 100 枚に1果	
不 知 火	葉果比 100 枚に1果	
は る み	葉果比 120 枚に1果	
※早生・青島温州は、9 月上中旬に葉果比20～25枚に1果を基準に仕上げ摘果を行ってください。		

◎防除管理

温州ミカン

防 除 時 期	対 象 病 害 虫	農 薬 名	希 釈 倍 数	使 用 基 準
8月上旬中旬	黒 点 病	ペ ン コ ゼ ブ 水 和 剤	600倍	30日－4回
	チャノキイロアザミウマ	エ ク シ レ ル S E	5,000倍	前日－3回

中晩柑

防 除 時 期	対 象 病 害 虫	農 薬 名	希 釈 倍 数	使 用 基 準
8 月 中 旬	黒 点 病	ペ ン コ ゼ ブ 水 和 剤	600倍	90日－4回
	チャノキイロアザミウマ	エ ク シ レ ル S E	5,000倍	前日－3回

◎施肥管理

不知火・はるみ…8 月下旬 新 FTE S604(2袋/10a)

※「はるみ」のべたなりで葉が黄色くなっている樹は早急な摘果とダブルクイック S550 1袋/10a を施用してください。

《落葉果樹》

対 象 作 物	対 象 病 害 虫	農 薬 名	希 釈 倍 率	使 用 基 準
ハウスいちじく 8 月 中 旬	さ び 病	ト リ フ ミ ン 水 和 剤	2,000 倍	前日－3回
いちじく 8 月	ア ザ ミ ウ マ 類	スピノエース顆粒水和剤	5,000 倍	前日－1回
	疫 病	ランマンフロアブル	2,000 倍	前日－3回
	さ び 病	ラ リ ー 水 和 剤	2,000 倍	前日－4回
ぶ どう 8 月 上 旬 (収 穫 前)	チャノキイロアザミウマ	スタークル顆粒水溶剤	2,000 倍	前日－3回
	ベ と 病	I C ボ ル ド ー 6 6 D	50 倍	—
柿 8 月 上 旬	ハ ダ ニ 類	コ ロ マ イ ト 水 和 剤	2,000 倍	7日－2回
	フジコナカイガラムシ カキノハタムシガ	劇モスピラン顆粒水溶剤	2,000 倍	前日－3回
梨 8 月 上 旬	ハ マ キ ム シ 類	エ ク シ レ ル S E	5,000倍	前日－3回
	シンクイムシ カ メ ム シ 類	スタークル顆粒水溶剤	2,000倍	前日－3回
桃 8 月 中 旬	モ モ ハ モ グ リ ガ	エ ク シ レ ル S E	5,000倍	前日－3回



JA静岡市女性部しづはたブロック

女性部コーナー7月



きびしい暑さが続きますが、皆さまいかがお過ごしですか？

熱中症対策には農協のポストニックウォーターなど飲料をたくさん飲んで乗り切りましょう！

栽培講習会！申し込み忘れた方も、どうぞ、いらしてください！

7/28 しづはた、7/29 梅ヶ島と大河内、にて開催いたします。

静興物産の即売会、12：00 からやります！

涼みながら買い物も楽しんでください！

行事予定

8月 7日（土）昭府町管内女性部 健康講座 トリム水素水実演 10:00
（6月16日の役員会にて行いました、水素水について、ご要望がありましたので、今回は、昭府町管内の女性部様を対象とさせていただきます。）

8月12日（木）婦人科検診 14名 受付 12:30

9月22日（水）婦人科検診 18名 受付 12:30

教養講座&サークル

8/12（木）フラワーアレンジ教室 12:00～昭府町

8/12（木）フラワーアレンジ教室 19:00～しづはた

8/23（月）健康体操教室 19:30～ しづはた支店

9月より 料理教室 第一回目開始します、日程は通知しますね！

〔特集2〕
『時短・簡単・大胆 夏のらくらくクッキング！』
調理や片づけを簡単に済ませたい、なるべく火を使いたくない……、暑い季節には、だれもが思うことですね。フライパン1つで作るミールキット、バット1つで作るオーブン料理、レンジ加熱1回で作るレンチン料理など、がんばらなくてもおいしく仕上がる調理のアイデアと、ご飯が進む満足おかずレシピを紹介します。
〔特集2〕
【消費者との新しいつながり方】
……コロナの時代ならではの出会いを求めて
この困難な状況にもめげず、新しいつながり方を求めて奮闘している農業者

