

わらしな川 7月号

(R3.7.20 発行)

JA静岡市 菓科営農経済センター 指導:279-0772 購買:279-0773 配送:279-0774

センター長	宮原	茶	深井・梶山	野菜・水稲・苺	小澤・繁田	女性部・購買	平野
購買	市川・岡田・岡部	地区担当	天野(服東・服西)・渡辺(南菓科)・鈴木(清沢・大川)				

人事異動のお知らせ

転入 渡辺 進二 (購買) ← 物流センター
 転出 瀧田 昌弘 (購買) → 美和営農経済センター

イベント中止のお知らせ

- ・JA静岡市 夏っ得フェア
- ・JA静岡市組合員鮎釣り大会

営農実態調査のお知らせ

7月の訪問日で各戸に配布いたします。内容を確認の上、**8月20日(金)までに** 菓科営農経済センターまたは最寄りの支店へご提出をお願いいたします。

※お手数ですが、変更のない方もご提出ください。

わらしな 購買ミニ感謝祭

8月6日(金) 9:00~16:00 中菓支店

静興物産 (農作業用品) 小野商店 (寝具、雑貨) カリヤ (生活雑貨)
 AFC (健康食品、化粧品) やまき (仏具) 日光陶器 (陶器類)
 トンボヤ (婦人服、雑貨) その他**購買品**。お楽しみ抽選会も用意しています♪
 健康サロン同時開催中! ご家族そろってご来場ください!

加工品も販売します!

暑い夏はJA飲料で乗り切ろう!

疲れた時に... 熱中症予防に...

C1000 ビタミンレモン 30本入 2,940円
 ポストニックウォーター 24本入 1,980円

リンゴ果汁100%! リンゴジュース 30本入 3,402円
 子供に人気! スパークリングみかん 24本入 2,203円

贈答用の包装やのし付けも承っております。お気軽にご注文下さい。 ☎279-0773

【茶】 ※本年は、ウンカの発生が多い傾向ですので、今後の防除を徹底願います。(多発時は下記薬剤を)
 ☆ガンバ水和剤WSB㊟「1000倍・14日」または ハチハチ乳剤㊟「1000倍・14日」
 ※また長雨が続き、病気が発生しやすいので、殺菌剤の散布を徹底して下さい。
 ☆長雨が続き場合、耐雨性に優れた展着剤「アビオンE」2000倍を加用することにより、防除効果を高めます。
 ※組織加入者等で使用する農薬が定められている場合は、工場基準を遵守してください。

病害虫防除

三番茶萌芽期 ~1葉開葉期	炭そ病、もち病 新梢枯死症	フロンサイドSC	2000倍	・予防剤 ・茎葉の表裏に十分かかるよう散布	混用 14日
	ウンカ、スリップス	コルト顆粒水和剤*	2000倍	・行動制御・浸透性あり	

※コルト顆粒水和剤は、チャトゲコナジラミ・クワシロカイガラムシにも効果があります。

三番茶生育期	炭そ病、もち病 褐色円星病	インダーフロアブル	5000倍	・治療、予防効果あり	混用 7日
	スリップス ハマキムシ類	ディアナSC	5000倍	・ウンカの発生が懸念される園ではディアナSCに変えてリーズン顆粒水和剤(2,000倍、7日)を散布する	

8月上旬 (お盆前までに)	ハマキムシ類 ・ヨモギエダシャク	ファルコンフロアブル	4000倍	・食毒、脱皮促進剤(IGR)のため 若令幼虫期 までの早期防除	単用 7日
------------------	---------------------	------------	-------	--	----------

※ ハマキムシ類はこの時期に徹底防除することにより、抑制できます。
 ※ 適期を逃した場合は、**アフーム乳剤** [2000倍・7日]を使用してください。

7月~9月	マダラカサハラハムシ	※下記のいずれかを散布			・この時期3茶芽より、発生しやすいので、注意して下さい。 ・被害葉が分からない場合は、営農センターへ連絡下さい。
		コテツフロアブル㊟	2000倍	7日	
		ハチハチ乳剤㊟ エクシレルSE	1000倍 2000倍	14日 7日	

※ 被害症状は成虫が葉の裏側より大小の穴をあけ、ひどい場合は3茶芽が出てこない場合があります。
 ※ 防除適期は被害が見られ始めたら散布し、朝及び夕方散布が効果的です。(昼間は茶株内に隠れる為)

◎1番茶後中切り更新園の整枝について

- 時期……日数よりも芽の大きさを優先して、再生芽が5~6枚になり葉が硬化した頃(60~70日)
 ※山間地等では更新後の生育が遅く、7月最下旬までに整枝できない場合はそのままにしておき、秋に整枝を行うようにして下さい
- 位置……更新した位置より葉を1~2枚程度残すよう整枝して下さい。
 ※今後乾燥等が予想されるので、しっかりと葉層の確保をするようにして下さい。

★クワシロカイガラムシ(第2回目発生期)

時期……7月中~下旬 ※発生が早まっていますので、注意して観察して下さい。
 薬剤……コルト顆粒水和剤 [2000倍・7日] スプラサイド乳剤 [1500倍・14日] アプロードエースフロアブル[1000倍・14日]
 防除適期……産卵開始後7~10日で幼虫になります。この幼虫の時に上記薬剤を散布して下さい
 また、2回目は発生時期にムラが見られますので、2回の防除が有効です。防除適期の確認はクワシロカイガラムシが寄生している枝を営農センターまたは最寄の事業所までお持ち下さい。

◎土壌改良剤の施用について

土壌の酸性を矯正し、肥料の吸収率を高めるために必ず施用して下さい

- ・時期…8月上旬頃まで(配合を施用する前まで)
- ・袋数…**苦土セルカ2号 粒(4袋)**、**苦土石灰 粒(4袋)**

※深耕する前に施用するのが、効果的です
 ※深耕しない茶園でも苦土石灰類を施用した後は、少なくとも5~10cmは耕して土壌と混合する

【水稲】

1. **水管理** 中干し後は間断灌水を実施し、根腐れや下葉の枯れ上がりを防いでください。
穂前は灌水し、施肥後は3～5日間は湛水状態にし、肥料を効かせます。



2. **穂肥** 穂肥の遅れは食味を低下させるので注意しましょう。
葉色が濃い場合は1/3程度に減肥してください。

穂肥日の目安 6/1田植の場合ヒノヒカリ・にこまる:8月1日 あいちのかおりSBL:8月3日

！！ウンカに注意！！

定期的に稲の株元を確認してください！ウンカがいましたら、下記の農薬で早めの防除をお願いします。

農薬名	倍率	散布液量	使用時期	使用回数
エミリアフロアブル	1,000倍	60～150ℓ/10a	7日前まで	2回以内
エクシードフロアブル	2,000倍	60～150ℓ/10a	7日前まで	3回以内

3. 病害虫防除

液剤	早生	7月下旬～	いもち病	ダブルカット(F)	1000倍	穂揃期
		8月上旬 (出穂前)	紋枯病 ウンカ・カメムシ類	モンカット(F) トレボン乳剤	1000倍	14日前 14日前
中・晩生	8月中旬 (出穂直後)	穂枯れ	ブラシン(F)	1000倍	7日前	
		ウンカ・カメムシ類 コブノメイガ・ツマグロヨコバイ	キラップジョーカー(F)	1000倍	14日前	
中・晩生	7月下旬～	紋枯病	モンカット(F)	1000倍	14日前	
		8月上旬	ウンカ・カメムシ類	トレボン乳剤	1000倍	14日前
中・晩生	8月中旬 (出穂前)	いもち病	ダブルカット(F)	1000倍	穂揃期	
		コブノメイガ・カメムシ	キラップジョーカー(F)	1000倍	14日前	
中・晩生	8月下旬～	穂枯れ	ブラシン(F)	1000倍	7日前	
		9月上旬	ウンカ・カメムシ	スタークル顆粒水溶剤	2000倍	7日前

粒剤	7月下旬～	紋枯病・いもち	コラトプリンバー粒剤	3kg/10a	出穂30～5日前-2回
		8月上旬	ニカメウチュウ・ウンカ・コブノメイガ	パダントレボン粒剤	3kg/10a
中・晩生	8月中旬 (出穂前)	カメムシ・ウンカ・ツマグロヨコバイ	スタークル粒剤	3kg/10a	7日前-3回

【野菜】

種類	病害虫	農薬名	倍率	使用基準
キュウリ	斑点細菌病	コサイド3000	2000倍	-
	うどんこ病	フルピカフロアブル	2000～3000倍	4回
ナス	ハダニ類	コロマイト水和剤	2000倍	2回
	うどんこ病・灰色かび病	フルピカフロアブル	2000～3000倍	4回
	灰色かび病	スマレックス水和剤	1000～2000倍	6回

全て収穫前日(散布後収穫まで24時間空ける)になります。
高温時には薬害が生じる恐れがあるため、早朝や夕方の防除を心がけましょう。

【果樹】

ミカン	8月上旬	コナカイガラムシ(発生園のみ)	スプラサイド乳剤 40	1500倍	14日-4回
	8月中旬	チャノキイロアザミウマ	アクトラ顆粒水溶剤 または エクシレルSE	2000倍 5000倍	14日-3回 前日-3回
		黒点病	ペンコゼブ水和剤	600倍	30日-4回
※極早生みかんの防除は、収穫日数を考慮して、薬剤を選定して下さい。					
柿	8月上旬	フジコナカイガラムシ かきハタムシガ	モスピラン顆粒水溶剤	2000倍	前日-3回
いちじく	8月上旬	疫病	ランマンフロアブル	2000倍	前日-3回
	8月上旬	アザミウマ類	スピエース水和剤	5000倍	前日-1回
	8月中旬	さび病	ラリー水和剤	2000倍	前日-4回
	8月下旬	黒かび病	園内清掃に努めるとともに通風、採光を良好に保つ		
ブドウ (屋根掛)	8月上旬 (収穫前)	チャノキイロアザミウマ	ダントツ水溶剤	4000倍	前日-3回
		べと病	IC ボルドー66D	50倍	-
		ハダニ類	コロマイト水和剤	2000倍	7日-2回

【女性部】

<行事・会議>

8/25(水)10:30～ 県家の光大会【マリナト】
8/30(月)13:30～ JA 役員・青壮年部・女性部
意見交換会【本店】

.....
清沢フラワー 8/11(水)19:00～【清沢】
書道 8/13,27(金)19:00～【藁科】
清沢体操 8/19,26(木)19:30～【清沢】

【有害鳥獣駆除】

現在、サル・イノシシ・ニホンジカ・アライグマ・ハクビシン・アナグマの野生鳥獣駆除の許可をすべての地域(鳥獣保護区を含む)にて取っています。引き続き、山に入る際には十分気をつけて下さい。駆除のご相談は部農会長を通じて、営農経済センターへご連絡下さい。

※ 近年マダニやヒルが増えていますので畑や山に入る際は十分注意してください。

マダニよけ

サラテクト

200ml 660円

ヤマビルよけ

ひる下がりのジョニー

140ml 1,100円

蚊などの脅威からお肌を守ります。
虫よけ剤売り上げNo.1!

ヤマビルからやさしく守ります。
粘着力があり効果が長時間持続します。

藁科営農経済センター 購買で販売中!

家の光9月号 読みどころ

消費者との新しいつながり方

コロナ禍により今までのような農業体験や交流が難しくなっています。このこんな状況にもめげず、消費者との新しいつながりを模索する仲間を紹介します。