



# 長田宮農経済センターだより



発行: 令和3年8月19日 電話: 259-3233 Fax: 259-3164 No.253

|                   |       |              |             |        |
|-------------------|-------|--------------|-------------|--------|
| センター長             | 柑橘    | 苺・水稻・蔬菜・青壮年部 | 落葉果樹・茶・有害鳥獣 | 女性部・購買 |
| 畑澤                | 高橋・大塚 | 山森・大塚        | 森           | 山本     |
| 購 買               |       |              |             |        |
| 石原 ・ 糟屋 ・ 田中 ・ 田山 |       |              |             |        |

## 水 稻 ( 担当 : 山森・大塚 )

- ・カメムシ対策 穂の膨らみ始めが最も被害にあうため、その前に下記の薬剤を散布して下さい  
出穂間際の除草は発生を助長する要因になるため、出穂10日前までに除草を終了してください
- ① 液剤での散布は出穂 3~7日後に一回目を行い、その7~10日後に二回目を散布しましょう
- ② 粒 剤・豆つぶ剤での散布は出穂7~10日後に散布して下さい(3~5cmの湛水状態を5日保ちましょう)
- ・高温と乾燥対策  
①中干し後、乾いていたら入水しましょう ②夜温が高い時は水をかけ流しましょう ③早期の落水は避けましょう
- ・病害虫防除 ( 中生・晩生品種 ) 開花期は、開花時刻(8:00~14:00)の農薬散布は避けましょう



| 病 害 虫               | 薬 剤 名          | 希 釈 倍 率  | 使 用 基 準 |
|---------------------|----------------|----------|---------|
| カメムシ類・ウンカ類・コブノメイガ   | キラップジョーカーフロアブル | 1,000倍   | 14日前-2回 |
| ウンカ類・ツマグロヨコバイ・カメムシ類 | エミリアフロアブル      | 1,000倍   | 7日前-2回  |
| カメムシ類・ウンカ類          | スタークル顆粒水溶剤     | 2,000倍   | 7日前-3回  |
|                     | スタークル粒剤        | 3kg/10a  | 7日前-3回  |
|                     | スタークル豆つぶ       | 250g/10a | 7日前-3回  |
| いもち病・穂枯れ・内穎褐変病      | ブラシンフロアブル※     | 1,000倍   | 7日前-2回  |

※内穎褐変病(ないえいかっぺんびょう)を対象とした薬剤散布の適期は穂揃期後の開花期になります。

## 野 菜 ( 担当 : 山森・大塚 )

秋冬野菜、定植の時期! ~栽培のポイント~

アブラナ科野菜の連作は、根こぶ病や白さび病などの土壌病害が発生しやすいので避けましょう

- <キャベツ・はくさい>・チョウ目害虫の被害防止は早期発見がポイント!
- ・初期生育の遅れは温度不足で小玉化や不結球になるため、適期の種まきが重要です
- ・排水性の良い場所で栽培、または高畝にして排水性を向上させ、病気の発生を抑えましょう
- <ブロッコリー>・株を太らせると良い頂果蕾が育つため、定植後2週間程度で1回目の追肥を行いましょう
- ・ホウ素欠乏症予防のため、元肥は微量元素が含まれる「新FTE S604」を1a当たり2kg施用して下さい
- 追肥でホウ素を補う場合は、液肥「ヨーヒB5」500倍を葉面散布して下さい



### <病害虫防除>

| 病 害 虫 | 薬 剤 名       | キ ャ ベ ツ                           | は く さ い         | ブ ロ ッ コ リ ー                     |
|-------|-------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| コナガ   | ミネクトデュオ粒剤   | 1g/株 定植時                          |                 |                                 |
|       | プレバソンフロアブル5 | 2,000倍 前日-3回                      |                 |                                 |
| アオムシ  | アフーム乳剤      | 1,000倍~2,000倍                     | 1,000倍~2,000倍   | 1,000倍~2,000倍                   |
|       |             | 前日-3回                             | 7日-3回           | 3日-3回                           |
| べと病   | ダコニール1000   | 1,000倍<br>14日-2回                  | 1,000倍<br>7日-2回 | 1,000倍<br>出蕾前-2回<br>(但し、収穫21日前) |
| 軟腐病   | コサイド3000    | 2,000倍 時期:— 回数:制限なし(はくさいは幼苗期薬害注意) |                 |                                 |

## 柑 橘 ( 担当 : 高橋 )

- ※日焼け対策 ⇒ ホワイトコート 50倍 表面の果実へ散布 (取り寄せ注文)
- ※浮皮・水腐れ対策 ⇒ ジベレリン 液剤 + ジャスモメート液剤 (取り寄せ注文)
- 散布時期: 満開 130日後(青島温州で 9月中旬散布)

★ 上記の使用は長田宮農センター担当へご相談をお願いします。 電話: 259-3233

| 品 種                                 | 時 期         | 病 害 虫  | 薬 剤 名      | 希 釈 倍 率 | 使 用 基 準                 |
|-------------------------------------|-------------|--------|------------|---------|-------------------------|
| 青 島<br>スルガエレガント<br>不知火、はるみ<br>ポンカン等 | 9月中旬<br>混用可 | 黒点病    | ペンコゼブ水和剤   | 600倍    | 温州 30日-4回<br>中晩柑 90日-4回 |
|                                     |             | スリップス類 | ロディー乳剤【印】  | 2,000倍  | 7日-4回                   |
|                                     |             | ミカンハダニ | ダニコングフロアブル | 4,000倍  | 前日-1回                   |

※ 9月は、ダニの防除を徹底しましょう。丁寧な散布を心掛けてください。

※ 仕上げ摘果 早生温州 8月~9月上旬 青島温州 9月中下旬

## 茶 ( 担当 : 森 )

- 《秋 肥》 秋肥は、来年の一番茶の品質、収量に影響するため、3要素がバランスよく含まれた配合肥料が望ましいです。 施用後は土と混ぜてください
- ・JAナイス配合 8月下旬 7袋/10a

| 時 期   | 病 害 虫                   | 薬 剤 名         | 希 釈 倍 率 | 使 用 方 法 | 基 準 日 数 |
|-------|-------------------------|---------------|---------|---------|---------|
| 9月中下旬 | クワシロカイガラムシ<br>(右記のいずれか) | アプロードエースフロアブル | 1,000倍  | 単用      | 14日     |
|       |                         | スプラサイド乳剤【印】   | 1,500倍  |         | 14日     |
|       |                         | コルト顆粒水和剤      | 2,000倍  |         | 7日      |
| 秋芽開葉期 | 炭疽病・もち病<br>網もち病         | ドイツボルドーA      | 500倍    | 混用      | 14日     |
|       | ウンカ・スリップス               | スタークル顆粒水溶剤    | 2,000倍  |         |         |

◎チャトゲコナジラミ・サビダニ、ホコリダニの発生が予測される茶園はスタークル顆粒水和剤に代えてハチハチ乳剤【印】[1,000倍・14日]を散布して下さい。

## いちご ( 担当 : 山森・大塚 )

### 1. 育苗圃の管理~定植

- (1) 施肥管理: 育苗時の肥料過多は花芽分化の遅れ、肥料切れは芯止まりや不時出蕾の発生に影響します
- (2) タンソ病対策: 高温多湿条件で発生が助長されるので、苗への灌水は15時までとし夕方は避けましょう

### 2. 病害虫防除

| 時 期   | 薬 剤        | RAC  | 倍 率             | 回 数 | 主 な 対 象 病 害 虫 |
|-------|------------|------|-----------------|-----|---------------|
| 9月2週目 | アントラコール(水) | M3   | 500             | 2/6 | 炭疽            |
|       | エコピタ(液)    | -    | 100             | -   | うどんこ・ハダニ      |
| 9月3週目 | ゲッター(水)    | 1・10 | 1,000           | 3/3 | 炭疽            |
|       | プレオ(フ)     | UN   | 1,000           | 2/4 | ヨトウ           |
| 9月4週目 | ベルコート(水)   | M7   | 1,000           | 5/5 | 炭疽・うどんこ       |
|       | ニッソラン(水)   | 10A  | 2,000~<br>3,000 | 2/2 | ハダニ           |

落葉果樹（担当：森）

| 作物  | 使用時期         | 病虫害  | 薬剤名                             | 希釈倍率           | 使用基準            |
|---|--------------|--|---------------------------------|----------------|-----------------|
| 桃   | 9月中旬         | せん孔細菌病   | ICボルドー412                       | 30倍            | —               |
|   | 9月下旬         | コスカシバ  | スプラサイドM【印】 または<br>モスピラン顆粒水溶剤【印】 | 200倍<br>2,000倍 | 60日-2日<br>前日-3回 |
|   | 9月中旬         | カイガラムシ類（発生園）   | アプロードエースフロアブル                   | 1,000倍         | 14日-1回          |
| 梨   | 9月上旬         | 黒星病・黒斑病  | キノンドーフロアブル                      | 1,000倍         | 3日-9回           |
|   | 収穫後          | カイガラムシ類（発生園）   | コルト顆粒水和剤                        | 3,000倍         | 前日-3回           |
|   | 9月上旬         | 施肥   | 新FTE S280                       | 10a当たり         | 3袋施用            |
| キウイ   | 上旬<br>混用可    | 果実軟腐病  | ベルコート水和剤                        | 1,000倍         | 前日-5回           |
|   |              | クワシロカイガラムシ   | アプロード水和剤                        | 1,000倍         | 前日-2回           |
|   | 中旬           | 貯蔵病害<br>(灰色カビ病)  | ストロビードライフロアブル                   | 2,000倍         | 前日-3回           |
| 【強風対策】強風によるかいう病の蔓延を防ぐため、防風垣、棚の整備等をおこなしましょう。 |              |  |                                 |                |                 |
| イチジク  | 9月           | さび病・疫病   | アミスター10フロアブル                    | 1,000倍         | 前日-3回           |
|   |              | シヨクヨバエ（多発園）  | アーデント水和剤                        | 1,000倍         | 前日-2回           |
|   | 9月上中旬        | 施肥   | 粒状固形小粒30号                       | 10a当たり         | 2袋施用            |
| 黒かび病予防のため、通風と採光がよくなるようにしましょう。               |              |  |                                 |                |                 |
| 柿   | 9月上旬         | うどんこ病・炭そ病  | ストロビードライフロアブル                   | 3,000倍         | 14日-3回          |
|   | 9月           | カメムシ類  | スタークル顆粒水溶剤                      | 2,000倍         | 前日-3回           |
|   | 葉摘み・<br>摘果作業 | ・果実周辺の葉及びかぶさり枝・徒長枝を除去すると、着色促進及び汚損果防止になります。<br>・仕上げ摘果 小果や外観不良果実を摘果しましょう |                                 |                |                 |

さといも(唐芋)（担当：山森・大塚）



| 病虫害          | 薬剤名        | 希釈倍率   | 使用基準  |
|--------------|------------|--------|-------|
| ハスモンヨトウ      | プレバソフロアブル5 | 2,000倍 | 前日-3回 |
| ハスモンヨトウ・スズメガ | プレオフロアブル   | 1,000倍 | 7日-2回 |
| ハスモンヨトウ・ハダニ  | コテツフロアブル   | 2,000倍 | 7日-2回 |
| アブラムシ        | ウララDF      | 2,000倍 | 7日-2回 |

【印】マークのある農薬は、購入時に印鑑が必要です。

営農実態調査表提出のお願いについて

7月下旬頃、当JAの広報誌とともに営農実態調査表(耕作面積調査表)の記入用紙を配布させて頂きました。まだ提出がお済でない方は、お手数ですが各営農経済センターまたは支店までご提出をお願い致します。

事務処理の関係上、大変恐れ入りますが、9月6日(月)までにご提出頂きたく存じます。

～ お知らせ ～

静岡県 新型コロナ 応援金について

静岡県内に「まん延防止等重点措置」が適用されたことを受け、静岡県は現在国が実施している「月次支援金」を拡充する形で応援金を給付する。

8月の売り上げが前年、前々年に比べ30%以上～50%未満減少していることを条件に法人上限10万円、個人事業者には上限5万円を支給。

申請方法や時期など詳細は9月以降営農経済センターまでお問い合わせください。

農業新聞・家の光図書購読者募集中

- 農業新聞・家の光を読んで農業に関する知識を高めましょう！
- 希望者は長田営農経済センターまで(259-3233)

有害鳥獣関係（担当 森） ・8月中旬までの捕獲報告…0件

・実施隊の皆様へ アナグマ捕獲について

現在、アナグマは捕獲報奨金の対象ではありませんが、最近被害が多いため、捕獲報奨の対象にするための働きかけを実施します。行政に報告するため、捕獲された方は、報告をお願いいたします。(写真等は必要ありません)

・サル群れの目撃、早生ミカン食害情報あり(北丸子)

サルを目撃情報が増えています。網で囲うなど被害対策を行ってください。



『購買店からののお知らせ』

- ★ 「農業用廃プラスチック・廃ビニール回収」 委任状取り纏め申込み用紙(委任状)は営農センターに在ります！

提出期限 令和3年8月31日(火) 長田営農経済センター提出

- ★ 予約農薬 申込み受付中

提出期限 令和3年9月15日(水) 長田営農経済センター提出

9月末まで夏の除草剤キャンペーン実施中

対象商品 ラウンドアップML・タッチダウンIQ・ザクサ液剤 規格により対象外在り)

ザクサ液剤…スギナ・オオアレチノギクもしっかり枯らす！

- ★ 落葉果樹(柿・桃・梅・栗)・柑橘の苗木の注文書 受付中 締切 9月末まで 部農会回覧します。\* 柑橘苗木の受付時期が例年より早くなっています。ご注意ください。

- ★ まだまだ暑い日が続きます！JA飲料販売中！

熱中症対策にもオススメ ポストニックウォーター500ml×24本入 1,944円

- ★訂正とお詫び

8月号のセンターに誤りがありました。不要農薬回収申込は今年度はありません。お詫び申し上げます。

