



わらしな川



9月号

(R3.9.20 発行)

J A 静岡市 薫科営農経済センター 指導:279-0772 購買:279-0773 配送:279-0774

センター長	宮原	茶	深井・梶山	野菜・水稻・苺	小澤・繁田	女性部・購買	平野
購買	市川・岡田・岡部		地区担当	天野(服東)・渡辺(南薫科)・鈴木(清沢・大川)			

人事異動のお知らせ

購買(清沢・大川地区担当)	
転出 鈴木 正人 ⇒ 美和営農経済センター	
転入 松尾 雅通 ⇐ 中薫支店	

皆さんには、大変お世話になりました。
新しい部署でも頑ばります！ (鈴木 正人)

購買店営業日時変更のお知らせ

9月30日(木) 上期棚卸決算のため **12:00閉店**
ご理解・ご協力のほど宜しくお願い致します。



令和4年 肥料年間予約運動実施中です！

お得な年間注文のご利用をお願い致します！

☆☆さらにお得な特別価格の肥料もあります！☆☆ (※詳細は注文書にて) (税込)

銘 柄	通常当用価格	特別予約価格	値引額
茶 JAナイス配合	2,100円	1,720円	▲380円
茶 本山トップ1茶配	3,210円	2,790円	▲420円
茶 デルトップwin	3,920円	3,490円	▲430円
水稻 ナイワパワ-823	4,200円	3,760円	▲440円
全般 粒状固形080	2,020円	1,800円	▲220円
全般 IB化成S1号	3,950円	3,490円	▲460円
全般 苦土石灰(粉)	480円	298円	▲182円

JAナイス配合は
予約で5袋買くと
1袋分無料になる計算！
お得です！！

38%割引！

☆静岡県 新型コロナウイルス 中小企業等応援金 9月分について

静岡県内に「緊急事態措置」が適用されたことを受け、県では現在国が実施している「月次支援金」を拡充する形で応援金の給付を予定しています。

8月に続き、9月の売り上げが前年、前々年に比べ30%以上50%未満減少していることを条件に、法人上限10万円、個人事業者上限5万円を支給 ※50%以上減少の場合は国月次支援金対応申請方法や時期など詳細は10月以降に営農センターまでお問い合わせください。

※8月分については、9月中旬以降に申請受付予定です。 ※ 詳細別紙参照

イベント中止のお知らせ

・J A 静岡市組合員ゴルフ大会

【茶】 ☆秋整枝について

※参考 昨年の平均気温(曲金・静岡气象台) 9月下旬23℃ ⇒10月上旬21℃ ⇒10月中旬19℃

◎ **時 期** 平均気温が18～19℃以下に下がった頃 平均気温は、最高温度+最低温度÷2
(目安⇒ 山間地：10月上旬～ 平坦地：10月中旬～)

- ・上記の時期は目安です。実際の気温を注視して時期を決めて下さい。
- ・整枝時期が早い ⇒ 年内に萌芽してしまい、冬に寒害を受けやすくなります
- ・整枝時期が遅い ⇒ 幼葉の分化数が少なく、春先生育を開始して萌芽するまでの期間が長く必要になり、一番茶の萌芽、摘採が遅くなります

- ・10月下旬までに硬化しない場合は、春整枝にして下さい。

※最近、高温による再萌芽が見られますので、気温の推移に注意して下さい。

◎ 深 さ

- ・2茶整枝面より、4～6cm位上(3茶葉を2枚残す程度)
- ・整枝が深く葉層が薄くなると収量が少なくなる危険性があります
通常、越冬に必要な葉層は8cm以上確保して下さい
茶園の生育状況をよく観察して、整枝の時期・深さを決めてください。
- ・1茶後更新茶園など、秋芽の生育良好園については、日焼け防止の為、正式な整枝の7日位前までに、秋整枝予定面より5cm位上で一度整枝を行う

★秋整枝後のカンザワハダニ 防除

- ・オマイト乳剤 1500倍 [14日] ※低温時に使用すると速効的
※輪班病・赤焼病が予想される園では、
カスミンボルドー1000倍[30日]で散布

★クワシロカイガラムシ防除について


- 9月中下旬(年3回発生地区) ※3回目はダラダラ発生になります。
- ・コルト顆粒水和剤 [2000倍・7日] ← チャトゲコナジラミ同時防除可能
- ・スプラサイド乳剤 (劇) [1500倍・14日]
- ・アプロードエースフロアブル [1000倍・14日] ← チャトゲコナジラミ同時防除可能

令和4年版 幹旋図書のお知らせ

農作業や金銭出納記録の記入など、毎日の記録に便利な幹旋図書の注文を受付ます。

- 農業経営記録簿 … 700円
- 3年連続日記 … 4,400円 (すべて税込)
- 農 業 日 誌 … 1,590円
- 新農家歴 … 600円
- 野菜づくりノート … 1,100円
- など **締切 10/ 8 (金) まで**


お申込みは部農会回覧または薫科営農経済センターまでお願いします！



購 買 オススメ & お買い得情報

彩 輝 1,980 円

各種そ菜に使いやすい
N-P-K=6-6-6。
種まきや苗の定植
時 の元肥に便利
なペレット状！
1袋 約20kg入り



ポストニックウォーター

ノーマル・レモン 1,800 円



爽やかな柑橘系
フレーバーで
爽やかな飲み心地
水分を吸収しやす
い飲料です。

スパークリングみかん

2,000 円



静岡県産温州
みかんの果汁を10%
使用し、フレッシュな
香りとパンチのきいた
炭酸飲料です。

【水稻】

★食味向上 収穫期までの登熟期の夜温が高いときは未熟米（乳白粒）になりやすく、食味低下につながりますので、夜間のかけ流しなどを行って下さい。


★収穫 収穫適期は 1 穂中のもみが 90％程度黄色(5～10％は緑色)になった頃。刈遅れに注意。

刈取 目安	出穂後から刈取までの日数の目安		6/1 田植 の 目安	出穂日→収穫日
	中生種 きぬむすめ	約 40 日		
	晩生種 あいちのかおり、にこまる	約 45 日		

★乾燥 ①7～10 日間位天日干し、玄米水分 14.5～15％に調整。
(営農センターで水分量がいつでも測定できます。穂を数本お持ちください。)
②コンバインで収穫したモミは放置せず、4 時間以内に乾燥機に入れて下さい。

★水稻農作業標準料金表 10a あたり (10％税込価格)

刈取 (倒伏 3 割増)	コンバイン	54,450 円	刈取り,乾燥,籾摺(玄米運搬代は含まない)
	バインダー	16,500 円	結束ひも代を含む
脱穀		14,520 円	
乾燥	コンバイン	27,170 円	コンバインによる刈取籾
	仕上げ乾燥	5,500 円	玄米水分概ね 18％未満(18％以上は割増)
籾摺 (60kg)		1,210 円	※倒伏は 3 割増し
玄米運搬		2,200 円	※作業性の悪い場所では割増し



【野菜】

病害虫名	農 薬	使用基準	はくさい	キャベツ	だいこん
軟腐病	Z ボルドー※	500 倍	収穫前日数-回数の制限なし		
	スターナ水和剤	1000 倍	7 日－3 回		14 日－5 回
アブラムシ コナガ	モスピラン顆粒水溶剤(劇)	2000 倍	14 日－3 回	7 日－5 回	14 日－1 回
	ダントツ水溶剤	2000 倍	3 日－2 回		7 日－2 回
アオムシ コナガ	アフーム乳剤	2000 倍	7 日－3 回	前日－3 回	7 日－3 回
	アタブロン乳剤	2000 倍	7 日－4 回		14 日－3 回
	プレオフロアブル	1000 倍	7 日－2 回		14 日－2 回

※ハクサイの幼苗期に使用の場合薬害を生じる可能性があります。

《特集》 もしもの時の危険回避術

火災、事故、野生動物との遭遇、天災時など、身近に起こりうる危険。そんな時のとっさの判断を問うクイズで、いざというときに備えましょう。



家の光 9月号 読みどころ

《特集2》 -子や孫の世代のために-

女性農業者がもっと輝くための提案


「男女共同参画」の実現をめざしているわたしたち。女性農業者たちの提案を読みながら、いっしょに考えましょう。



「家の光」「地上」「ちゃぐりん」年間予約購読推進運動実施中！

【苺】★定植前の管理

本圃へうどんこ病・ハダニ等持ち込まないように注意してください。



★定植前後の注意点

- ①必ず検鏡を行い、分化確認後速やかに定植してください。
分化前の定植はかえって分化が遅れてしまいます。
※分化確認後、定植が遅れる場合は液肥（くみあい液肥 500～1000 倍）をカン注する。
- ②古葉やランナーを取りながら、定植を行わないようにする。
- ③定植後の 7 日間は、必ず手灌水を行いましょう。（活着を良くし、初生根の発生を促す）
また、葉かきを定植後 14 日間は行わないようにする。
※出蕾期（定植 1 ヶ月後）までに根を張らせることが今後の生育のポイントです。

★定植時の害虫防除(アブラムシ)

アドマイヤー 1 粒剤	0.5 g/株	定植時 1 回
ベストガード粒剤	1 g/株	

【たけのこ】★施肥 9 月中旬～10 月中旬

新たけのこペレット	N-P-K 9-4-6	5 袋/10a
-----------	----------------	---------



本年のお礼肥として、肥料をしっかりとふりましょう！

【落葉果樹】

梅	9 月中旬	ウシホカバラムシ（若齢幼虫）	アプロードフロアブル	1000 倍	7 日－2 回
	10 月中旬	かいよう病	IC ボルドー66D	50 倍	葉芽発芽前
キウ フルーツ	上(ホワイト)	果実軟腐病	ベルコート水和剤	1000 倍	前日－5 回
	中(レインボー)	貯蔵病害（灰色カビ病）	ストロートドライフロアブル	2000 倍	前日－3 回
		ウシホカバラムシ	アプロード水和剤	1000 倍	前日－2 回
	9 月中下旬	ウシホカバラムシ（若齢幼虫）	アプロード水和剤	1000 倍	前日－2 回
いち じく	9 月中旬	さび病	アミスター 10 フロアブル	1000 倍	前日－3 回
		疫病			

【柑橘】

防除 9 月中旬	黒点病	ペンコゼブ水和剤	600 倍	青島 30 日－4 回 甘夏 90 日－4 回
	チャノキアザミウマ	ロディー乳剤(劇)	2000 倍	7 日－4 回
	ミカンハダニ	ダニコングフロアブル	4000 倍	前日－1 回



※本年はカメムシが多発傾向です。発生した場合、「スタークル顆粒水溶剤」2000 倍 前日－3 回

【有害鳥獣駆除】

現在、【サル・イノシシ・ニホンジカ・アライグマ・ハクビシン・アナグマ】の野生鳥獣の駆除許可を、取っています。

また、11 月より猟期に入ります。引き続き、山に入る際には十分気をつけて下さい。



【女性部】

＜教養講座＞ 新型コロナウイルスによる緊急事態措置が明けたら再開予定です。