



栽培・購買のお問い合わせは…美和営農経済センター（054）296-2121 まで

センター長	大沼	お茶・果樹	村田	茶	武田	購買	瀧田	購買	滝浪
女性部 購買	市川	苺・蔬菜・水稲	宇佐美	蔬菜・苺 青壮年部	望月	購買・ 地区担当	鈴木	購買・ 地区担当	山田

アグリロード美和♥ JA静岡市共催



## オータムフェア

♥ 11月13日（土） 9:00~12:00

※売切れ次第終了

♥ 会場：JA美和支店、アグリロード美和駐車場



新型コロナの感染状況によっては中止とさせていただく場合があります。予めご了承下さい

【内容 盛りだくさん!!】★アグリロード美和の新鮮野菜★五平餅  
 ★フランクフルト★大福★お弁当★お惣菜★やきいも★おでん  
 ★七間町トンボヤ（エスニックウェア&グッズ）★カレーライス  
 ★カマタ機械★静岡物産★田中燃料（暖房器具等）★日光陶器（お茶碗など）  
 ★お茶詰め放題★1,000円均一コーナー★おいしいJA飲料 …他にも盛沢山!

## 令和2年分（令和3年3月申告利用分）固定資産台帳利用料徴収について

固定資産台帳の利用料を下記の通り徴収させていただきます。  
 ご不明な点等ございましたら、最寄りの営農センターへお問い合わせ下さい。

引き落とし予定日：11月26日（金） 金額：1,500円

《※固定資産台帳とは、確定申告時に作成する収支計算書（農業・不動産・一般）の添付資料である減価償却費一覧表のことです》

## 年特肥料推進運動実施中!

世界情勢の影響で今年は肥料価格の大幅な値上がりが見られる状況です。特に苦土石灰などは当用で買う方も多いですが、お得な年特をご検討下さい。少量からでもお気軽にご注文下さい。

★肥料銘柄一部紹介 ※価格は全て税込みです。

銘柄	N-P-K-Mg	当用価格	予約価格	値引額	特徴
粒状固形 080	10-8-10-0	2,020円	→ 1,800円	△220	腐食30% 様々な作物の元肥～追肥に!
苦土石灰(粉)	アルカリ分55%	480円	→ 298円	△182	酸性土壌の改良、苦土の補給に!
JAナイス配合	9-2-4-2	2,100円	→ 1,720円	△380	有機率50% 低価格の茶用肥料!
デルトップwin	28-2-4-3	3,920円	→ 3,490円	△430	茶の芽出肥～母枝肥を1回でカバー!
有機入化成10号	10-6-7-0	2,900円	→ 2,630円	△270	野菜の追肥といえばコレ! 有機入化成!

## 茶

## 茶園共進会出品園募集!!

12月上旬にJA静岡市茶園共進会があります。茶園評価の良い機会にもなりますので、この機会に是非、出品して頂ければと思います。（自薦・推薦問いません!!）

☆ 出品部門：成木園の部 平成28年以前に定植したハサミ刈り茶園  
 出品可能な方は、11月12日（金）までに美和営農経済センター茶担当までご連絡ください。

## 《秋整枝後の防除について》

## ◎ チャトゲコナジラミ

☆ 幼虫の密度が高いと、すそ部分に「すす病」（古葉が黒くなる）を発生したら、大発生状態になりますので、このような症状がある方は、下記のとおり対応願います。

- ① 整枝・すそ刈りを行い、密度を減らしてから、農薬散布を行う。
- ② 幼虫・卵がいる、すそ部を重点に、ハチハチ乳剤(調)1000倍14日 等を散布する。

※ 厳冬期（1~2月）の晴天が2~3日続いた日にマシン油による越冬幼虫の防除を行う。

※ マシン油は、赤焼病を助長する恐れがあります。

心配な場合は、マシン油の散布7日前に銅剤を散布ください（混用はしないこと）。

## ◎ カンザワハダニ

・10月下旬~11月上旬

オマイト乳剤	1,500倍	14日
--------	--------	-----

※ チャトゲコナジラミとの同時防除なら、厳冬期（1~2月）のマシン油散布が有効です。

※ オマイト乳剤は新芽に葉害を起こす場合があるため、この時期の使用がオススメです。

## ◎ 赤焼病（近年、成園で発生が多い傾向です。被害園は秋・春の2回散布を!）

☆ 春先（3月中旬頃）に発病が見られた茶園では、秋整枝後11月最上旬までに防除を。

カスミンボルドー	1,000倍	・	ドイツボルドーA	500倍
----------	--------	---	----------	------

※ 銅剤を1ヶ月以内に連続して散布すると葉害が生じることがあるので注意して下さい。

## ◎ 灰色かび病 開花期（11~12月）に気温が高く降雨が多いと発生が心配されます。

開花盛期または落弁期に

フロンサイドSC	2,000倍	・	ベブドー水和剤	500倍
----------	--------	---	---------	------

などを散布して下さい。

## 《再整枝（化粧ナラシ）》


時期：年内に行う場合は11月中旬まで

位置：秋整枝面より深くない様に、遅れ芽や立ち葉を除く程度に。

## お正月用品受付開始!



詳細は別紙のチラシをご覧ください  
 たくさんのご注文をお願いします!!



# イチゴ

## 1. 株管理

- (1) 摘葉は出蕾時5枚以上になるように実施する。(収穫時期は7~8枚管理とする。)
- (2) 2芽になるよう、わき芽を整理する。(ドロ芽は除去する。)
- (3) 頂果房の摘果は7~10果を目安に。  
※株出来していない株で出蕾してしまった場合は摘み取るまたはきつめに摘果する。
- (4) 少量多灌水を基本とする。(給液量は吸水量の1.5倍を目安に)
- (5) 定期的に給液及び排液の確認をしてください。(EC、PH、排液量)  
※適当な容器に入れ営農経済センターに御持ち込頂ければ、無料で測定致します。  
※排液はバケツなどに1日分を溜めておいたものを持って来てください。

## 2. ミツバチ管理



- (1) 導入のタイミングは1番の出蕾を確認した時点です。
- (2) 到着後すぐには解放せず、蜜蜂が落ち着いたら夕方か夜、早朝に開放してください。  
※解放までは、網窓にしておき通気性を確保する。
- (3) ミツバチは導入後すぐに訪花せず、2~7日ほど偵察バチがハウス環境を確認してから、働きバチが訪花活動を行います。
- (4) 餌をあげすぎると、餌を巣穴にため込みすぎて次の子孫を残せなくなってしまう。訪花活動も鈍りますので、基準量をまもりましょう。(納品直後の巣箱の重さが概ね餌の入っている適正重。)  
目安(どれどれ): 納品1週間後、その後7~10日間隔で給餌。150~200ml/回施用。  
※日中のハウス内気温が18度以下になるハウスは2~3週間に1回。
- (5) 厳寒期は毛布などを巣箱にかぶせ保温してあげましょう。
- (6) ミツバチの定着が悪い場合は、誘引剤を使いましょう。(ビーセントルアー等)
- (7) 雨天が続く場合や、ハウス内気温が低い(18℃以下)日が続く場合はマルハナバチの導入もお勧めです。

## 3. 温度管理 基本の温度 25℃~27℃(日中)を意識して、管理しましょう。

- (1) ビニール被覆: 開花直前(2番の分化を確認してから行いましょう。)
- (2) 保温開始目安: 最低気温が10℃を下回ってから(きらび香の場合は12℃です。)  
→2番分化前に保温すると2番の遅れにつながります。必ず検鏡を行いましょう。

## 4. 病害虫防除 『入れない! 出さない! 増やさない!』

病害虫は被害が大きくなる前に防除することが重要です。また、予備苗(補植苗)も防除しましょう。

### ☆☆天敵利用のポイント☆☆

- ① 25℃が発育適温です。(放飼時期、ハウス内温度管理に注意しましょう。)
- ② 放飼前にハダニの防除を徹底しておく。(ゼロ放飼をお願いします。)
- ③ 天敵放飼後2週間は薬剤散布を控え、定着を促す。
- ④ 放飼後にハダニが多発生した場合は気門封鎖剤を発生した場所にスポット的に散布する。

### 天敵に影響の大きい薬剤(ミヤコ・チリ) ※一部抜粋

グレース乳剤(100日以上)	モベントフロアブル(45日)	モレスタン水和剤(21日)
ダニトロンフロアブル(21日)	モスピラン顆粒水溶剤(14日) ㊟	ディアナSC(14日)
コテツフロアブル(14日) ㊟	パロックフロアブル(14日)	アファーム乳剤(7日)
コロマイト水和剤(7日)	スピノエース顆粒水和剤(7日)	ストロビーフロアブル(7日)

# 水稻

## 1. 貯蔵時の害虫対策

- (1) ネルパック(真空貯蔵袋)にエージレス(脱酸素剤)を入れて保管する

- ネルパック1袋で玄米30kgを貯蔵できる
- エージレスの効果持続は1年間。別売りなので取り替えて繰り返し使える




- (2) 保管場所にクズ米やヌカが落ちていないようにきれいに掃除しておくこと
- (3) 15℃以下で保存すること(害虫が死ぬわけではないが活動を停止する)  
※精米機にエージレスと一緒に入れるとお米が黒くなってしまうので注意!

## 2. スクミリングガイ対策(ジャンボタニシ)

- (1) 下記資材を施用すると効果がある

石灰窒素	30kg/10a	稲刈り後11月上旬まで
------	----------	-------------



手順 稲刈り → 水深3cm湛水(3日間) → 石灰窒素散布 → 混和せず湛水状態(3日間)

コシヒカリ・倒伏田では翌年の元肥を1~2kg減らすこと

- (2) 冬起こし

ジャンボタニシは寒さに弱いので、耕起によって地表に出して寒さにあてる  
その後できるだけ細かく耕うんして貝を砕く



## 玄米品評会 出品者募集!!

規格: 玄米500g(氏名・連絡先・品種名を明記)

提出先: 美和営農経済センター 締切: 11月10日(水)

## 野菜 ~秋冬アブラナ科野菜~

ヨトウ・コナガは例年10月~11月にかけて発生数が増加します。早期防除を! しっかり防除し、寒くなる前に作物に力をつけさせてあげましょう。

病害虫	薬剤名	RAC	キャベツ	ハクサイ	ダイコン	ブロッコリー
ヨトウムシ コナガ	アファーム(乳)	6	1,000~2,000倍 前日3回	1,000~2,000倍 7日3回	1,000~2,000倍 7日3回	2,000倍 3日3回
	カスケード(乳)	15	2,000~4,000倍 7日2回	2,000~4,000倍 7日2回	2,000~4,000倍 14日3回	4,000倍 7日2回
	フェニックス(顆水)	28	2,000~4,000倍 前日3回	2,000~4,000倍 前日3回	2,000~4,000倍 7日2回	2,000~4,000倍 前日2回
	プレバソン(フ)5	28	2,000倍 前日3回	2,000倍 前日3回	2,000倍 前日3回	2,000倍 前日3回
黒腐病 軟腐病	カスミンボルドー	24・MO1	1,000倍 7日4回		1,000倍 14日3回	1,000倍 7日4回

### ~除草剤・農薬散布について~

散布の際は自身・近隣の作物を守るためにも下記のことにご注意下さい。

- ① 風の強い日に散布をしない
- ② 専用の噴口を使用する
- ③ 近隣の圃場・住宅にも配慮する(声掛け等)
- ④ 登録・使用方法を必ず確認する

