



# 長田宮農経済センターだより



発行：令和3年11月19日 電話：259-3233 Fax：259-3164

|                   |         |          |             |        |
|-------------------|---------|----------|-------------|--------|
| センター長             | 柑橘・青壮年部 | 苺・水稻・蔬菜  | 落葉果樹・茶・有害鳥獣 | 女性部・購買 |
| 畑澤                | 大塚      | 山森・古井・大塚 | 森           | 山本     |
| 購 買               |         |          |             |        |
| 石原 ・ 糟屋 ・ 田中 ・ 田山 |         |          |             |        |

## いちご [ 担当：山森・古井・大塚 ]



[摘果]

- ・根張り、葉面積の確保、草勢等バランスを考慮し、株に応じて摘花を実施する（目安） 頂花房 7～10個、腋花房 5～7個
- ・1. 5番が発生している場合は、頂果房、腋果房を合わせて10果程度にする

[ハウス内環境管理]

- ・日中のハウス内の気温は25℃～27℃が適温 ※できるだけ温度を保てるよう、早めの保温を心掛ける
- ・年内の収量を増やすため、12月はできるだけ最低温度を高くするように心がける  
夜間最低気温は7℃（きらび香は10℃）とする  
※寒さが本格的になる前に、ハウス内の隙間や二重被覆の破れなどを補修しましょう！
- ・二酸化炭素濃度は400ppm以上を保ちましょう（タイマー式の場合は15分焚いて、15分休む）
- ・循環扇を利用し、常に株の周りの空気を入れ替えましょう

[ミツバチ管理]

- ◎ミツバチは20～25℃で最も活発に訪花する。
- ・高温になるとハウスの上部を飛び、体力が消耗するためハウス内は30℃以上にならないようにする
- ・厳寒期は巣箱をハウス内に設置する、または毛布でくるむ等の保温をする

[病害虫防除]

| 病 害 虫       | 農 薬 名       | 倍 率                      | 使用基準  | 天 敵  | ミツバチ |
|-------------|-------------|--------------------------|-------|------|------|
| うどんこ病       | ベルクトフロアブル   | 4000倍                    | 前日-5回 | 影響なし | 1日   |
| うどんこ病・灰色かび病 | パレード20フロアブル | 4000倍                    | 前日-3回 |      |      |
| 灰色かび病       | スミレックスくん煙顆粒 | 6g/<br>100m <sup>3</sup> | 前日-3回 |      |      |
| ハダニ類        | マイトコーネフロアブル | 1000倍                    | 前日-2回 |      |      |
|             | ダニオーテFL※    | 2000倍                    | 前日-2回 |      |      |
| アブラムシ       | ウララDF       | 2000倍                    | 前日-2回 |      |      |
| アブラムシ・コナジラミ | チェス顆粒水和剤    | 5000倍                    | 前日-3回 |      |      |

※ダニオーテFL

☆各種ハダニ類の全ステージに活性を示します

☆本剤は銅を含む製剤と混用及び近接散布で防除効果が低下するおそれがあるため、使用の際は銅剤との混用はさけてください。銅剤を使用する場合は、10日以上散布間隔を空けてください  
銅剤を散布した後の本剤の使用はさけてください

## タマネギ [ 担当：山森・古井・大塚 ]



栽培のポイント：肥料過剰と加湿環境に注意！ 腐敗病の原因となる

追肥管理：有機化成10号(10-6-7) 50kg/10a タイミング：①12月中・下旬 ②3月上旬

マルチ栽培の場合は追肥ができないので、元肥+エコロングの70日タイプを施用する

収穫・貯蔵について：全株の約8割が倒伏した頃。 茎葉が概ね乾いたら風通しの良いところで貯蔵する

| 病 害 虫  | 農 薬 名     | 倍 率   | 使用基準  |
|--------|-----------|-------|-------|
| 腐敗病    | バリダシン液剤   | 500倍  | 3日-5回 |
| 白色疫病   | ランマンフロアブル | 2000倍 | 7日-4回 |
| アザミウマ類 | ディアナSC    | 2500倍 | 前日-2回 |

## 水稻 [ 担当：山森・古井・大塚 ]

土づくり資材：ケイ酸を施用し、倒伏防止・食味向上を図る。また、高温障害の軽減も期待できる

下記の資材の中から1つを施用する

| 資材名          | 施用量(10a) | 備考                         |
|--------------|----------|----------------------------|
| オイスターミネラル    | 5袋       | カキ殻入りケイ酸質資材                |
| けい酸加里プレミアム34 | 2～3袋     | ケイ酸34%加里20%他に微量元素も含有       |
| ワラ分解キング      | 1袋       | 年内に稲藁と一緒にすきこむ。浮き藁防止、ケイ酸を戻す |

## 茶 [ 担当：森 ]

【防除】チャトゲコナジラミ

|    |                                                                                                                                                                                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 特徴 | 年3～4回発生（5月・7月・8～9月・10～11月）<br>※ 繁殖率が高いため、急速に地域全体に拡散します                                                                                                                                      |
| 被害 | 幼虫の密度が高い（大発生する）と、すそ部に「すす病」（古葉が黒くなる）が生じます                                                                                                                                                    |
| 防除 | 12～2月にかけてトモノールSなど（100倍）<br>※ 400g/10a 幼虫・卵のいる、すそ葉・葉裏を重点に散布してください。<br>※ マシン油を2回散布することで防除効果があがります<br>2回散布する場合1ヶ月以上間隔をあけてください<br>また、マシン油は水に流されやすいため、晴天が2～3日続くときに散布して下さい<br>※ 赤焼病が助長される恐れがあります。 |

【防除】 灰色カビ病

- この時期に気温が高く（発病適温15～18℃）、降雨が多いと発生が心配されます。また、着花の多い茶園ほど発生が多くなります。下記の薬剤を散布してください。  
開花盛期または落弁期に、フロンサイドSC [2000倍] またはベフドー [500倍]

**【印】 マークのある農薬は、購入時に印鑑が必要です。**

柑 橘 〔 担当：大塚 〕

\*青島温州の収穫・予措 青島・普通温州の過熟は浮皮が発生するため、収穫の遅れに注意しましょう。収穫が遅れると、樹勢回復期間が短くなり、冬季の耐寒性の低下や来春の着果量の減少が懸念されるため、**早期収穫**をしましょう



貯蔵病害防除後は樹全体の果実が**8分着色以上で早期収穫**をしましょう

\*中晩生柑橘類の水腐れ症は、**アピオンE 500倍**で対策しましょう！

| 作物                 | 使用時期      | 病虫害                      | 薬剤名         | 倍率    | 使用基準   |
|--------------------|-----------|--------------------------|-------------|-------|--------|
| 温州ミカン類             | 収穫7日前～前日  | 貯蔵病害<br>(混用散布)           | ベフラン液剤25【印】 | 2000倍 | 前日-3回  |
|                    |           |                          | ベンレート水和剤    | 4000倍 | 前日-4回  |
| スルガ<br>(甘夏)        | 収穫10～20日前 | へた落ち防止<br>貯蔵病害<br>(混用散布) | マデックEW      | 3000倍 | 10日-1回 |
|                    |           |                          | ベフラン液剤25【印】 | 2000倍 | 前日-2回  |
| ポンカン<br>はるみ<br>不知火 | 着色5～6分    | 水腐れ軽減<br>(果実散布)          | アピオンE       | 500倍  | —      |
| 柑橘                 | 発生時       | ミカンハダニ                   | カネマイトFL     | 1500倍 | 7日-1回  |

落葉果樹 〔 担当：森 〕

| 作物                  | 使用時期                           | 病虫害                                                     | 薬剤名                   | 使用倍数                    |
|---------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 桃                   | 12月上中旬                         | 越冬害虫<br>カイガラムシ類・ダニ                                      | マシン油乳剤97%<br>(トモノールS) | 50倍<br>(水100ℓに2ℓ)       |
| 梨                   | 12月上旬                          | 越冬病害虫                                                   |                       |                         |
| レインボーレッド、<br>東京ゴールド | 12月上中旬                         | かいよう病                                                   | ICボルドー66D             | 25～50倍<br>(水100ℓに4ℓ～2ℓ) |
| キウイ                 |                                | 越冬病害虫                                                   | マシン油乳剤95%<br>(トモノール)  | 14倍<br>(水100ℓに約8ℓ)      |
| イチジク                |                                | 幼木寒害防止 ⇒ 主幹・主枝に藁を巻き保護する<br>さび病、疫病の予防 ⇒ 落葉を園外に持ち出して処分する。 |                       |                         |
| 柿                   | 12月中下旬                         | 越冬病害虫                                                   | マシン油乳剤97%<br>(トモノールS) | 50倍<br>(水100ℓに2ℓ)       |
|                     | 落葉病・うどんこ病の予防 ⇒ 落葉を園外に持ち出して処分する |                                                         |                       |                         |
| 梨・キウイ・柿             | 越冬病害虫対策                        | 粗皮削り (病害虫の越冬場所となる荒い樹皮を削り落とす)                            |                       |                         |

※多種類の果樹に散布する場合は、マシン油乳剤95% (トモノール) を使用する

【マシン油乳剤取扱いの注意点】

- ・マシン油乳剤は混用時に、油が浮かなくなるまで水と良く混ぜ合わせてください
- ・マシン油は、原液に水が少しでも入ると保存できないので、注意してください

～ お知らせ ～

青色専従者相談会 日程のお知らせ

丸子支店 令和4年1月5日(水) 時間 9:00～11:00(午前のみ)  
下川原支店 令和4年1月6日(木) 時間 9:00～11:00(午前のみ)  
長田支店 令和4年1月7日(金) 時間 9:00～11:00(午前のみ)

《持ち物》

- ・専従者の年末調整に必要な証明書等(生命共済、建物共済、社会保険、小規模共済ほか)
- ・令和3年度源泉徴収簿(記載中の物)・納付キップ・通帳(事業主)・通帳印
- ・マイナンバーカード、通知カード(通知カードの場合は身分証明書も必要です)  
※事業主と専従者の両者分をご持参ください。
- ・年末に税務署ならびに市より送付される封筒(書類)

購買からのお知らせ



〈肥料年間特別予約申し込み受け付け中!〉

世界情勢や、製造、流通コストの高騰により肥料価格は値上げの情勢です。  
当用価格よりも有利な年間予約をおすすめします!

☆年間予約おすすめのポイント☆

年間予約の安価設定に加え、“コスト対策 特別価格”を設定

年間予約のみ対応の、決済月の延長・大口個人値引もあり

○申し込み締め切り 令和3年11月30日(火)まで

※供給時期により改定された価格が適用されます。予めご了承ください。

〈年金感謝デー協賛 購買事業展示会〉

令和3年12月15・16日9時～15時 会場：長田支店にて

お茶詰放題・きたがわ宝石・東洋綿業(健康寝具、衣料品他)・トイレットペーパー特売

〈お正月用品受付中!〉

申し込み締め切り 11月30日(火)

申し込み先 長田営農経済センター購買 または 最寄の支店まで

〈農業用廃ビニール回収のお知らせ〉

日 時 12月7日(火) 午前8:30～11:00まで 長田支店駐車場

長田有害鳥獣協議会 掲示板

・11月 捕獲報告 イノシシ3頭 (小坂、寺田)

イノシシは依然活発に活動しています。みかんが収穫最盛期を迎えますので、  
収穫直前に被害にあわないよう、対策をお願いします。

11月1日より狩猟期間となりました。狩猟者が山へ入ることが多くなると思います  
ので、注意をお願いいたします。

